
1561







Abridged "Commentaries" of Mattioli.

1749

Ex Libris

Joannis Baptistæ

D̃e Nampor

ambiani

42850

HISTORIA PLANTA-RVM.

Earum Imagines, Nomenclaturæ Qualitates, & Natale Solum.

Quibus accessēre Simplicium Medicamentorũ facultates, secundum Locos & genera, ex Dioscoride.

LVGDVNI
Apud Gabrielem Coterium.
1561.

SPLENDIDISS. VIRO D. NICOLAO HENRY, D. à Cremyeu, Treuoulx, Feurs, &c. Viennæ Galliarum Prætori.

Sanromt

ANTON. PINAEVS. S.

FErianti mihi, Prætor ornatiſſ. incidit in manus, anno ſuperiore, MATTHIOLVS in Dioſcoridẽ:quẽ vbi Gallicè reddidiſſem,placuit etiam-num manualem ipſum facere,in nominis tui gratiam.Ex quo enim te primùm vidi ſemper obſeruaui vnicè , cùm ob raras animi tui dotes , tum maximè ob ſublimitatem illam ingenij , quæ te valde ſpectabilem apud omnes noſtros reddit. Mirum eſt enim quantum in hoc tuo ætatis flore

adoleuit ratio, ita exactè de omn
re iudicas. Quo preiudicio quic
certius habere poteſt frequentiſ-
ſimum hoc Galliarũ Emporium,
ad confirmandam illam quam de
te concepit expectationem? Ta-
lis ergo cum ſis, ad te velut ad e-
xactiſsimum Cenſorem hoc Tel-
luris Promptuarium mitto, ea de
ſcriptum arte , vt quicquid de
Plantarum ratione ſummi in Re
Medica Principes ſenſerunt , in
hoc Enchiridio poſsis conſpicere,
ſerióque ludere in hoc vaſto Na-
turæ horto cum ſummis Authori
bus, ſiue piſcari, venari, aucupari,
ſiue demum ruſticari animi gra-
tia libeat. Quam omnem operam
boni æquique conſules. Viue & va
le, vir ornatiſſ. Pinæúmque tuum
ama. Lugduni x v. Ianuarij,

M. D. L X I.

Iris: Græcis, ἶρις: Arabibus, Aſmeni iuni, ſiue Aierſa: Italis, Iride, Giglio azurro, ſiue Giglio celeſte: Germanis, Blavv gilgen, Blavvſchvvertel, Veielvvurtz, ſiue Himmelſchvvertel: Hiſpanis, Lirio cardeno: Gallis, Glayeul, ſiue Flambe.

Locus ex Fuchſio.



Naſcitur in hortis, & vinearum Septis.

Qualitates ex Matthiolo.

Excalfacit ordine ſecundo completo, vel tertio inchoante, & pariter ſiccat.

Ex Fuchſio.

Abſtergit et maturat.

Iris ſylueſtris: Italis, Giglio ſaluatico: Gallis, Flambe ſauuage.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur ſponte in Montibus, in ſaxoſis, & quandoque in campeſtribus.

Qualitates.

Eiuſdem eſt temperatura cuius Iris: habita proportione ſatiuorum & ſylueſtrium.

Iris

Iris syluestris altera.

Gallis, aultre flābe sauuage.



Locus, & Qualitates.

Vide quæ dicta sunt de Iride domestica, & Syluestri.

Acorum: Græcis, ἄκορον: Arabibus, Vage, ſiue Vgi: Medicis & Seplaſiariis, ſed falſò, Calamus odoratus.



Locus ex Apuleio.

Naſcitur in cultis, Pratis, & Hortis.

Qualitates.

Gale. li. 6. ſimp. me. *Guſtu acre, modice amarum, odoréque non iniucundum: Vnde conſtat id eſſe facultatis calidæ, & conſiſtentiæ tenuis.*

Acorum falſum: Gallis, Flambe de riuieres, ou de marais: Germanis, Geel Lilien, ſiue Acker vvurtz.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in paluſtribus & aquoſis.

Qualitates ex Fuchſio.

Deſiccat, nec tamen valde excalfacit.

Meum, siue Anethum tortuosum: Græcis μῆον: Arabibus Mu: Italis, Meo: Germanis, Baer vvurtz: Hispanis, Pinillo.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Campestribus, & cultis: maximè in Hispania.

Qualitates.

Gal. li. 7. simp. me.

Excalfacit tertio, & desiccat secundo ordine.

Cype

Cyperus: Græcis, κύπειρος: Arabibus, Saherade: Italis, Cypero: Germanis, Vuilder Galgan: Hiſpanis, Ioncia de Olor, ſiue Ioncia Auellanda: Gallis, Souchet.



Locus.

Naſcitur in lacunoſis, Paluſtribus, & cultis.

Dio. li. 1. cap. 4.

Qualitates.

Cyperi radices excalfaciunt pariter & exiccant abſque mordacitate. Habent etiam aliquid incidentis facultatis.

Gal. li. 7. ſim. me.

Piper

Piper Indicum, siue Siliquastrum: Italis, Pepe Indico: Germanis, Indianisch Pfeffer: Gallis, Poyure d'Inde.



Locus ex Fuchsio.

Exoticum est: & seritur in hortis.

Qualitates ex eodem.

Excalfacit, & desiccat vehementer: quod indicat vehemens seminis acrimonia, & foliorum amaritudo.

Nar

Nardus Indica, ſiue Spica Nardi: Græcis, Νάρδος, καὶ νάρδου στάχυς: Arabibus, Stumbel, ſiue Seubel: Germanis, Edelfrembd, Vvolriechent, ſiue Spicken Nardi: Hiſpanis, Hazumbar, ſiue Eſpiga ſil: Officinis, Spica nardi.



Locus.

Naſcitur in montibus, & vliginoſis locis, in Syria. Dio. li. 1. cap. 6.

Qualitates.

Excalfacit exceſſu primo, & deſiccat ſecundo iam completo. Gal. li. 8. ſim. me.

Nard

Nardus Italica, ſiue Nardus mas: Italis, Spigo: Gallis, Aſpic.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in montibus, & locis Saxoſis.

Qualitates, ex Matthiolo.

Excalfacit & exiccat ordine ſecundo completo, vel tertio inchoante, viribus à Nardis non longè recedentibus.

Lauendu

Lauendula, ſiue Nardus Fœmina: Germanis, Lauendel: Italis, Lauendula: Gallis, Lauande.



Locus, & Qualitates.

Vide quæ dicta ſunt de Nardo Italica: huc enim ſunt referenda.

Nar

Nardus Celtica: Græcis, νάρδος κελτικὴ: Italis, Nardo Celtico: Gallis, Nardus Gaulois.



Locus.


Dioſ.li.1. cap.7. *Naſcitur in Liguria Alpibus, & apud Noricos.*

Qualitates.

Gal. li.8. ſimp.me. *Imbecillior eſt alijs Nardis, ad omnia, præterquàm ad prouocãdam Vrinam: ſiquidem calidior illis eſt ſed minus adſtringit.*

Nardum

Nardum syluestre, siue, Asarum: Græ-
,ἄσαρον,καὶ ναρδ@ ἀγρία: Arabibus, Asa
n: Italis, Asaro, siue Bacchara: Germa-
s, Hasel Vvurtz.: Hispanis, Asara Baccara:
allis, Cabaret.



Locus.

Nascitur in vmbrosis montibus. Diosc. li. 1. cap. 9.

Qualitates.

Facultatis est calida & cōsistentia tenuis: magis autem quàm Acorum. Gale. li. 6 simp. me.

b Phu

Phu magnum, Valeriana maior, siue Syluestris Nardus: Græcis, φοῦ, καὶ νάρδος ἀγρία: Arabibus, Fu: Italis, Valeriana: Germanis, Baldrian: Hispanis, Yerua benedetta: Gallis, Valerienne.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur in vliginosis, secus aquarum decursus, & in frutetis.

Qualitates.

Gal. li. 8. sim. me. *Excalfacit excessu primo: & desiccat secundo iam completo.*

Phu

Phu minus, siue, Valeriana Pratensis: Gallis, Valerienne des Prez.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur in vliginosis, & aquosis.

Qualitates.

Refer huc quæ dicta sunt de Valeriana maiore.

Caſsia ſolutiua, ſiue, Siliqua Aegyptia: Officinis, Caſſia: Gallis, Caſſe laxatiue.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in Aegypto, circa Memphin.

Qualitatis ex eodem.

Pulpa eius excalfacit, & humectat ordine primo.

Pſeu

Pſeudocoſtus, ſiue, Coſtus adulterinus: Gallis, Coſtus baſtard.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in Gargano Apuliæ Monte.

Qualitates ex eodem.

Excalfacit vehementer.

Iuncus odoratus: Græcis, σχοῖνος ἀρωματικὸς: Arabibus, Adcher: Officinis, Squinanthum: Italis, Ionco odorato, siue, Squinantho: Germanis, Kamelstro Hevv: Hispanis, Paya de la Mequa: siue, Paya de Chamellos: Gallis, Squinanthum.

Theo. li. de natu. plan. capi. 7.



Locus.

Nascitur in Palustribus conuallium, trās Libanū montem,

Qualitates.

Modicè excalfacit, modicè astringit, nec planè à tenuitatis natura alienus est.

Gal. li. 5. simi. me.

Calamus odoratus: Græcis, κάλαμος ἀρωματικός. Gallis, pleume odoratte



Locus.

Nascitur in palustribus, trans Libanum Montem. Theo. de na. plan. li. 9. ca 7

Qualitates.

Leniculam quandam astrictionem, ac minimam acrimoniã possidet: magnaq; ex parte essentia eius terrena est, & aërea, in caliditatis frigiditatisq; cõiugatione temperata. Gal. li. 8. sim. me.

Muſcus: Græcis, βρύον, καὶ σπλάγχνον: Arabibus, Axnech ſiue Vſnee: Officinis, Vſnea: Italis, Moſco: Germanis, Mooſz: Gallis, Mouſſe.



Locus ex Matthiolo.

Inuenitur in Quercubus, Piceis, & Populis albis.

Qualitates.

Gal. li. 6. ſim. me.

Vim habet adſtringentem inualidam: nec enim multum eſt frigidum, medicamentũ ſed propinquũ medijs: quia videlicet, & digerendi, & emolliendi facultatis eſt particeps.

Croc

Crocum, siue Crocus: Græcis, κρόκος: Arabibus, Zahafaran: siue, Zafaran: Italis, Zaffarano: Germanis, Saffran: Hispanis, Azafran: Gallis, Saffran.

Locus ex Fuchsio.



Seritur radice in hortis.

Qualitates.

Paululum adstringens quid obtinet, quod terreũ, & frigidum est: sed superat in eo calfaciẽs & qualitas, & facultas: ut tota eius essentia secundi sit ordinis excalfacientium, & primi exiccantium. Concoquit etiam, adiuuante pauca adstrictione.

Gal. li.7. sim. me.

Helenium, siue Enula Campana, Græcis, ἑλένιον: Arabibus, Iasim, siue, Rasen: Italis, l'Elia, Enoa, siue Enola: Germanis, Alant: Hispanis, Raiz de alla: Gallis, Aulnee, siue, Herbe de l'Aune.



Locus.

Diosc. li. 1. cap. 27.

Nascitur in mōtanis, & umbrosis, et siccis locis.

Qualitates.

Gal. li. 6. sim. me.

Non excalfacit primo occursu: calida enim & sicca est, sed cum recrementitio humore.

Gelsi

Gelſiminum: Arabibus, Zambach, ſiue, Sambach, aut Ieſemin. Gallis, Ieſſemin: Italis, Gelſimino.



Locus ex Matthiolo.

Seritur in hortis: exoticum enim cenſetur.

Qualitates ex Serapione.

Excalfacit ordine ſecundo.

Styrax:

Styrax: Arabibus, Miha, Meha, Mehaha seu Aſtarach: Officinis, Storax calamita: Italis, Stirace: Hiſpanis, Eſtoraque.



Locus.

Pli. li. 12. cap. 25.

Naſcitur in Syria Iudaea, circa Gabala, & Marathunta, & Caßium Seleuciae montem.


Qualitates.

Gale. li. 8 ſim. me.

Excalfacit, emollit, concoquit.

Pinus

Pinus: Græcis, πεύκη: Arabibus, Sonobar: Italis, & Hiſpanis, Pino: Germanis, Hartzbaum ſiue Kinholtz: Gallis, Pin.



Locus.

Naſcitur in montibus & Syluoſis.

Plin. libr. 16. ca. 18

Qualitates.

Nux Pinea boni ac craſſi eſt ſucci, multúmque nutrit: non tamen facilè coquitur.

Gal. li. 2. de alim. facul.

Picea

Picea : Græcis, πιτὺς, Arabibus, Arz: Italis, Pezzo: Germanis, Rot Dannebaum: Hispanis, Pino negro: Gallis, Pesse, Pignet, siue, Garipot.




Locus.

Plin. lib. 16.ca. 18

Nascitur in montium iugis.

Pinus Syluestris: Gallis, Pin sauuage.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montium iugis.

Pinus ſylueſtris, Ananienſibus dicta, Mughi.




Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in prealtis Montium iugis.

Pinus

Pinus Syluestris Italis dicta Cembro, & Cirmolo.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in praealtis Montium iugis.

Pinus maritima, primi generis.




Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Maritimis.

Pinus

Pinus maritima altera.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Maritimis.

Larix, Græcis, & Latinis: Italis autem dicta Larice, siue, Larege: Germanis, Lerchembaum: Gallis, Melze, siue Meleze.

Plin. lib. 16. cap. 18

Galen. libro 3. de compo. medica. per gen.



Locus.

Nascitur in montium Iugis.

Qualitates Resinæ Larignæ.

Resina Larigna cæteris humidior est: substantia verò similis liquidæ Piceæ: acrior autem odore, gustu, & facultate, Terebynthina.

Abies

Abies: Græcis, ἐλάτη: Italis, Abete: Germanis, Thannen, ſiue Thannebaum: Gallis, Sapin.



Locus.

Naſcitur in montibus: & in valles etiã deſcendit.

Plin. lib. 16. ca. 18.

Qualitates.

Inter Reſinas, cæteris odoratiores habentur Terebinthyna, & Abiegna: calidior autem eſt poſterior, priore.

Gale. li. 3. de comp. medi. per gene.

Lentiſcus: Græcis, Σχῖνος: Arabibus, Daru: Italis, Lẽtiſco: Hiſpanis, Mata, ſiue Arueira: Gallis, Lentiſque: Germanis, Maſtix baum.

Locus ex Matthiolo.

Gal. li. 8. ſimpl. medica.



Naſcitur in planiciерum & collium ſyluis, & in maritimis, collapſiſque ædificijs & ruderibus.


Qualitates.

Lentiſcus facultate ex aquea eſſentia leuiter calida, & terrena frigida non pauca compoſitus eſt: ob quã moderatè adſtringit. Deſiccat igitur ſecũdo ordine completo, aut tertio incipiente: in caliditatis & frigiditatis differentia quodammodo eſt medius & ſymmetrus.

Tere

Terebynthus: Græcis, τέρμινθος: Arabibus, Baton, Boton, Botin, Albotin: Gallis, Terbentin.

Locus ex Matthiolo.



Amat montes, Rudera, & collapsa ædificia.

Theoph. de natu. plan. li. 3. cap. 15.

Qualitates.

Terebinthi tum folia, tũ cortex, tum fructus adstrictorium quiddam obtinẽt: sed & secundo excalfaciunt ordine. Desiccãt quidem recentes modicè: sicci verò, ordine secundo.

Cal. li. 8. simpl. medica.

Qualitates Resinarum in genere.

Resinæ omnes desiccant, & excalfaciunt.

Gal. li. 8. simpl. medica.

Cupressus: Græcis, κυπάρισσος: Arabibus, Saro, siue Seru: Italis, Cipresso: Gallis, Cyprés.



Locus.

Pli. li. 16. cap. 18.

Odit aquosos tractus: & Montibus delectatur: Cœta est illi proprium natale solum.

Qualitates.

Gale. li. 7. simpl. medica.

Cupreßi folia, germina, pilulæ recentes, desiccant, absque insigni acrimonia.

Iuni

Iuniperus: Græcis, ἀρκευθὶς: Arabibus, Arconas, siue Archencas: Italis, Ginepro: Germanis, Vveckholter, siue krametbaum: Hispanis, Enebro: Gallis, Geneure.



Locus.

Montosis, collibus, & locis aridis delectatur.

Pli.li. 16. cap.18.


Qualitates.

Iuniperus calida & sicca vtrinque, tertij ordinis.

Gale.li.6. simpl.medica.

Sabina: Græcis, βράθυς: Arabibus, Abel, Abhel, siue Alharar: Italis, Sabina: Germanis, Seben baum: Hispanis, Sabina: Gallis, Sauinier.

Locus ex Fuchsio.




Nascitur in montibus: & seritur in hortis.

Qualitates.

Gale. li. 6. simp. medica.

Vehementer desiccat: particeps itē est acrimoniæ consistentis in temperamēto calido: & amaritudinis & adstrictionis obscurioris quàm in Cupresso. Ita vt sit tertij ordinis excalfacientium, & desiccantium, & maximè tenuium partium.

Cedrus Phœnicia: Grecis, ὀξυκέδρος Arabibus, Serbin: Italis, Cedro: Gallis, Cedre.



Locus.

Montibus delectatur.

Pli.li.16. cap.18.

Qualitates.

Cedrus est calida siccaque temperatura, tertij quodammodo ordinis, secundum vtrunque.

Gale.li.7. simpl.medica.

Cedrus Lycia: Gallis, petit Cedre.



Locus & Qualitates.

Huc referenda sunt omnia quæ de Oxycedro dicta sunt.

Laurus: Græcis, Δάφνη: Arabibus, Gaur, siue Gar: Italis, Lauro: Germanis, Lorbeerbaum: Hispanis, Laurel, siue, Loureiro: Gallis, Laurier.

Locus.



Nascitur in montibus syluosis: & vbique seritur.


Plin. l. 6. cap 18. Gal. li. simpl. medica.

Qualitates.

Folia & fructus desiccant, & calfaciunt vehementer: plúsque etiam fructus quam folia. Radicis cortex minus quidem acris est, & calidus, plus tamen amarus: habétque etiam adstrictionis nonnihil.

Plata

Platanus, Latinis, & Græcis: Arabibus autem, Dulb: Italis, Platano: Gallis, Plan, siue Plane: Germanis, Masz holder.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur iuxta flumina, & in aquosis.


Qualitates.

Gale. li. 8. simpl. medica.

Humidioris, frigidiorísque essentiæ est, non ita multò quàm symmetra.

Fraxinus

Fraxinus: Græcis, μελία: Italis, Fraſſino: Germanis, Eſchern, Eſchebaum, ſiue Steyneſchern: Hiſpanis, Freſno, ſiue Frexo, Gallis, Freſne.



Locus.

Naſcitur in montibus aquoſis.

Qualitates.

Adſtringit, abſtergit & potu pernicioſa eſt.

Plin. libr. 16. ca. 18. Dioſcor. lib. 1. cap. 92.

Dictamus albus: Gallis, Dictam blanc.



Locus.

Montibus sylnosis delectatur.

Qualitates ex Matthiolo.

Excalfacit: & suapte vi pollet aduersus omnia venenosa, sed & ad pestilentiam.

Populus

Populus alba: Græcis, λεύκη: Arabibus, Haur: Italis, Popolo bianco: Germanis, Bellen Popel baum, siue Sarbaum: Hispanis, Alamo blanco: Gallis, Peuplier.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur iuxta flumina, & in aquosis Montibus itẽ gaudet.

Plin. libr. 16. ca. 18. Gal. lib. 7. simpl. medica.

Qualitates.

Mista quodammodo tẽperaturæ est ex aquea tepida, & terrena extenuata essentia: quamobrem & abstergentis facultatis est particeps.

Populus nigra: Græcis, αἴγειρος. Arabibus, Haur romi: Italis, Popolo nero: Germanis, Aſpen, ſiue Poppel vueiden: Hiſpanis, Alamo nigrillo: Gallis, Tremble.

Locus ex Matthiolo.

Plin. libr. 16. ca. 18. Gal. li. 6. ſimpl. medica.



Naſcitur iuxta flumina, & in aquoſis, montes etiam amat.

Qualitates.

Flores ſunt calidi in primo receſſu à temperatis. Sed in differẽtia quæ habetur in ſiccando & humectando, paulùm à temperatis & mediis ad ſiccius deflexerunt: Verùm & ſubtiliorum potius quàm craßiorum ſunt partium. Folia floribus ſunt imbeciliora. Reſina floribus calidior eſt.

Populus

Populus Alpina, ſiue Lybica: Græcis, κερκίς: Gallis, Eſpece de Tremble.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in nemoroſis, & montibus.

Qualitates.

Huc refer quæ de Populo nigra dicta ſunt.

Betula: Italis, Bedollo, siue Betula: Germanis, Birck, Gallis, Boule, Byole, siue Bouleau.



Locus.

Nascitur in aquosis, & iuxta aquarum decursus, & amat tractus frigidos & niuosos.

Plin. libr. 16. ca. 15.

Qualitates, ex Matthiolo.

Liquor, qui ex eius incisione prodit, incidit, & abstergit.

Vlmus:

Vlmus: Græcis, πτελέα: Arabibus, Didar, Dirdar, siue Luzach: Italis, Olmo: Germanis, Ylmen, Ristenholtz, Lindhast, siue Yffenholtz: Hispanis, Vlme: Gallis, Orme.



Locus.

Planicie & montibus gaudet Vlmus.

Plin. libr. 16. ca. 18. Gal. li. 8. simpl. medica.

Qualitates.

Adstringentem pariter et abstergentem habent facultatem folia. Cortex amplius etiam subamarus est, & adstrictorius: et vim spissandi habet. Radices eandem vim obtinent.

Qualitates ex Plinio.

Folia, cortex, & rami, vim habent spissandi. Plin. libr. 24. cap. 8.

Arundo: Græcis, *κάλαμος*: Arabibus, Caſab: Italis, Canna: Germanis, Cor: Hiſpanis, Cānas: Gallis, Cannes, ſiue Roſeaux.

Locus, ex Matthiolo.



Naſcitur in paluſtribus, & aquoſis.

Qualitates.

Gal. li. 7. ſimpl. medica.

Abſtergentem facultatem poßidet nō paucam, minimeque acrem. Folia abſtergunt. Cortex combuſtus tenuium admodum eſt partium, & digerentis facultatis. Abſterſorium etiam quiddam obtinet: vt exiccet & excalfaciat tertio quodammodo ordine: plus tamen deſiccet, quam excalfaciat.

Myrica

Myrica, ſiue Tamarix: Græcis, Μυρίκη: Arabibus, Tarfa, ſeu Carfa: Italis, Tamarigio: Germanis, Tamarisken, ſiue, Porſt: Hiſpanis, Tamargueira, ſiue Tamaris: Gallis, Tamarisc.



Locus.

Naſcitur apud pigras, & ſtagnantes aquas: et iuxta fluuiorũ ripas. Dio. li. 1. cap. 99.

Qualitates.

Abſtergentis eſt ac incidentis facultatis, abſque perſpicua deſiccatione. Habet etiã adſtrictionem nonnullam. Gal. lib. 7. ſim. me.

Erica: Græcis, ἐρείκη: Italis, Erica: Germanis, Heyden: Hiſpanis Queiro: Gallis, Bruyere.

Locus ex Fuchſio.



Naſcitur in campeſtribus: et colles amat ſabuloſos. Sylnoſis item gaudet.

Qualitates.

Gal. li. 5. ſim. me.

Digerendi, per halitũ. facultatem obtinet.

Ex Fuchſio.

Calida eſt & ſicca: vt ex amaritudine conijcitur.

Erica

croist es champs & aux petits [illegible]
sablonneuses
[illegible]
[illegible]

Erica altera: Gallis, Seconde eſpece de Bruyere.




Locus & Qualitates.

Huc refer quæ de Erica priore dicta ſunt.

La qualité
Elle obtient le pouvoir de guerir la ... haleine
Elle est chaude & seiche en [illegible] estime par son amertume

Rhamnus, Latinis, & Græcis: Arabibus verò, Nausig, siue, Nausegi: Italis, Rhamno, siue, Marruca: Hispanis, Scambrones: Gallis, Burguespine, siue, Neprun: Germanis, Falbaum.



Locus.

Fructicat in sepibus.

Qualitates.

Dio. li.1. cap. 102. Gal. li.8. sim. me.

Desiccat & digerit excessu secundo: refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente.

Rhamnus ſecundus.

Gallis, le ſecond Burgueſpine



Locus, Qualitates,

Huc refer omnia quæ dicta ſunt de Rhamno primi generis.

Rhamnus tertius.



Locus, Qualitates.

Huc refer quæcunque dicta sunt in Rhamno primi ordinis.

Spino

Spino Merlo, Spin Ceruino, siue Spin guerzo Italis.



Locus.

Fructicat in sepibus.

Qualitates ex Matthiolo.

Baccarum succo vtuntur Pictores; vbi colore viridi inficere sit opus.

Hali

Halimus, ſiue Atriplex marinus, Græcis, ἅλιμος: Arabibus, Molochia: Italis, Bidone, ſiue Halimo: Gallis, Franche Pute, ſiue blāche Pute.

Locus.

Dioſ. li. 1. cap. 10;. Gal. li. 6. ſim. me.



Naſcitur in ſepibus, & maritimis.

Qualitates.

Guſtus ſalſi eſt, & adſtringentis: ex quibus palàm eſt, ipſam eſſe diſſimilarē. Maior autē pars eius ſubſtātiæ calida eſt temperatè, cum humiditate incōfecta, & leuiter flatuoſa.

Paliu

Paliurus Aphricana: Theophrasto, Agria, siue Aria, aut Agrifolium: Italis, Agrifoglio: Gallis, Houx.



Locus.

Nascitur in nemorosis, & locis aridis nec minus quoque dilutis.

Theo. li. 3. cap. 17. de natu. plant.

Qualitates.

Folia & radices non obscurè adstringunt, & digerunt. Fructus verò valde incidunt.

Gal. li. 8. sim. me.

Acuta

Acuta Spina, siue, Oxyacantha, Græcis, ὀξυάκανθα: Arabibus, Amirberis, Amirbaris, siue Berberis. Italis, Bagaia, Amperlo, Pan d'Orso, siue Barazzo bianco: Gallis, Aube-spin: Hispanis, Pirlitero, siue Pilliriteros.



Locus ex Matthiolo.

Gal. li.8. sim. me.

Fructicat in sepibus, & nemorosis.

Qualitates.

Fructus tenuium est partium, & paulùm quiddam incisiuũ habet: cætera Pyro similis.

Berb

Berberis vulgaris, siue Crespinus: Italis, Crespino: Germanis, Versich: Gallis, Espine-vinette.

Locus ex Fuchsio.



Fructicat in sepibus, frutetis, montosis, & locis siccis & aquosis.

Qualitates ex Fuchsio.

Adstringit & d. siccat: refrigerat autẽ & desiccat in secundo ordine. Fructus quiddam incidens obtinet & tenuium est partium.

Vua

Vua crispa: Italis, Vua Spina, Vua Marina, siue vua crespina Germanis, Vveg dorn, siue Creutz beer: Gallis, Groiselier.



Locus ex Fuchsio.

Fructicat in sepibus.

Qualitates ex Fuchsio.

Adstringit & refrigerat primo ordine completo, aut secundo incipiente, desiccat autem in secundo.

Ribes

Ribes vulgaris: Italis, Ribes: Germanis. S. Iohans Treublin: Gallis, Ribettes, Raiſins d'oultre Mer, ſiue, Groizelles d'outre Mer.



Locus ex Fuchſio.

Septis & hortorum areis ſepiendis accõmodatiſsimus eáque de cauſa ſeritur hodie.

Qualitates ex Fuchſio.

Folia & fructus valde adſtringunt. Arabibus refrigerat & deſiccat in ſecundo ordine.

Liguſtrum: Græcis, κύπρος: Arabibus Kenne, Henne, ſiue Hanne: Officinis, Alcanna: Italis, Guiſtria, Oliuella, Oliuetta, ſiue Chambroſſene: Germanis, Rheinvveiden, Beynhoëltzlin, ſiue Mund holt, ſiue Hartrigel: Hiſpanis, Alfena, ſiue Allena: Gallis, Troëſne, ſiue Frezillon.

Pli. li. 16. cap, 18.

Gal. li. 7. ſimpl. medica.



Locus.

Innaſcitur Sepibus: & ſecundum Plinium gaudet aquoſis.

Qualitates.

Folia & ſumma germina temperamenti ſunt maximè miſti: habent enim quiddam digerētis, cum aquea ſubſtātia modicè calida: habéntque etiam ad ſtrictorium quiddam ex terrena ſubſtantia frigida. Deſiccant item abſque morſu.

Phyl

Phyllirea, Latinis, & Græcis: Arabibus autem Mahaleb.



Locus.

Naſcitur tantum in aſperis montibus. Dioſ.li.1. cap. 108.

Qualitates.

Folia adſtringunt, Dioſc.ſupra eo.

 Tilia

Tilia: Græcis, φιλύρα: Italis, Tilia: Germanis, Linden: Gallis, Til, siue Tillet.

Plin. lib. 16. cap. 18



Locus.

Nascitur in montium iugis aquosis.


Qualitates ex Dioscoride, & Fuchsio.

Cortex vim spissandi habet: folia autem, discutiendi, Tilia calida est: amaritudine & lentore gustu abundans. Abstergit igitur, & leuiter adstringit.

Cistus

Ciſtus Mas: Græcis, κίστος, ἢ κίσθαρον, καὶ κίσσαρον: Arabibus, Kaniet, Altheis, ſiue Lhaie Althis: Italis, Ciſto: Hiſpanis, Cerguacos.

Locus ex Matthiolo.



Aſpera loca, & montium iuga amat.

Qualitates.

Aſtringit: Folia autem & parua germina valde deſiccant, & adſtringunt. Flore verò non inſtrenuè deſiccant: vt ſint ſecundi exceſſus à temperatis abſoluti.

Gale. li. 7. ſimpl. medica.

Ciſtus Fœmina.



Locus, & Quali-
tates.

Huc refer quæ de Ciſto mare dicta ſunt.

Hypo

Hypociſtis.



Locus.

Naſcitur iuxta Ciſti radices.

Dioſ.li.1. cap.109.

Qualitates.

Magis adſtringit quàm folia Ciſti: roborat autem & confirmat corpora.

Ledum: Græcis λῆδον: Arabibus, Chaſus, Ledi Lentor, ſiue pinguitudo: Græcis, λάδανον: Arabibus, Ieden, ſiue, Laden: Officinis, Ladanum: Italis, Laudano, ſiue Odano Hiſpanis, Xara.

Locus.



Naſcitur in calidioribus regionibus.

Qualitates.

Eiuſdem temperamenti eſt cum Ciſto: calidius tamen cenſetur.

Gal. li. 7. ſimp. medica.

Qualitates Ladani.

Calidum eſt exceſſu primo quodammodo completo: vt videlicet & ſecundum attingat. Habet etiam adſtrictionis paululum. Adhac, ſubſtantia tenui: ac proinde emolliens, moderatè digerens, & concoquens.

Roſa

Rosa: Græcis, ῥόδον: Arabibus, Nard, Narõ, seu, Vard: Italis, Rosa: Germanis, Rosen: Hispanis, Rosas: Gallis, Rosier: Flores autem, Roses.



Locus ex Fuchsio.

Domestica, nascitur in Hortis: Syluestris vero, Septis & Campestribus gaudet.

Qualitates.


Constat ex aquea substantia calida, mista duabus alijs qualitatibus, adstringenti videlicet, & amara.

Gal. li. 7. simp. medica.

Lycium

Lycium: Græcis, λύκιον. ἢ πυξάκανθα: Arabibus, Hadhadh, Hadad, Kilulem, siue, Felzakarag: Officinis, Lycium.

Dio. li. 1. cap. 114. Gal. lib. 7. simp. me.



Locus.

Asperis gaudet.

Qualitates.

Facultatis est exiccatoriæ, compositum ex diuersi generis substantiis: altera quidem tenuium partiũ digerente atque calida: altera terrestri, & frigida, ex qua adstrictionem obtinet.

Qualitates Lycij.

Digerit & desiccat in secundo recessu: in calore autem mediis & symmetris proximum est.

Aca

Acacia, Latinis, & Græcis: Arabibus autem, Achachie: Officinis Acacia.



Locus.

Nascitur in Aegypto, & in Thebano agro, in syluis riguis.

Theoph. de natu. plan. l. 4. cap. 3. Gal. li. 6. simp. me.

Qualitates.

Frigidum est & terrosum, immista quadam etiam essentia aquea. Nec est similare: tenues enim & calidas partes in se dispersas habet, quæ in ipsa ablutione segregantur: vt sit tertij ordinis exiccantium, & secundi refrigerantium, vbi elotum fuerit: illotum verò primi.

Vitix

Vitex, Salix Amerina, siue Agnus castus Græcis, ἄγνος καὶ λύγος: Arabibus, Famanchest, Samanchest, siue Bengiechest: Italis, Vitice, siue Agno Casto: Germanis, Schaffs mulle, siue Kenschlamp: Hispanis, Gatillo casto: Officinis, Agnus Castus.

Locus.

Diosc.li.1. cap.116.



Nascitur in fluminum ripis, asperisque locis, ac torrentium alueis.

Qualitates.

Gale.li.6. simp.me.

Excalfacit & desiccat in tertio ordine: & valde tenuium est partium. Folia, et semen calida, siccáque facultate sunt: substantia verò tenui.

Salix

Salix, siue Vitex: Græcis, ἰτέα: Arabibus, Bulef, Bhulles, Saffaf, siue Chalif: Italis, Salice, siue Salcio: Germanis, Vueiden, siue Felbinger: Hispanis, Salce, siue, Salgueiro: Gallis, Saulx.

Locus.



Nascitur in aquosis. Pli. li. 16. cap. 18.


Qualitates.

Folia vim spissandi habent: Flores verò desiccãt absque morsu. Habet etiam quandam adstrictionem Salix. Gale. li. 6. simp. me.

Oleaster

Oleaſter, ſiue Olea Syluestris : Grecis, ἀγριελαία, ἢ κότινος : Italis, Oliuo ſaluatico: Germanis, Vuilder oelbaum : Hiſpanis, Azebuche: Gallis, Oliuier ſauuage.

Pli. li. 16. cap. 18. Gale. li. 6. ſimp. me.



Locus.

Naſcitur in montibus cãpeſtribus, & inſulis.

Qualitates.

Oliuæ rami quantum habent adſtrictionis, tantæ & frigiditatis participes ſunt. Fructus verò, ſi quidem perfectè maturus eſt, moderatè calfacit: ſin immaturus, magis tum adſtringit, tum refrigerat.

Olea

Olea ſatiua: Græcis, ἐλαία ἥμερος: Arabibus, Zaiton, ſiue Caiton: Italis, Oliuo domeſtico: Germanis, Oelbaum: Hiſpanis, Oliuo, ſiue Azeytuno: Gallis, Oliuier.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in planicierum collibus: & quandoque montes aſcendit.

Qualitates.

Huc refer quæ de Oleaſtro dicta ſunt.

Quercus: Græcis, Δρῦς: Arabibus, Chullot, Hullet, siue Belut: Italis, Quercia: Germanis, Eychbaum: Hispanis, Robre: Gallis, Chesne.

Locus.

Pli.li.16. cap.18.



Descendunt & in plana Quercus.

Qualitates.

Gal.lib.6. simp.me.

Quercus partes omnes adstringẽtis qualitatis participes sunt. Sed plus tamen habet adstrictionis, quæ in trũci cortice membrana subest: tum quæ sub glandis ipsius caliculo, ea videlicet quæ fructus carnem conuestit. Folia etiam non instrenuè desiccant.

Fagus

Fagus: Græcis, φηγὸς: Arabibus, Chinars, siue Chiachas: Italis, Faggio: Germanis, Burch baum: Hispanis, Haia: Gallis, Fau.



Locus.

Planicie & colliculis delectatur.

Pli. li. 16. cap. 18. Gale. li. 6. simp. me.

Qualitates.

Valentius astringit quàm Quercus, cætera, Quercubus simillima.

Ilex: Græcis, πρίνος: Arabibus, Carmas, ſiue Barbes: Hiſpanis, Anzina, ſiue Anzinheira: Italis, Elice: Germanis, Steehend Palmen: Gallis, Yeuſe.



Locus.

Subit montoſa.

Qualitates.

Pli. li. 16. cap. 18. Gale. li. 6. ſimp. me.

Vim & qualitates Quercus habet: ſed va lentius adſtringit.

Suber

Suber: Italis, Souero: Gallis, Liege.



Locus ex Matthiolo.

Montosis, & planicie gaudet.

Qualitates.

Non instrenuè adstringit: caterà Quercubus similis.

Castaneæ: Græcis, κάστανα. σαρδιαναὶ βάλανοι, ἢ διὸς βάλανοι, ἢ λοπίμα: Arabibus, Sadianalach, Castal, & stebulot: Italis, Castagne: Germanis, Kesten: Hispanis, Marones: Gallis, Arbor, Chastaignier: Fructus verò, Chastaignes,



Pli. li. 16. cap. 18. Dio. li. 1. cap. 122. Gal. li. 2. de alim. facul.

Locus.

Montes & valles diligit.

Qualitates.

Adstringunt: & sunt boni succi.

Galla

Galla: Græcis, κηκὶς: Arabibus, Hafes, siue Hafus: Italis, Galla: Germanis, Galloëpffel, siue, Eicoëpffel: Hispanis, Galla, siue, Bugalla: Gallis, Noix de Galle.



Locus.

Mōtes et valles diligit. Pli. li. 16. cap. 18.

Qualitates.

Galla Omphacitis acerba est, & pleraq; sui parte essentiæ terrenæ, & frigidæ. Itē, repercutit, desiccat & cōstringit. Vt sit, in desiccando, tertij ordinis: secundi autē in refrigerando. Gale. li. 7. sim. me.

Galla plana minus desiccat Galla Omphacitide. Gallæ omnes, crematæ, tum subtiliorum sunt partium, tum maiore desiccandi potestate valent.

Rhus, Fluida Theophraſto Latinè reddito: Græcis, ῥοῦς: Arabibus, Sumach, Roſbar ſadiſticos, ſeu Roſaïdicos: Italis, Rhu, ſiue, Sumach: Germanis, Sumach: Hiſpanis, Sumach, & Sumagre: Gallis, & Officinis, Sumac.



Locus.

Dio. li. 1. cap. 121. Gale. li. 8. ſim. me.

Naſcitur in Petroſis.

Qualitates.

Eſt ex tertio ordine exiccantium: ex ſecundo verò refrigerantium.

Viburnum: Italis, Lantana: Gallis, Viorne, siue Mauſſane.



Locus ex Matthiolo.

Fructicat in ſepibus, & collibus nemoroſis.

Qualitates ex eodem.

Adſtringit: nondum tamen compertæ ſunt huius plantæ qualitates.

Palma: Græcis, *φοίνιξ*: Arabibus, Machla, ſiue Nachal: Italis, Palma: Germanis, Dattel baum: Hiſpanis, Palmera: Gallis, Palmiers, ſiue, Dattiers.

Palmulæ, ſiue Dactyli: Græcis, *δάκτυλοι, καὶ φοίνικες*: Arabibus, Tamar: Italis, Dattoli: Germanis, Dattilen: Hiſpanis, Tamaras, & Dattiles: Gallis, Dattes.

Locus ex Matthiolo.



Naſcitur in maritimis.

Gale.li.8. ſimi.me.

Qualitates.

Palma adſtringit omnibus ſui partibus, Succus ramorum conſtat ex aquea ſubſtantia tepida, & terrea frigida. Palmulæ non paucam obtinent caliditatem, & maximè dulces.

Malum

Malum Punicum: Græcis, ῥοιά: Arabibus, kuman, Ruman, ſeu, Roman: Italis, Melagrano, ſiue, Pomo granato: Germanis: Granatoëpffel: Hiſpanis, Granadas, ſiue, Romanas: Gallis, Pommes de Grenades, aut, Mygraines.

Locus ex Matthiolo.



Seruntur in vinetis, & viridarijs: & ſponte naſcũtur in planicie, & Colliculis.

Qualitates.

Gal. li. 8. ſim. me.

Malũ Granatum omne adſtringentẽ qualitatẽ obtinet: non tamen in omnibus ea exuperat. Acini magis quàm ſuccus, tum adſtringunt, tum exiccant: ijs etiam magis putamina. Adſimilem illis vim habent cytini.

Myrtus

Myrtus: Græcis, Μυρσίνη: Arabibus, Aës, Alas, siue As: Italis, Mirto: Germanis, Vvelsch Heydelbeer: Hispanis, Murta, siue, Raiam: Gallis, Meurte.

Locus.

Pli. li. 16. cap. 18. Gale. li. 7. sim. me.



Nascitur in maritimis, & lacuũ ripis: raro autẽ in montibus, & frigidis tractibus.

Qualitates.

Constat ex contrarijs substãtijs: vincit tamen, in ea, frigidum terrenum: Habet vero et tenue quiddã calidum: vnde valẽter desiccat. Folia, germina, fructus, & succus non parum, inter se in adstrictione dissident.

Myrtus

Myrtus Tarentina.



Locus, & Qualitates.

Huc refer quæ dicta ſunt de Myrto: adſtringit tamen valenter Myrtus: ea enim perficiuntur & criſpantur coria.

Myrtus exotica. Vide quæ de Myrtis dicta sunt.



Cerasia

Cerasia Latinis & Græcis: Arabibus autem, Sarasie: Italis, Ciregie: Germanis, Kirsen: Hispanis, Ceresas: Gallis, Arbor, Cerisier: Poma, Cerises.



Locus.

Nascitur in montibus aquosis, valli bus, et planis. Pli. li. 16. cap. 18.

Qualitates. Gal. li. 7. sim. me.

Cerasus arbor fert fructum non paris adstrictionis in omnibus particulatim plantis participem.

Qualitates ex Dioscor. Dioscor. lib. 1. cap. 129.

Cerasa viridia alvum emolliunt: siccata, sistunt.

Siliquæ:

Siliquæ: Græcis, κεράτια: Arabibus, Charunb: Italis, Carobe, & Caroboie: Germanis. S. Iohans brot: Hiſpanis, Alfarobas: Gallis, Carrouges: Officinis, Carobe.

Locus, ex Matthiolo.

Gal. li. 7. ſim. me.



Planicies amat. Frequens eſt in Regno Neapolitano.

Qualitates.

Ceratonea exiccantis eſt, & adſtringentis facultatis, ſicut & fructus eius. Ceratia humida ventrē ſubducunt: ſicca verò magis ſiſtunt.

Malus

Malus, siue Pomum: Græcis, μηλέα: Arabibus, Tuffa, siue Tusaha: Italis, Pomo, siue Melo: Germanis, Oëpffel, Hispanis, Mansanas: Gallis, Arbor, Pōmier: Fructus, Pōme.

Locus.



Locis cultis innascitur: & inculta montosa & plana amat. Pli. li. 16. cap. 18.

Qualitates

Acida mala frigidum quidem succū habēt: verùm tenuium est partium. Gustu adstringētia succum habent frigidum ac terreum. Dulcia ad calidius vergunt & mediæ sunt temperaturæ. Insipida, & veluti aquosa ad frigidius declinant. Gal. li. 2. de ali. facul.

Cotonea Malus: Græcis, κυδώνιος μηλέα: Arabibus, Saffargel: Italis, Mele Cotogno: Germanis, Kitten, siue Kutten: Hispanis, Mẽbrillos, siue Marmellos, Gallis, Arbor, Coignier: Poma Cydonia: Põmes de Coing.

Locus ex Fuchsio.

Pli. li. 16. cap. 18.



Montes odit. Cultis gaudet frigidis, & humidis: & conualles amat.

Qualitates ex Fuchsio.

Valenter adstringunt, idque ex essentia frigida terrea. Minus humectant quàm reliqua Poma: refrigerant enim ordine primo: & desiccant secundo.

Persi

Perſica Malus: Græcis, περσικὴ μηλέα, ἢ ῥωδάκινα: Arabibus, Sauch, ſiue Cauch: Italis, Peſche: Germanis, Pferſich: Hiſpanis, Pexegos: Gallis, Arbor, Peſchier: Fructus, Peſches.

Locus ex Fuchſio.



Seritur in vinetis, & hortis: & naſcitur in aquoſis.

Qualitates ex Fuchſio.

Folia & parua germina amara ſunt, atque adeò calida: ſed Perſica frigida ſunt & humida in ſecundo exceſſu.

Mala Armeniaca, siue Præcocia: Græcis, μῆλα ἀρμενιακὰ, ἢ πρεκοκκια, καὶ βερικόκκια: arabibus, Mermex, Mirmix, Mex, Mesmei, siue Mismis: Italis, Bacoche, Grisomele, siue Moniache, Germanis, S. Ioans. Pfersich: Hispanis Albiricoques, Albarchigas, seu Aluaricoques: Gallis, Abricoz, Carmaignoles, & Chicandeliz.

Locus ex Matthiolo.

Seritur in hortis & vinetis: aquosis antē gaudet.



Qualitates.

Genere, & dotibus, parū dissidēt à Persicis.

Gale. li. 2. de alim. facul.

Medi

Medica mala, Citromala, siue Mala Citria: Græcis, κίτρ@, μηλικὰ μῆλα: ἢ κεδρόμηλα: Italis, Cedri, & Citroni: Germanis, Citrin oëpffel: Inden oepffel, siue Citronalen: Hispanis, Cidras: Gallis, Citron.

Locus ex Matthiolo.



Seruntur tanquam exotica. Insolatis autem collibus delectãtur.

Gale. li. 6. simp. medica.

Qualitates.

Succus tertij est ordinis resiccantium refrigerantiúmque, & vincentem habet qualitatem acidam & siccam. Cortex verò desiccat: non parũ tamen habet acrimoniæ: vt desiccet secundo excessu. Non tamen frigidus est, sed temperatus, aut paulò infra. Caro craßi succi est, & pituitosa frigidáque. Nucleus amarus est, & discutit: hoc est, calefacit & exiccat secundo recessu.

Citria præsũpta venenis maximè aduersantur.

Mala Limonia: Italis, Lomie, siue Limoni: Gallis, Limons.



Locus ex Matthiolo.

Seruntur tanquam exotica: sed conuallibus delectantur.

Qualitates.

Non longe distant à natura & viribus Citriorum. Tamen cùm sint acidiora, succi frigidioris, & siccioris existimantur.

Auran

Aurantia Mala: Italis, Arancio: Germanis, Pomerentz: Gallis, Pommes d'oreges.



Locus ex Matthiolo.

Collibus, & maritimis gaudet.

Qualitates ex eodem.

Iisdem pollet viribus, quibus Malus Medica: cortice tamen calidiora censenda sunt: quandoquidem is reliquis, acrior, atque amarior gustu deprehenditur.

Pyra: Græcis ἄπια: Arabibus, Humechte, Citmetre, siue Kemetry: Italis, Pere: Germanis, Byren: Hispanis, Peras: Gallis, Arbor, Poyrier: Fructus, Poyres.



Locus.

Pli. li. 16. cap. 18.

Pyrus & montes amat, & planiciem.

Qualitates.

Gale. li. 5. simpl. medica.

Pyra vim habent exiccandi, syluestria tamen magis adstringunt.

Meſpilum: Græcis, μέσπιλον: Arabibus, Zaror, Zarur, & Alzarur: Italis, Neſpolo, Germanis, Neſpel: Hiſpanis, Neſperas: ſiue Azarolo, Gallis: Arbor, Neſplier. Fructus, Neſſle, ſiue Merle.

Locus ex Matthiolo.



Aquoſis montibus, & frigidis locis gaudet. Seritur autem in hortis in agro Neapolitano.

Qualitates.

Vim eandem habent quàm ſorba ſed magis adſtringunt.

Gal. lib. 2. de alim. facul.

Meſpilus altera, ſiue Meſpilus communis.



Locus ex Matthiolo.

Aquoſi. Montibus, & frigidis locis gaudet.

Qualitates.

Vide quæ de Meſpilo primi generis dicta ſunt.

Lotus,

Lotus, siue Celtis: Græcis, λότος δένδρον: Arabibus, Sedar, siue Alsadar: Italis, Bagolaro, siue Perlaro: Hispanis, Almez: Gallis, Alysier, & in Gallia Narbonensi, Micacoulier.



Locus.

Montes & valles amat: imò expetitur domibus ramorum petulantia.

Plin. libr. 16. ca. 30.

Qualitates.

Lotus arbor non ita multa adstrictoriæ qualitatis est particeps, sed & tenuium partium est, & mediocriter exiccatoria.


Gal. lib. 7. simpl. medica.

Cornus:

Cornus: Græcis, κρανία: Italis, Arbór, Corniolo: Fructus, Cornole: Germanis, Arbor, Cornelbaum, Kurbeerbaum, ſiue Dierlem: Fructus verò, Vueiſch Kirſen: Hiſpanis, Cornizolos: Gallis, Arbor, Cornier, Cornoillier, ſiue Cornillier, Fructus, Cornoille.

Locus.

Plin. libr. 16. ca. 18.



Montes amant Plinio: ſeruntur tamen & in hortis.

Qualitates.

Gal. li. 7. ſimpl. medica.

Fructus, folia, & germina acerba ſunt, Galenúsque deſiccant: maximè autem folia, & germina.

Sorba

Sorba, Græcis, σὰ: Italis, Sorbe: Germanis, Speierling, Sporoëpffel, siue, Sperbieren: Hispanis, Sorbas: Gallis, Arbor, Cormier, siue Sorbier: Fructus, Sorbes, & Cormes.



Locus.

Gaude frigidis.

Plin. libr. 16. ca. 18.

Qualitates:

Eandem adstringendi naturam præstant quam Mespila: sed imbecilliore effectu.

Gal. li. 8. simpl. medica.

Prunus

Prunus Arbor: Fructus, Pruna, Græcis, κοκκυμηλέα: Arabibus, Anas, Auas, ſiue Agias: Italis, Pruno, Succino, ſiue Suſino: Germanis, Praumen, Pflaumen, ſiue Kriechen: Hiſpanis, Prunas, Andrinas, ſiue Amexeas: Gallis, Arbor, Prunier: Fructus, Prunes.

Plin. libr. 16. ca. 18.



Locus.

Vbique ſeruntur, & reſtibili fertilitate creſcunt: in montibus tamen non temerè videntur.

Qualitates ex Galeno.

Gale. li. 7. ſimp. me.

Pruna ventrem ſub lucunt: recentia quidem plus, arida verò minus.

Ex Fuchſio.

Domeſtica Pruna moderatè ſunt frigida, & humida: ſylueſtria verò valenter adſtringunt.

Zizy

Zizypha, siue Serica: Græcis, ζίζυφα καὶ ζινζιφα: Arabibus, Hunen, Zufalzef, siue Hanab: Officinis, Iuiubæ: Italis, Giuggiole: Germanis, Rottburst beerle: Hispanis, Azufecifa: Gallis Iuiubes.



Locus

Exotica sunt: seruntur tamen Plinio mense Aprili, grano.

Pli. li. 19. cap. 10.

Qualitates, ex Matthiolo.

Suo lentore sanguinē crassum reddunt: refrigerant tamen, & morbis acutis prosunt.

Ex Galeno.

Exiguum præbent alimentum: difficilè concoquuntur & stomacho inutilia sunt.

alim. l. de facu.

Arbutus

Arbutus siue Vnedo: Fructus, Memæcylus: Græcis, κόμαρος: Arabibus, Hatiladib; Italis, Albatro siue Arbuto: Hispanis, Madronho, siue Madromeiro: Gallis, Arbor, Arbousier: Fructus, Arbouces.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus & vallibus nemorosis.

Qualitates.

Gal. li.7. simp.me. *Arbutus arbor ipsa qualitate acerba vnà cum fructu est. Fructus autem infensus est stomacho, & capiti dolorem infert.*

Amygda

Amygdalæ, Latinis, & Græcis: Arabibus verò, Iauz, Kauz, siue Lauzi: Italis, Mandorle: Germanis, Mandel kern: Hispanis, Almendras: Gallis, Arbor, Amandier: Fructus verò Amandes.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in hortis & vinetis: planis & collibus gaudens.

Qualitates.

Amygdala nihil prorsus adstrictoriæ facultatis sortita sunt: sola enim extenuandi atque abstergendi vi pollent. Item Amygdala amara omnino extenuandi vim poßident. Amygdala dulcia leuiculam amaritudinem poßident, quæ tamen dulcedine superante occultatur: itaque sunt moderatè calida.

Gal. lib. 2. de ali. facul. & li. 6. simpli. medica.

Pistacia, siue Pistacea: Græcis, πιστάκια: Arabibus, Pustech, siue Festuch: Officinis & Barbaris, Fistici: Italis, Pistacchi: Germanis, Vuelsch Bimpernuszlin: Hispanis, Allocigo: Gallis, Pistaches.

Locus, ex Matthiolo.



Germana est Syriæ: seritur tamen in hortis Magnatum, in Italia.

Qualitates.

Gal. lib. 2. de ali. fa.

Parum præbent alimenti: tametsi infarctas humore iocinoris vias expediant, & à vitiis liberent.

Ex Auicenna.

Auicen. lib. 2.

Nauseam discutiunt, & ventriculi os corroborant.

Staphy

Staphylodendron, siue Pistacia agrestia: Gallis, Pistaches sauuages.



Locus,

Arbor est Cisalpina.


Plin. libr. 16. ca. 18.

Qualitates ex Matthiolo.

Nauseam commouet fructus.

Nux Iuglans: Græcis, κάρυα βασιλικά: Arabibus,, Ieuz, Leuz. siue Giauzi: Italis, Noci: Germanis, Nusz, siue Vuelschnusz: Hispanis, Nuezes: Gallis, Arbor, Noyer: Fructus, Noix.

Plin. libr. 16. ca. 18.



Locus.

Seritur vbique, maximè in cultis: nec temerè visitur in montibus.

Qualitates.

Gal. li. 7. simpl. medic. & li. 2. de ali. facul.

Arbor, folia, & Germina adstrictionem quandam possidēt: cæterum euidentem multámque in nucis putamine recenti, & sicco. Viridis, atque etiamnum humida, neque adstringentis qualitatis neque oleosæ conspicuè est particeps: sed est quodammodo qualitatis expers.

Nux

Nux myriſtica: Arabibus, Ieuz baue, Iusbague, ſiue Giauziban: Italis, Noci Moſcate: Germanis, Muſcat nuſz: Hiſpanis, Nuez de eſpecie: Gallis, Noix muſcates.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in inſula Badan, quæ eſt in India.

Qualitates ſecundum Arabas.

Siccant & excalfaciunt ordine ſecundo completo. Adſtringunt, & abſtergunt.

Nuces Auellanæ, Nuces Ponticæ, Nuces Prænestinæ: Græcis, κάρυα πόντικα, καὶ λεπτοκάρυα: Italis, Nocciuole, Auellane, & Nocelle: Cermanis, Haselnuſz: Hispanis, Auellanas: Gallis, Noysilles, Noysettes, Auellaines, Petites, & Melline.

Locus ex Fuchsio

Pingui gaudent solo, & montibus nemorosis.



Gal. li. 7. sim. me. & li. 2. de ali. facul.

Qualitates.

Auellanæ plus habent essentiæ terrestris ac frigidæ, quàm Iuglādes. Quin & plus præbent alimenti: siquidem densiores sunt et minus pingues.

Ex Simeone Sethi.

Calidæ sunt & humidæ.

Morus

Morus Arbor: Morum Fructus: Græcis, Arbor, μορέα, ἢ συκάμινος: Fructus, συκάμινον: Arabibus tam Arbor, quàm fructus, Tut, siue, Thut: Italis, Moro: Germanis, Arbor, Maulberbaum: Fructus, Maulber: Hispanis, Moras del Moral: Gallis, Arbor, Meurier: Fructus, Meures.



Locus.

Montes non adeò amant Plinio: Fuchsio verò, calidis & sabulosis gaudet locis. Quin & seritur in hortis: negligi enim non se permittit.

Plin. lib. 16. ca. 18.

Qualitates.

Mora matura ventrẽ subducũt: immatura, vbi aruerint, admodũ restringũt. Maturorũ succus adstringit mediocriter. Immatura Mora & tota Arbor mistã qualitatẽ habet ex restringẽte & purgante compositã. In radicis cortice purgatoria cum quadã amaritudine exuperat qualitas.

Gal. li. 8. simi. me. & li. 2. de ali. fac.

Sycomorus, siue Ficus Aegiptia: Græcis, συκόμορος: Arabibus, Mumeiz, Iumeiz, Aliumeiz, seu, Guimeizi.



Locus.

Diosc. li. 1. cap. 144.

Aegipto germana est: & nascitur in Caria, Rhodo, locisq; non multum tritici feracibus.


Qualitates.

Emolliendi, digerẽdi, & spissandi vim habet.

Ficus

Ficus, Arbor: Fici, Fructus: Græcis, σῦκα: Arabibus, Sin, Fin, seu Tin: Italis, Fichi: Germanis, Feighen: Hispanis, Higos: Gallis, Arbor, Figuier: Fructus, Figues.

Locus ex Fuchsio.



Locis calidis & insolatis delectatur: seritur itē in hortis & vinetis.

Qualitates.

Gal. li. 2. de ali. fa.

Fici comeabiles sunt, & facilè in totū corpus penetrant: nā abstergendi vi pollent haud obscura. Flatuosi tamen sunt aliquatenus. Itē, Ficus aridæ habent vim excalfaciendi ordine primo etiam completo, aut secundo incipiente. Habent vero etiam partiū tenuitatem quandam. Pinguiores magis concoquunt: gustu acriores magis extergunt ac discutiunt. Arbor tenuium est partium. Lac, & foliorum succus valenter calidus est.

Gal. li. 8. sim. me.

Persea, Latinis, & Græcis.



Theo. li. 4. de na. plant. Gal. li. 2. de cōp. med. sec. loc. Dio. li. 1. cap. 146.

Locus.

Arbor est Aegypti.

Qualitates.

Folia vim adstrictoriam habent.

Iberis

Iberis, ſiue, Lepidium: Græcis, ἰβέρις, καρδαμαντικὴ, καὶ ἀγριοκάρδαμον: Arabibus, Seitaragi, Aſceitaragi, Sitharegi, ſiue, Hauſab: Italis, Iberide, ſiue Lepidio: Germanis, Vvil der Kresz: Hiſpanis, Naſturtio Monteſino: Gallis, Chaſſerage, Paſſerage ſauuage, ſiue Naſitort ſauuage.

Locus ex Fuchſio.



Naſcitur in incultis, iuxta prata, & vias. Dio. li. 1. cap. vlt.

Qualitates. ex Fuchſio.

Iberis eius eſt temperatura cuius Naſturtium: minus tamē deſiccat.

Trit

Triticum: Græcis, πυρὸς: Arabibus, Henta, Henca, siue Hantha: Italis, Grano: Germanis, Korn, siue, Vveyssen: Hispanis, Trigo: Gallis, Fourment.

Locus ex Matthiolo.



Seritur vbique ferè.

Qualitates.

Gal. li. 8. sim. me.

Triticū, vt Medicamentum foris impositum, primi est ordinis excalfacientium: non tamen resiccare, nec refrigerare manifestò potest. Habet verò etiā quiddam viscosum & obstruens. Item:

Idē li. 1. de ali. fa.

in cibum assumptum ægrè concoquitur, flatus excitat, laborem ventriculo infert, & caput vaporibus tentat.

Hordeum

Hordeum: Græcis, κριθὴ: Arabibus, Xahaen, siue Shair: Italis, Orzo: Germanis, Gersten: Hispanis, Ceuada: Galiis, Orge.



Locus ex Matthiolo.

Seritur vbique ferè.

Qualitates.

Primi est ordinis in exiccando, & refrigerando: habet etiam pauxillum abstersionis. Paulò plus desiccat quàm farina fabacea: cætera similia, foris vtentibus. Gal. lib. 7. sim. me.

Zea:

Zæa: Græcis, ζειὰ: Arabibus, Hais: Italis, Zea, Spelta, siue Pirra: Germanis, Speltz. S. Peters Korn, Kin, Korn, siue, Dinckelkorn: Hispanis, Spelta: Gallis, Espeautre.



Locus ex Matthiolo.

Familiaris est Germaniæ, & Italiæ.

Qualitates.

Gal. li. 6. sim. me. *Zea vniuersa sua facultate quodammodo in medio est tritici, & hordei. Itaque ex illis cognoscatur.*

Auena:

Auena, Græcis, Βρῶμος: Arabibus, Cartamum, siue Churtal: Italis, Vena, siue, Biaua: Germanis, Habern: Hispanis, Auena, siue Auea: Gallis, Auoyne.



Locus ex Matthiolo.

Seritur vbique ferè, in iumentorũ pabulum.

Qualitates. Gale. li. 6. sim. me.

Auena, vt medicamentum, similem hordeo vim obtinet: nam illitum, desiccat, & digerit mediocriter, & sine morsu. Temperiẽ autem habet paulò frigidiorem. Nonnihil etiam adstrictionis habet. In cibum sumpta, moderatè calfacit. In alijs, desiccatorium est medicamentum.

Oryza,

Oryza, Latinis, & Græcis: Arabibus autẽ, Arz, ſeu Arzi: Italis, Riſo: Germanis, Reisz: Hiſpanis, Atroz: Gallis, Ris.



Locus.

Dio. li.2. cap. 88.

Naſcitur in paluſtribus, riguisq́ue.

Qualitates.

Gal. li.8. ſim. me.

Habet adſtrictorium quidpiam.

Milium

Milium: Græcis, κέγχρος: Arabibus, Ieuers, Geguers, siue Giaures, Italis, Miglio: Germanis Hirsz: Hispanis, Millo, & Miyo: Gallis, Mil, siue Millet.

Locus ex Fuchsio.



Serendum Agricolæ censent, primò in locis frigidis & humidis: deinde in calidis. Palustribus, & pingui solo delectatur.

Qualitates.


Primo ordine refrigerat: exiccat verò tertio exoluto, aut certe secundo interso. Paululum etiam habet tenuitatis. Estum minimũ confert nutrimenti: sed & ventrem desiccat. Appositum, citra morsum desiccat,

Gal.li.7. simp. medica.

Panicum: Græcis, ἔλυμος: Arabibus, Dochon: Italis, Panico: Germanis, Pfenich: Heydel pfenich pray, siue Fuchsschvvantz: Hispanis, Panizo, siue Paniso: Gallis, Paniz.

Locus ex Fuchsio.

Pulueruleno, & subtilissimè subacto solo delectatur: sed nec sabulosa respuit.



Qualitates.

Gal. li. 6. simpl. medica.

Pauci est nutrimenti, & exiccatorium. Adstringit item ut Milium. Illitum, exiccat atque refrigerat.

Sesa

Sesamũ siue Pseudolinũ: Græcis, Σήσαμον: Arabibus, Semsem, siue Sensera: Italis, Sesamo: Germanis, Leindotter: Hispanis, Iorgilim, siue Alegria: Gallis, Iugioline.

Locus ex Matthiolo.




Seritur: verùm, nihilaquè emacrat Solum. Indis familiarissimum est.

Qualitates.

Sesamum non parum continet in se viscosum, & pingue: quare emplasticum, est & emolliens ac modicè calidum.

Gal. li. 8. simpl medica.

Sesamum aliorum.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnia quæ de priore Sesamo di-ecta sunt.

Lolium

Lolium: Græcis, αἶρα: Arabibus, Sceilem, siue Zeuen: Italis, Loglio, siue Gioglio: Germanis, Tvvalch trespe, Rue vveyssen, siue Lulch: Hispanis, Yoio: Gallis, Yuraye.

Locus.



Nascitur inter segetes. Dioſ. li. 2. cap. 93.

Qualitates.

Desiccat, & excalfacit efficaciter: vt propinquum sit acribus, magis quàm Iris: sed non est perinde, vt illa, subtilis essentiæ: verùm in hoc multum deficit. Est ergo tertij ordinis excalfacientium: secundi verò extremò exiccantium. Gale. li. 6. simpl. medica.

Fœnum græcum: Græcis, τῆλις, κέρατις, αἰγόκερως, καὶ βούκερος: Arabibus, Olba, Helbe, ſeu Hebbe: Italis, Fiẽ græco: Germanis, Fenigrec, ſiue Bockshorn: Hiſpanis, Alfornas, ſiue Alloluas: Gallis, Fenigrec, ſiue Senegre.



Locus ex Fuchſio.

Seritur ſemine vbique.

Qualitates.

Gal. li. 8. ſimpl. medica.

Excalfacit ſecundo ordine: deſiccat verò primo.

Linum

Linum, Latinis & Græcis: Arabibus verò, Bazarichiché, siue Bezerchetan: Italis, Lino: Germanis, Lein, siue Flachs: Hispanis, Lino: Gallis, Lin.

Locus ex Fuchsio.



Pingue solum amat, et aliquatenus humidum: verùm idem macrat.

Qualitates.

Lini semen, esum, flatuosum est, etiã si frigatur, adeò sane excrementitia humiditate plenum est. Est verò etiã in primo ordine, quodammodo calidum: at humiditatis & siccitatis quodammodo in medio situm. Gal. li. 7. simpl. medica.

Cicer: Græcis, ἐρέβινθος: Arabibus, Chemps, Hamos, seu Alhamos: Italis, Ceci: Germanis, Kichern, Kichererbs, siue Ziser erbs: Hispanis, Grauancos, Gallis, Cices, siue, Chiches.

Locus ex Fuchsio.



Pingue Solum, & nigrum amat.

Qualitates.

Non minus inflationes excitat, quàm faba: valentius tamẽ nutrit, venerem stimulat, et semen generat. Abstergit etiã magis quàm faba.

Gale. li. 1. de alime. facul.

Ex Aetio:

Quod Orobiæum vocatur, attrahit, discutit, incidit, & abstergit.

Syluestre, Plinio, ventrem subducit, sed flatus gignit.


Ex Fuchsio.

Calidum & siccum est in primo ordine.

Faba:

Faba: Græcis, κύαμος: Arabibus, Hachille, Haballe, siue Bachale: Italis, Faua: Germanis, Bonen: Gallis, Feue.

Locus ex Fuchsio.



Fimum, pingue Solum, & optime subactum amat.

Qualitates.

In exiccando & refrigerando, secundum vtrunque, ad medium temperamentum propinquissimè accedit. Caro paulũ quid abstergentis facultatis continet, sicut cortex non nihil adstringentis. Vt edulium, flatulenta est, ac coctu difficilis, siquid aliud. Imposita, sine molestia deßiccat.

Gal. li. 7. simp. medica.

* Radix eius est.

Faba Aegyptia, siue* Colocasia: Græcis: κύαμος αἰγύπτιος: Italis, Faua d'Egitto: Hispanis, Inhame: Gallis, Feue d'Egipte.



Locus.

Theoph. de natu. plā. li. 4. cap. 10.

Exit in paludibus stagnisque, in Aegipto.

Qualitates.

Gale. li. 1. de alim. facul.

Faba Aegiptia, sicuti nostratem magnitudine longè præcellit: ita & naturam humidiorem, magisque excremētitiam sortita est.

Lens

Lens: Græcis, φακὸς: Arabibus, Hades: Italis, Lēticchia: Germanis, Linsen: Hispanis, Lenteyas: Gallis, Lentille.

Locus ex Fuchsio.



Seritur vbique ferè.

Qualitates.

Valenter adstringit: in caliditate verò & frigiditate medium tenet: desiccat tamen in secundo ordine. Ipsum itaque eius corpus desiccat & sistit ventrem: cæterum, decoctum prouocat. Proinde prior aqua abijcitur, vbi retentione opus est.

Gale. li. 8. simp. medica.

Phasio

Phasioli, Latinis & Græcis: Italis verò, Fagiuoli: Gallis, Fasioles.



Locus ex Matthiolo.

Seruntur semine in hortis & aruis.

Qualitates ex Simeone Sethi.

Calidi sunt & humidi in primo ordine.

Ex Galeno.


Humectant natura.

Gale.li.1. de ali. fa.

Eruum

Eruum, ſiue Herba Iudaïca Auicennæ: Græcis, ὄροβος: Arabibus, Herbum, Keiſene, ſiue Kerſene: Officinis, Orobus: Italis, Eruo, ſiue Mocho: Germanis, Eruen: Hiſpanis, Yeruos: Gallis, Ers, ſiue, veſſe noire.

Locus ex Matthiolo, & Fuchſio.



Seritur, & ſponte naſcitur. Tenue & ſiccum ſolum amat.

Qualitates.

Deſiccat exceſſu ſecundo interſo: calfacit vero primo. Quatenus autem amaritudinis eſt particeps, eatenus incidit, extergit, atque obſtructiones expedit. In cibis damnatur. Si ſumitur copioſè, ſanguinem per vrinas euocat. Gale. li. 8. ſimp. me.

Lupi

Lupinus satiuus: Græcis, θέρμος ἥμερος: Arabibus, Tarinus, Arinus, seu Tormus: Italis, Lupino domestico: Germanis, Vuickbonen, Feigbonen, siue Vuolffasch bonẽ: Hispanis, Entramuces, siue Entramocos: Gallis, Lupins.



Locus ex Fuchsio.

Tenue solum amat. Gaudet item rubro, & sabuloso solo, nec coli vult.

Ex Matthiolo.

Syluestris nascitur in campestribus.

Qualitates.

Gale. li. 1. de ali. fa. & libr. 6. simp. me.

Lupinus duræ ac terrestris substantiæ est. Lupinus maceratus ex genere est emplasticorum. Qui verò natiuam amaritudinem retinet, extergendi, digerendique vim obtinet. Agrestis amarior, & ad omnia valentior domestico.

Ex Matthiolo. *Notoriè calidus est & siccus.*

Rapum:

Rapum, ſiue Rapa: Græcis, γογγύλη: Arabibus, Seliem, Selgem, Selgiem, ſiue Alſegiem: Italis, Rapo: Germanis, Rueben: Hiſpanis, Nabo: Gallis, Raue, ſeu Naueau blanc des Iardins.

Locus ex Fuchſio.



Vliginoſum & tenue amat Solum.

Qualitates.

Rapi ſemen Venerem excitat: flatuoſum enim eſt. Radix difficilè concoquitur, inflátque, & ſemen generat.

Gal. li. 6. ſimp. me. & li. 2. de alim. fac.

Ex Fuchſio.

Calidum eſt in ſecundo receſſu: & humidum in primo.

Napus: Græcis, βουνιάς: Italis, Napo: Germanis, Steckrueben: Hispanis, Nabicas: Gallis, Nauet.



Locus ex Fuchsio.

Frigidis locis gaudet.

Qualitates ex Fuchsio.

Napus eandem temperaturam obtinet quam Rapum. Excalfacit igitur in secundo ordine, & humectat in primo.

Raphanus

Raphanus, siue Radix: Græcis, ῥάφανις: Arabibus, Fugel, siue Fegiel: Italis, Rafano, & Radice: Germanis, Rettich: Hispanis, Rauano, & Rauanillo: Gallis, Reffort.

Locus.



Seritur semine. Pingue solum amat, & bene subactum.

Pallad.li. 9.cap.5.

Qualitates.

Excalfacit excessu tertio, desiccat verò secundo. Quin & semen ipsũ planta efficacius est. Facultas ei inest digerendi. Item, vim extenuatoriam gerit: cum qua conspicuè calfacit: acris enim in ea qualitas exuperat.

Gale.li.8. simp.me.

Raphanus agreſtis: Italis, Raſano ſaluatico : Romanis , Ramoracia : Germanis, Vuald Rettich: Gallis, Rafan, ſiue Reffort ſauuage.



Locus ex Fuchſio.

Sabuloſis gaudet , & Pratis : & naſcitur ſecus Vias.

Qualitates.

Gale.li.8. ſimpl.medica.

Raphanus agreſtis Valentius deſiccat & excalfacit, domeſtico.

Siſer

Siſer: Græcis, σίσαρον: Arabibus, Culcas, Fiſarum, ſiue Seiſaron: Italis, Siſaro: Germanis, Gierlin, ſiue Girgelin: Hiſpanis, Chiriuias: Gallis, Cherüy, ſiue Giroles, aut Carottes blanches.



Locus ex Fuchſio.

Frigidos tractus amat: & ſeritur in hortis.

Qualitates.

Secundo ordine excalfacit: & habet adiectam amaritudinē quandam cum leuicula adſtrictione. Gale. li. 8. ſimp. me.

Ex Aegineta.

Excalfacit tertio ordine.

Ex Fuchſio.

Satiuum deſiccat primo exceſſu: & Venerem ſtimulat.

Siſer alterum : Gallis, Cherüys communs.



Locus & Qualitates.

Huc refer quæ dicta ſunt de Siſaro.

Lapa

Lapathum, ſiue Rumex: Græcis, λάπαθον, ἢ ὀξυλάπαθον: Officinis, Lapathum acutum: Arabibus, Humadh, Hunadh, ſiue Hamad: Italis, Rombice, ſiue Lapatio: Germanis, Ampffer: Hiſpanis, Labara: Gallis, Lapais, Lampe, Parelle, ſiue Patience.

Locus.



Naſcitur in paluſtribus. Dio. li.2. cap.108.

Qualitates.

Lapathum moderatè digerentem ſortitum eſt facultatem: at Oxylapathũ, miſtam. Nam ſimul cum eo quòd digerit, nonnihil quoque repercutit. Semen eorum manifeſtam quandam adſtrictionem obtinet. Gale.li.7. ſimpl.medica.

Hippolapathum, siue Reubarbarum Monachorum: Græcis, ἱππολάπαθον: Germanis, Munch Rabarbaren: Gallis, Reubarbe de Marais.



Locus.

Nascitur in Paludibus.

Qualitates.

Dios.li.2. cap. 108. Gale.li.7. simp.me.

Easdem qualitates & facultates obtinet, quas Rumex: sed imbecilliores.

Oxa

Oxalis, Latinis, & Græcis: Italis verò, Agretta: Germanis, Sauer Ampffer: Hispanis, Azederilla: Gallis, Ozeille, Vinette, siue Saliette.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur temerè in Pratis: & seritur in hortis.

Qualitates. ex Fuchsio.

Recentioribus Oxalis desiccat et refrigerat: in secundo ordine.

Ex Galeno.

Huc refer quæ dicta sũt de Lapatho.

Oxalis altera: Gallis, Autre eſpece d'O-zeille.



Locus, & Qualitates.

Accommoda hic omnem Oxalidis hiſtoriam.

Lamp

Lampſana, ſiue Braſſica ſylueſtris: Græcis, λαμπσάνη: Gallis Sanues blanches.

Pli. li. 20. cap. 9.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in Campeſtribus, & Noualibus.

Qualitates.

Lampſana eſa ſuccos prauos procreat. Cæterum illita abſtergendi nonnullam, digerendique facultatem poßidet.

Gal. li. 7. ſim. me.

Blitum: Græcis, βλῆτον: Arabibus, Bacha la iamenia, siue, Bachalæ alie manie: Italis, Blito: Germanis, Mayer: Hispanis, Bredos: Gallis, Blette, siue Poyrée rouge.



Locus ex Matthiolo, & Fuchsio.

Nascitur in hortis & campis, & restibili fertilitate perennat in multos annos.

Qualitates.


Gal. li.6. sim.me.

Blitum humidæ frigidæq; temperaturæ est, in secundo maximè excessu à temperatis.

Malua:

Malua: Græcis, μαλάχη: Arabibus, Chubeze, siue Chabazi: Italis, Malua: Germanis, Pappel: Hispanis, Maluas: Gallis, Malue.

Locus ex Fuchsio.



Seritur in hortis. Verùm sponte nascitur in incultis: & maximè in pingui & humido solo.

Qualitates. Gal. li. 7. sim. me.

Malua agrestis, digerentis paululum, & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis verò quātò plus habet aqueæ humiditatis, tantò facultate imbecillior est. Fructus eius tantò validior est, quantò & siccior. Item, A refrigerandi facultate maximè abest, & facilè commeat, Syluestres satiuis sicciores sunt. Idē lib. 2. de ali. fa.

Malua

Malua Arborea: Gallis, Malues des Iardins.



Locus.

Theo. de nat. plan. li. 1. ca, 5.

Seritur in hortis : & cultura adulteratur.

Qualitates.

Huc refer quæ de Malua dicta sunt.

Atrip.

Atriplex: Græcis, ἀτράφαξις, ἢ χρυσολάχανον: Arabibus, Cataſ, ſeu, Caraf: Italis, Atriplice: Germanis, Molten, ſiue, Milten: Hiſpanis, Armoles: Gallis, Choux Armoux, Arroches, Bonnes Dames, Folles, ſiue Femes.

Locus ex Fuchſio.



Seritur: & naſcitur in cultis.

Qualitates.

Atriplex conſtat humida et frigida temperie: humida quidē ſecundi ordinis à medijs: frigida verò primi: quam vtique tepidam eſſe caliditatem poſuimus, cuiuſmodi Roſis ineſt. Non tamen adſtringit: ſed aquea eſt, & minimum terrena. Ventrem celeriter permeat: & paululum digerit. Hortenſis frigidior & humidior agreſti.

Gal. li. 5. ſim. me.

Atrip

Atriplex Syluestris: Gallis, Arroches sauuages.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur sponte in cultis, & campestribus.

Qualitates.

Huc refer quæ de satiua Atriplice dicta sunt.

Spinacia,

Spinacia, ſiue Olus Hiſpanicum: Græcis, σπαναχιά: Arabibus, Hiſpanach: Italis, Spinacci: Germanis, Spinat: Gallis, Eſpinoches, ſiue, Eſpinars.



Locus ex Fuchſio.

Seritur vbique.

Qualitates.

Frigida ſunt & humida in primo ordine.

Atriplex

Atriplex marina: Gallis, Arroches marines.



Locus ex Matthiolo.


Littoribus, & maritimis gaudet.

Qualitates

Accedit propè ad Halimi facultates.

Kali

Kali.



Locus ex Matthiolo.

Salinas, & littora peramat.

Qualitates ex Matthiolo.

Sapor vniuersæ plantæ salsus: inde qualitates conÿcito.

Brassica crispa: Græcis, κράμβη: Italis, Cauoli, siue Verze: Germanis, Koël: Gallis, Choux vers: Hispanis, Colles, & Couues.

Locus ex Fuchsio.

Seruntur vbique semine, et radice.



Qualitates.

Gale. li. 7. simpl. medica.

Satiua Brassica desiccandi vim habet, tum esa, tum foris imposita, nõ tamen etiam admodum acrem. Vim etiam spissandi habet: & abstersorium quidđam continet. Semen amara qualitatis particeps est: estque aliquatenus abstersorium. Cinis Caulium valde desiccat: vt sit causticus.

Brassi


Braſſica capitata: Italis, Cauolo cappuccio: Germanis, Capshaut: Gallis, Choux Cabuz.



Locus, & Qualitates.

Huc refer quæ de Braßica dicta ſunt.

Brassica Marina: Græcis, κράμβη θαλασσία: Officinis, Soldanella : Italis, Cauolo marino: Gallis, Chou de Mer.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Maritimis.

Qualitates ex eodem.

Folia gustu, amara, salsa, & quadamtenus acria. Hinc facultates & temperaturam coniicito.

Beta

Beta nigra: Græcis τεῦτλον: Arabibus, Decka, & Celb: Italis, Bietola: Germanis, Mangolt, & Pieſſen: Hiſpanis, Aſelgas: Gallis, Ioutte, Reparée, ſiue Porrée.

Locus ex Matthiolo.



Seritur in hortis.

Qualitates

Beta Nitroſæ facultatis particeps eſt, qua tum digerit, tum extergit, & per nares purgat. Cocta nitroſitatem omnem exuit, fitque facultatis leuiter digerentis. Porrò, ad detergendum digerendúmque, validior eſt, Beta alba: nam nigra adiunctum habet adſtrictionis quidpiam, & magis in radice quàm aliis partibus. Succus abſterſorius eſt. Exigui eſt alimenti.

Gale. li. 8. ſimpl. medica.

Gal. li. 2. de ali. facul.

Beta candida: Gallis, Blanche Porrée.



Locus & Qualitates.

Huc refer quæ de Beta nigra dicta sunt.

Portula

Portulaca: Græcis ἀνδράχνη: Arabibus, Bakleancha, ſeu Bachele alhanicha: Italis, Portulaca, Procacchia ſiue Porcellana: Germanis, Burtzelkraut: Hiſpanis, Verdolagas, & Baldrœgas: Gallis, Porcelaine, Pourpier, ſiue Pourchaille. Locus ex Matthiolo.



Seritur naſcitúrque ſponte in locis petroſis, & incultis.

Qualitates.

Portulaca frigida, & aquea temperamento eſt, pauca cuiuſdã particeps auſteritatis. Refrigerat quidem exceſſu tertio à temperatis ac medijs: humectat verò ſecundo, viſcoſum etiam quiddam obtinet. Succus refrigerat, eiuſdémque temperatura eſt cuius herba. Succus magis adſtringit quàm herba: quæ ſuccum gignit modicum, eúmque humidum, frigidum, & glutinoſum.

Gale. li. 6. ſimpl. medica.

Asparagus: Græcis, ἀσπάραγος: Arabibus, Halion, siue Helium: Italis, Asparago: Germanis, Spargen: Hispanis, Esparagos: Gallis, Esparge.

Locus ex Fuchsio, & Matthiolo.



Seritur in hortis: gaudétque Arundinetis, & locis petrosis. Est & alius Asparagus palustris.

Qualitates.

Gale. li. 2. de alimé. facul.

Asparagus Petræus abstergendi vim habet: idque citra manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem. Renes & Iecur infarctu liberat. Vrinam cit, & parum præbet nutrimenti. Cocti tamen magis alunt.

Gale. li. 6. simpl. medica.

Plan

Plantago maior: Græcis, ἀρνόγλωσσον: Arabibus, Liſen, ſiue Leſan alhamel: Italis, Piantagine: Germanis, Vvegerich: Hiſpanis, Lhantem, ſiue Tamehagẽ: Gallis, Plantain.



Locus.

Naſcitur in Lacunoſis, ſepibus, & locis humidis. Dioſ. li. 2. cap. 119.

Qualitates.

Plantago miſtæ eſt temperaturæ: habet enim quiddam aqueum frigidum: habet & auſterum quiddam, id quod terreum eſt ſiccum, frigidum. Itaque refrigerat ſimul & deſiccat: & in vtroque ſecundi exceſſus à medijs eſt. In omnibus medicamentis, quæ refrigerant ſimul & deſiccant, primas tenet Plantago: idque temperaturæ ſymmetria. Siccitatem enim obtinet morſus expertem, & frigiditatem quæ nondum obſtupefaciat. Semen & radix ſimilis ſunt facultatis, niſi quòd ſiccioris & minus frigidæ. Sed & ſemen ſubtilium eſt partium: radices verò craſsiorum. Sicca folia tenuioris & minus frigidæ ſunt facultatis: folia & ſemina ſunt aliquatenus abſterſoria. Gale. li. 6. ſimp. medica.

Plantago minor.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Plantaginis historiam.

Sium

Sium, ſeu Lauer: Græcis, σίον: Arabibus, Rorcathalmi, Inhamehanella, ſeu Hamehanella: Italis, Sio, ſiue Gorgoleſtro: Germanis, Vvaſſer merck: Hiſpanis, Rabacas: Gallis, Berle.

Locus.



Sion in ſcaturietium fontium riuis plerunque naſcitur.

Dioſ. li. 2. cap. 123.

Qualitates.

Sium, quantum guſtu odoratum eſt, tantum etiam calfacientis qualitatis eſt particeps. Digerit autem, & vrinam mouet, et calculos renum frangit, & menſes euocat.

Gal. li. 8. ſimp. medica.

Ex Fuchſio.

Ex amaritudine conijci poteſt Sium eſſe caidum & ſiccum.

Siſym

Sisymbrium hortense: Græcis σισύμβριον: Arabibus, Sisnabarion, siue Sisnabar: Italis, Sisembro, & Menta Romana: Germanis, Vuasser muntz, siue Bachmuntz: Hispanis, Yerua buena de agria: Gallis, Mente aquatique, Baume, Thymbree, ou Serpollet sauuage.

Locus ex Dioscoride & Fuchsio.

Dio. li.2. cap.121.



Nascitur in incultis. Item aquosis & aquis stagnantibus gaudet.

Qualitates.

Gale.li.8. simp. med.

Tenuium est partium: & digerentis, excalfacientis, & exiccantis facultatis in tertio ordine. Semen eius tenuium est partium, & calidum.

Sisym

Siſymbrium aquaticum, Cardamina, ſiue Naſturtium aquaticum: Græcis, σισύμβριον ἕτερον: Italis, Siſembro aquatico, ſiue Creſcione: Germanis, Brun kreſſen, ſiue Vuaſſer kreſſen: Hiſpanis, Berros, aut Agriris: Gallis, Creſſon.



Locus.

Riguis gaudet: & eiſdem locis quibus Sion prouenit. Dio. lib. 2. cap. 121.

Qualitates.

Siſymbrium aquaticum guſtu ſimile quiddam Naſturtio præfert. Siccum tertij eſt ordinis excalfacientium, & deſiccantium: cum humidum & viride, ſecundi. Gale. li. 8. ſimp. me.

Siſym

Sisymbrium aquaticum alterum: Gallis, petit Cresson.



Locus, & Qualitates.

Huc refer omnem Sisymbrij aquatici prioris historiam.

Crith

Crithmum, Crithamon, siue Fœniculum marinum: Græcis, κρίθμον: Italis, Finocchio marino, Bacille, & herba di San Pietro: Germanis, Bacillen, siue Meerfenckel: Hispanis, Perexil de la Mar, siue Vnhas de Agnula yerua: Gallis, Bassille, siue Fenoil marin.



Locus.

Nascitur in maritimis & petrosis, & seritur in hortis. Diosc. li. 2. cap. 122.

Qualitates.

Crithmum gustatibus salsum quodammodo est, cum paucula amaritate: vt vis eius sit exiccatoria, & abstersoria: vtraque tamen imbecillior est in leo, quàm in amaris. Gal. lib. 6. simp. me.

Crith

Crithmum alterum, siue Crista marina: Gallis, Creste marine, espece de Bassille.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Scopulis, Promontoriis, ac locis maritimis petrosis.

Qualitates.

Huc refer omnia de Crithamo.

Coro

Coronopus, Serpentina, ſiue Sanguinaria : Græcis, κορονόπους, ἢ ἄστερον: Italis, Herba ſtella : Germanis, Kraenfuoſz : Hiſpanis, Guiabellá : Gallis, Corne de Cerf, ſiue Sanguinaire.

Locus.



Prouenit in aggeribus, locis incultis, & ſecus vias: ſeritur tamẽ hodie in Acetariarũ vsũ.

Dioſ. li. 2. cap. 123.

Qualitates.

Radix mandūcata, cœliacis prodeſſe creditur.

Gale. li. 6. ſimp. me.


Ex Dioſcoride.

Radix habet vim adſtringentem.

Ex Fuchſio.

Ex guſtus coniectura deſiccat,

Coronopus ſyluestris, aut Serpentina.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur ſponte in diluto extenuatóque ſolo.

Qualitates, ex Matthiolo.

Radix in vino pota præcipuum remedium eſt ad venenoſos ictus & morſus.

Sonchus

Sonchus, Cicerbita, Lactucella, siue Palatum leporis: Græcis, σόγχος: Italis, Cicerbita: Germanis, Vuilder hasen koel, siue Gens distel: Hispanis, Serraya, siue Serralla: : Gallis, Laiteron, Laitteſſon, ſiue Palais au Lieure.

Locus, ex Matthiolo.




Visitur in hortis, campis & vinetis.

Qualitates.

Temperamentum eius quodammodo mistum est: constat enim ex aquea terreaque substantia, vtraque leuiter frigida: nam & adstrictionis cuiusdam est particeps. Illitum autem, & esum, manifestò refrigerat. Siccum verò terrestris est temperaturæ, & modicam habet caliditatem. Gale. li. 8. sim. me.

Sonchus planus: Italis, Cicerbita liſcia: Gallis, Laitteron aux Lieures.



Locus, & Qualitates.

Refer huc Sonchi hiſtoriam.

Seris

Seris, Intubus satiuus, siue Endiuia: Græcis, σέρις: Arabibus, Dumbebe, Hundebe, seu Endeba: Italis, Endiuia: Germanis, Endiuien. Hispanis, Endiuia: Gallis, Endiue, siue Endiuie.

Locus, ex Matthiolo.



Seritur in Acetariarum vsum.

Qualitates.

Intybus olus est subamarum. & magis quæ agrestis est. Est autem ea frigidæ siccæq; temperaturæ, vtrunque secundo excessu. Porrò domestica magis etiam quàm agrestis refrigerat. Sed & humiditatis multæ admistio siccitatem extinguit. Verùm vtraque adstringentis qualitatis st particeps.

Gal. li. 8. simpl. medica.

Intubus hortensis alter : Gallis, seconde espece d'Endiue.




Locus, & Qualitates.

Huc refer quæ de priore Intubo dicta sunt.

Intybus

Intybus Syluestris, siue Cichorium: Græcis, Σέρις ἀγρία, κιχώριον, ἢ πικρὶς: Italis, Cicorea Saluatica: Germanis, Vvegvveiz, siue, Vveg vvartz.: Hispanis, Almerones, & Cichoria: Gallis, Cicorée sauuage.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur in campestribus, & secus vias.

Qualitates.

Hic resumito quæ de Intubo dicta sunt.

Cichorium satiuum : Gallis, Cicorée blanche, siue Cicorée des Iardins.



Locus ex Matthiolo.

Seritur in acetariarum vsum.

Qualitates.

Historiam Intybi hic sumito.

Dens

Dens Leonis, Dens Caninus, caput Monachi, Roſtrũ porcinum, ſiue Ambubeia: Theophraſto, ἄφακα: Gallis, Piſſenlict ſiue, Dent de Lyon: Germanis, Pfaffen-roerlin.

Theo. de nat. plãt. li. 7. c. 11.



Locus. ex Fuchſio.

Naſcitur vbique, præſertim in hortis.

Qualitates.

Hic dicta ſint quæ de Cichorio agreſti præfati ſumus.

Cyanus maior, Flos Frumenti, siue Baptisecula: Græcis, κύανος: Italis, Fior Campese, Battisecula, siue Battisuocere: Germanis, Kornbluomen: Gallis, Aubiffoin, Blauelles, Blaueoles, Bluet, siue Bleuet.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur in cultis, & inter segetes.

Qualitates. ex Fuchsio.

Refrigerat, & repercutit: viscosus enim gustu est, absq; manifesto calore.

Ex Placētino.

Propria dote pestilentibus morbis aduersatur.

Ex Recentiorum placitis.

Inflammationibus oculorum, & aliarum corporis partium prodest.

Cyanus minor: Gallis, Petit Aubiffoin.




Locus, & Qualitates.

Huc refer quæ dicta sunt de Cyano maiore.

Chon

Chondrilla prima: Græcis χονδρίλλη: Arabibus. Candarel, Cadaron, seu Amiron: Italis, Chondrilla siue Lattaiuola: Germanis, Kleyn Sonnen Vvirbel: Hispanis, Laitugas, siue Leichugas dentre los planos: Gallis, Laitteron.



Locus, ex Matthiolo.

Nascitur in cultis locis, scrobium aggeribus, & secus vias,


Qualitates.

Gal. li.8. sim. me.

Adstringit vt Cichorium: est enim Seridis species, & eiusdem facultatis.

Chon

Chondrilla altera.



Locus.

Naſcitur in lætis & cultis.

Dio. li. 2. cap. 126.

Qualitates.

Huc refer quæ de Chondrilla priore dicta ſunt. Galenus tamen Lactucæ Chondrillam ſimilem facit.

Gal. li. 2. de alim. facul.

Cucur

Cucurbita: Græcis, κολοκύνθα ἐδώδιμος: Arabibus, Haraha, Hara, seu Charha: Italis, Zucca: Germanis, Kurbss: Hispanis, Calabassa: Gallis, Courge, Courle, siue, Causse.

Locus, ex Fuchsio.



Frigidis & humidis gaudet: nec sponte nascitur.

Qualitates.

Gal. li. 8. sim. me.

Humida frigidaq́ue temperatura est, & utraque qualitate secundi ordinis. Comesta humida est, & sitim propellens: stomacho tamen perniciosa, & concoctu planè inexpugnabilis.

Idē li. 1. de ali. fa.

Frigidum, humidumq́ue corpori alimentum præbet, ac idipsum ea de causa exiguum: sed facilè per aluum subit, ob substantiæ suæ lubricitatem.

Cucur

Cucurbitæ Indiane, & peregrinæ: Italis, Zucche Indiane: Gallis Courges d'yuer.




Locus, & Qualitates.

Huc refer quæ de Cucurbita dicta sunt.

Cucu

Cucumer ſatiuus: Græcis, σίκυς ἥμερος: Arabibus, Chathe, ſiue, Chetha: Italis, Cocomero, & Cedruolo: Germanis, Cucumeru: Hiſpanis, Cocombro: Gallis, Cocombre.

Locus ex Fuchſio.



Lætum Solum & apricum amat.

Qualitates.

Gal. li. 8. ſimi. me.

Cucumis eſculentus maturus, quidē tenuioris eſſentiæ eſt: immaturus verò craßioris. Sed & abſtergēdi & incidendi facultate participant. Puluis ſeminis arefacti, contuſi & cribrati, abſterſorius eſt. Superat in eis humida frigidaq; temperies: non tamen magnopere, ſed quaſi in ſecūdo ordine. Radix, aut ſemen arefactum, deſiccat in primo quodā ordine, aut etiam in ſecundo incipiente. Magis etiam abſtergit quàm caro.

Ang

Anguriæ: Arabibus, Dullaha: Italis, Anguria, Citrullo, siue Cocomero: Germanis, Gurchen: Hispanis, Cogombro: Gallis, Cocombres.



Locus ex Matthiolo.


Germana est Italia.

Qualitates.

Huc refer omnem Cucumeris historiam.

Melones, siue Pepones: Græcis πέπονες: Arabibus, Batheca, seu Bathiech: Italis, Mellone: Germanis, Pfeben, siue Melaon: Hispanis, Melon: Gallis, Melons.

Locus ex Fuchsio.



Loca insolata amat, & bene subacta.

Qualitates.

Vniuersa Peponum natura frigida, & largè humida est, habéntque quãdam abstergendi vim: et rapiũtur deorsum expeditius quàm Cucurbitæ, aut Melopepones.

Gal. li. 2. de ali. facul.

Semen, eorum carne efficacius censetur. Melopepones verò minus humectant quàm Pepones: nec adeò praui succi, tardiúsque deorsum descendunt, minúsque vrinam prouocant.

Lactu

Lactuca criſpa: Græcis, θρίδαξ: Arabibus, Cherbas, ſiue Chas: Italis, Lattuca: Germanis, Lactuck: Hiſpanis, Lechuga, ſiue Alfalſa: Gallis, Laitue.

Locus ex Fuchſio.

Seritur in hortis, vt cætera Oleracea.



Qualitates.

Olus humidum eſt & frigidum: non tamen extremè (ſiquidem edendo non foret) verũ maximè ſecundũ aqua fontana frigiditatem.

Gale. li. 6. ſimpl. medica.

Ex Simeone Sethi.

Refrigerat & humectat in tertio ordine.

Lactuca florida: Gallis, Laitue en fleur.




Locus, Qualitates.

Vide Lactucæ crispæ historiam.

Lactuca

Lactuca syluestris: Græcis, θριδαξ ἀγρία: Italis, Lattuca saluatica: Germanis, Vvild Lactuck: Gallis, Laitue sauuage.



Locus ex Fuchsio, & Theophrasto.

Nascitur in aruis, & in vinearum aut hortorum septis.

Theoph. de natu. plan. li. 7. cap. 6.

Qualitates.

Viribus quodammodo Papaueri similis.

Diosc. li. 2 ca. 130.

Ex Simeone Sethi.

Minus humectat & refrigerat quàm satiua.

Chærefolium, quibuſdam, Gingidium: Græcis, χαιρέφυλλον, ἢ γιγγίδιον: Italis, Cerefoglio: Germanis, Koerffel, ſiue Kerbelkraut: Gallis, Cerfueil.

Dioſ. li. 2. cap. 131. Pli. li. 20. cap. 5.

Locus, ex Dioſc. & Plinio.



Peculiare Olus Ciliciæ, & Syriæ hortis. Nunc tamen familiariſsimum eſt, & vbique ſeritur.

Qualitates.

Gal. li. 6. ſimpl. medica.

Gingidium ſicut guſtu amaritudinẽ, & aſtrictionem præfert: ſic temperamento quoque ipſo caliditatem & frigiditatem. Secundum verò vtramque qualitatem deſiccatorium eſt. Non paruam obtinet adſtrictionem: nec admodum conſpicuam caliditatem: verùm deſiccat ſecundo receſſu.

Pecten

Pectén Veneris, siue Scandix Hermolai Barbari: Germanis, Vvild moren.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur inter segetes, præsertímque in agrorum marginibus.


Qualitates ex eodem.

Ex acrimonia & amaritudine quam gustui repræsentat, non excedit primum siccitatis & caliditatis ordinem.

Ex Plinio.

Radix contusa corpori infixa extrahit. Pli.li.24. cap.19.

Caucalis, siue Daucus syluestris, aut Petroselinum erraticum: Græcis, καυκαλις: Italis, Petrosello saluatico: Gallis, Persil sauuage.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Campestribus, inculto præsertim solo.

Qualitates.

Gal. li.7. simp. medica.

Caucalis adsimili est Dauco, gustu, ac viribus: nam excalfacit vt ille, & desiccat.

Eruca

Eruca: Græcis, εὔζωμον: Arabibus, Iergir, Ergir, seu Giargir: Italis, Ruchetta, siue Ruccola: Germanis, Vveisz senff: Hispanis, Oruga, & Aruga: Gallis, Roquette.



Locus ex Fuchsio.

Seritur in acetariarum vsum.

Qualitates.

Excalfacit per quàm manifestè: genitale semen auget, & Venerem stimulat.

Gale. li. 2. de alimẽ. facul.

Ex Fuchsio.

Eiusdem est temperaturæ cuius Erysimon.

Eruca ſyluestris: Græcis, ἔυζωμος ἄγριον: Italis, Ruchetta gentile, ſiue ſaluatica: Gallis, Petite Roquette, ſiue Roquette gentille, aut Roquette ſauuage.

Locus.

Dio. lib. 2. cap. 134.



Gignitur maximè in Iberia quæ Occidentem ſpectat.

Ex Fuchſio.

Naſcitur ſponte in riguis: & ſeritur in acetariarum vſum.

Qualitates ex Dioſcoride.

Multò ſatiua acrior: & magis vrinam pellit.

Ocim

Ocimum Latinis & Græcis: Arabibus, verò Berendaros, & Bedarog: Italis, Basilico: Germanis, Basilien, siue Basilgram: Hispanis, Albahaca: Gallis, Basilic.

Locus ex Matthiolo.



Seritur in hortis: & per raræ sunt ædium fenestræ, perraráque cœnacula ac viridaria, quæ Ocimum non redoleat: frequens enim seritur & fouetur in figulinis vasis.

Qualitates.


Ex secundo est ordine calfacientium. Habet autem recrementitiã humiditatem: proinde nec commodum est quod in corpus sumatur. Illitum, ad digerendum & concoquendum vtile est. Vitiosi est succi.

Gale. li. 8. simp. me.

Gal. lib. 2. de ali. fa.

Ocimum

Ocimum gariophyllatum, siue Ocimum paruum: Italis, Basilico gentile: Germanis, Kleyn Basilien: Gallis, Petit Basilic, siue Basilic gentil.



Locus & Qualitates.

Huc refer omnem Ocimi historiam.

Oroban

Orobanche, siue Erui angina: Græcis ὀροβάγχη: Italis, Herba lupa, Coda di Leone, siue Herba Tora.



Locus.

Nascitur inter legumina, eáque strangulat. Dio. li.2. cap.136.

Qualitates.

Refrigerat, & desiccat in primo recessu. Gale.li.8. simp.me.

Hirci

Hirci Barbula: Græcis, τραγοπώγων: Italis, Barba di Becco, siue, Sassefrica: Germanis, Boksbart, siue Gauch brott: Hispanis, Barba de Cabron: Gallis, Barbe de Bouc.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur temerè in pratis.

Qualitates, ex Matthiolo.

Succus foliorum, vel eorũ stillatitia aqua, vim spissandi habet.

Ex Fuchsio.

Radix, & herba, quæ gustu dulcis est, indicat Tragopogon humidum esse, & moderatè calidum.

Ornith

Ornithogalum, Latinis & Græcis, Gallis, Churles.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur frequens inter Segetes.

Qualitates ex eodem.

Radices ſuauißimi ſunt guſtus, & eſui aptißimæ.

Traſi.

Trasi.



Locus ex Matthiolo.


Germinant in cultis, & Campestribus.

Qualitates ex eodem.

Venerem stimulant: & quantum ex dulcedine coniici potest, in calfacientium & humectantium genere censentur: sed flatus quodammodo gignunt.

Tubera

Tubera: Græcis, ὕδνα: Arabibus, Ramech, Alchamech, Tamer, siue Kema: Italis, Tartuffi: Germanis, Hirst brunst: Hispanis, Turmas de tierra: Gallis, Truffes, siue Truffles.



Locus ex Matthiolo.

Terra occulta quadam facultate conglobat. Syluosis & montium radicibus gaudent.

Qualitates.


Nullam habent euidentem qualitatem. Frigidiusculum & crassum præbent alimentum. Gale. li. 2. de alim. facul.

Ex Auicenna.

Tubera terrena magis quàm aquea sunt, omniq; prorsus sapore expertia. Atrabiliares & crassos gignunt humores: concoctúque sunt contumacia, & ventriculum aggrauãt.

Smi

Smilax hortensis: Græcis, σμίλαξ κηπαία: Arabibus, Lubia: Italis, Faggiuolo Turchesco: Germanis, Vuelſſch bonen: Hiſpanis, Feyones: Gallis, Faſiolz de Turquie, Feues peintes, ſiue, Pois à viſages.



Locus ex Matthiolo.

Seritur in hortis ad opacandas Pergulas.

Qualitates, ex Simeone Sethi.

Gale. li. 2. de ali. fa. *Excalfaciunt & humectant in primo ordine.*

Ex Galeno.

Humectant.

Aphaca, Aphace, Vicia ſylueſtris, ſiue Os mundi: Græcis, ἀφάκη: Arabibus, Apaki, Afaki, ſiue Albikia: Italis, Vicia ſaluatica: Germanis, Vuilde vuicken, ſiue, vogels vuicken: Gallis, Veſſe ſauuage.

Locus ex Matthiolo.



Non ſolùm ſponte naſcitur: ſed & à multis ſeritur ad Columbarum ſaginã.


Qualitates.

Inſuauis eſt, concoctu difficilis, & aluũ retinens, Improbum craſſumque ſuccum gignit, et qui facilè in humorem melancholicum vertatur. Gale. li. 1. de ali. fa.

Ex Fuchſio.

Moderatè calida eſt: verum deſiccat efficaciter.

Vicia: Græcis, βυνίον: Italis, Vitia: Germanis, Vuicken: Gallis, Vesse.



Locus ex Fuchsio.

Aridis gaudet. Seritur autem inter segetes.

Qualitates.

Eiusdem temperaturæ cuius Aphaca.

Ex Fuchsio.

In medio est caliditatis & siccitatis: magis autem desiccat: vt sit secundi ordinis desiccantium.

Porrum

Porrum capitatum: Græcis, πράσον κεφαλωτὸν: Arabibus, Curat, seu Kurat: Italis, Porro de gli horti: Germanis, Lauch: Hispanis, Puerro: Gallis, Porreau.

Locus ex Fuchsio.



Latis gaudet: humidum verò & aquosum solum odit.

Qualitates.

Corpus excalfacit, & crassos in eo humores extenuat, glutinosósque incidit. Gale. li. 2. de ali. fa.

Ex Dioscoride.

Flatuosum est: Semen tamen acrius est & quandam adstrictoriam vim habet. Venerem stimulat. Diosc. li. 2. cap. 143.

Ex Fuchsio.


Calfacit & incidit vt Cæpa.

Ex Symeone Sethi.

Calfacit & desiccat in secundo ordine.

Porrum agreſte: Græcis ἀμπελόπρασον: Arabibus, Nabati: Italis, Porro ſaluatico, ſiue, Porrandello: Germanis, Vvild lauch: Hiſpanis, Hayos, & Pierros de las vinhas: Gallis, Vigneporrette, Porrée de Chien, ſiue, Porreau ſauuage.

Locus ex Matthiolo.



Naſcitur plerunque in vineis, agrorum marginibus, et in amœnis collium locis.

Qualitates.

Gale. li. 6. ſim. me.

Ampeloprasum acrius et ſiccius eſt porro domeſtico, & ſtomacho nocentius. Sed & craſſos & lentos humores potentius incidit: valentiusq; infarcta organa obſtructione liberat. Adeo calidũ eſt, vt illitum exulceret. Extremi ergo eſt ordinis calfacientium.

Cep

Cepa: Græcis, κρόμμυον: Arabibus, Basil, seu Bassàl: Italis, Cipolla: Germanis, Zvvibel: Hispanis, Cebolla: Gallis, Oignons.



Locus, ex Fuchsio.

Pingui solo gaudet, et Vliginoso. Seritur semine & radice.


Qualitates.

Gal. li. 7. sim. me.

Ex quarto est ordine calfaciētium: essentia autem eius potius crassarū partium. Porrò, si succum exprimas, quod reliquū est admodum terreæ substātiæ est, eiusq; calidæ: succus verò aqueæ, aëreæq; qualitatis. Cepa mãducata flatuosa est. Itaque quæ temperatura sunt sicciore, minus flatuum generant. Cæterà verò Porro similis.

Allium : Græcis , σκόροδον : Arabibus , Chaum, Cairin, ſeu, Thum : Italis, Aglio: Germanis, Knoblauch: Hiſpanis, Ayos: Gallis, Ail, ſeu, Aux.

Theo. de na. plan. li. 7. c. 4.



Locus.

Seritur, nucleatim diuiſum, in hortis.

Qualitates.

Gal. lib. 2. de alim. facul.

Allium non modo vt obſonium, verum etiam vt medicamentum vſurpatur: obſtructa enim ſoluere & diſcutere poteſt. Aliquãtiſper elixum, vſque dum acritudinem abijciat, imbecillius fit, ſed ſucci prauitatem amittit.

Ex Fuchſio.

Dio. li. 2. cap. 146.

Deſiccant & calfaciunt quarto ordine.

Ex Dioſcoride.

Vis Allij acris eſt. Excalfacit, mordet, inflationes facit, & ſummam cutem exulcerat.

Scoro

Scorodoprasum Latinis, & Græcis: Germanis, Aberknoblauch, siue Feld Knoblauch: Gallis, Ail-porreau.



Locus ex Matthiolo.

Vmbrosis gaudet: & sponte nascitur in pratorum marginibus.

Qualitates.

Scorodoprasum sicut gustu & odore mediã Allij, & Porri qualitatẽ obtinet: ita & vires. Gal. li. 8. sim. me.

Sinapi primum: Græcis, Σίνηπι, ἢ νάπι: Arabibus, Cardel, ſiue, Chardel, Italis, Senape: Germanis, Senff. Hiſpanis, Moſtaza: Gallis, Seneué, ſiue, Mouſtarde aux fleurs blãches.



Locus ex Fuchſio.

Seritur in hortis.

Qualitates.

Calfacit & deſiccat quarto ordine.

Gal. li. 8. ſim. me.

Ex Dioſcoride.

Ad calfaciendũ, extenuandum, extrahendum efficax.

Ex Matthiol.

Officinæ vtuntur ad cauſtica.

Sinapi

Sinapi ſecundum, ſiue, Sinapi erraticum: Gallis, Seneué à fleurs iaunes, ſeu, Seneué ſauuage: Italis, Senape ſaluatica.



Locus, ex Fuchſio.

Naſcitur ſponte in cultis, & Noualibus.

Qualitates.

Eiuſdem eſt temperaturæ cuius primum Sinapi.

Sinapi tertium : Gallis, Moustarde blanche & douce.



Locus ex Matthiolo.

Satiuum est.

Qualitates

Huc refer omnem Sinapis historiam. Id tamen proprium habet, vt musto recenti commistum (sit modò tritum) eius dulcedinem tueatur, eamq; deficere prohibeat, quòd ebullitionem reprimat.

Nastur

Naſturtium hortenſe: Græcis κάρδαμον: Arabibus, Norfalchef, ſeu Narf: Italis: Naſturtio, & Agretto: Germanis, Kreſſen, ſiue, GartenKreſs: Hiſpanis, Naſturcio, & Malpica: Gallis, Naſitort, Creſſon Alnoys, ſiue, Creſſon de Iardin.



Locus, ex Matthiolo.

Familiaris eſt hortis, & frequens herba, expetita in Acetariarum vſum.

Qualitates.

Gal.lib.7. ſim.me.

Adurentis facultatis eſt particeps naſturtij ſemen, ſicut Sinapi: Itaque vbi rubrificatione opus eſt, eo perinde atque Sinapi excalfaciunt. Valēter incidit craſſos ſuccos. Herba arefacta ſimilem ſemini vim poßidet: viridis autem multò ſemine inferior eſt.

Thlaſpi

Thlaſpi, Capſella, Scandulaceum, Naſturtium tectorum, aut Syluestre Naſturtium: Græcis, θλάσπι, ἢ θλασπίδιον, ϗ σίνηπι ἄγριον: Italis Tlaſpi: Germanis, Biſem Kraut: Hiſpanis, Panequeſo de flor blanquo: Gallis, Seneué ſauuage.

Dio. li.2. cap.150.

Cal. li.5. ſim. me.



Locus.

Naſcitur in ſemitis, & ſepibus, foßisq́;.

Qualitates.

Thlaſpi ſemē habet facultatem acrē, adeò vt internos abſceſſus potū diſrūpat. Fœtus enecat: eſtq́; tum ſupernè, tum in inferne bilioſorum, humorum euacuatorium, acetabuli menſura potum.

Ex Fuchſio.

Semen deſiccat & calfacit quarto ordine.

Burſa

Burſa Paſtoris: Germanis, Teſchelkraut: Gallis, Bourſe à Paſteur.



Locus ex Fuchſio.

Vbique temerè naſcitur, maximè ſecus vias, & inter Rudera.

Qualitates ex Matthiolo.

Eſt ex refrigerãtium, exiccantium, & adſtringentium ordine. Succus herbæ glutinatorius eſt, in ſumma, adſtringit valenter omnes ſanguinis fluxiones.

Arabis, Draba, siue Nasturtium Orientale, aut Nasturtium Babylonicum: Græcis, ἀραβὶς. ἢ δράβη: Gallis, Draue.



Dioscor. lib. 1. cap. 151.

Locus, ex Matthiolo.

Nascitur in campestribus, & agrorum marginibus.

Ex Ruellio.

Noualibus & sæpè cultis gaudet.

Qualitates. ex Dioscorid.

Semen aridum pro pipere obsonijs admiscetur.

Ex Serapiõe.

Insignis est acrimoniæ, et Nasturtio similis.

Irio

Irio, Eryſimum Rapiſtrum, ſiue Sinapis ſylueſtris: Græcis, ἐρύσιμον: Italis, Eryſimo: Germanis, Hederich, ſiue Vvilder ſenff: Hiſpanis, Rinchaon: Gallis, Velar, ſiue Tortelle.



Locus.

Naſcitur iuxta ∨rbes, rudera, hortóſque. Dioſ. li. 2. ca. 152.

Ex Matthiolo.

Fructicat paſſim in plateis, ædificiorũ areis, & ruderibus, & ſecus ∨ias oritur.

Qualitates.

Acrimonia pollet ∨t Naſturtium & Sinapi. Gale. li. 6. ſimp. medica.

Ex Fuchſio.

Semen Irionis eodem ordine calfacit & deſiccat quo Naſturtij. Herba arefacta ſemini par eſt: ∨irens enim imbecillior eſt.

Cantabrica, quibusdam, Vettonica altera: Officinis, Tunica, aut Gariophyllata: Italis, Garofoli: Germanis, Graszbluom, siue Naiglin bluom: Gallis, Oeilletz, siue Girofflées.



Locus ex Fuchsio.

Seruntur studiosè in hortis, fouentúrque in figulinis ad Cœnaculorum decorem.

Qualitates ex Eodem.

Odor, amaritudóque indicia sunt caliditatis, & siccitatis.

Canta

Cantabrica altera, ſiue Vettonica ſylueſtris: Italis, Garoffoli ſaluatichi: Germanis, Donderneglin: Gallis, Armoiries, Oeilletz ſauuages, ſiue Chante pouletz.



Locus ex Fuchſio.

Naſcitur ſponte in Pratis, montibus, & locis inſolatis.

Qualitates ex eodem.

Huc refer omnem prioris Cantabricæ hiſtoriam.

Hydropiper, ſiue Perſicaria: Græcis, ὑδροπέπερι: Italis, Hydropepe, ſiue Pepe aquatico: Germanis Vvaſſer pfeffer, ſiue Mucken kraut: Hiſpanis, Hierua pexiguera ſin manchas: Gallis, Curage



Locus.

Dio. li. 2. cap. 155.

Apud aquas naſcitur quæ ſtagnant, aut pigro lapſu repunt.

Qualitates.

Gal. li. 8. ſimpl. medica.

Calidum eſt, & ſiccum ſed non tantum vt Piper.

Persicaria: Gallis, Curage.



Locus ex Fuchsio.

In humidis & palustribus nascitur.

Qualitates ex eodem.

Frigida est & sicca, ut ex adstringente gustu conijcitur.

Ptarmica, Sternutamentaria, siue Pyrethrum syluestre: quibusdam, Tanacetum aquaticum acutum: Italis, Oliuella: Germanis, Vvasser oder spitzer Keynfarn: Gallis, Herbe à esternuër.

Diosc. li. 2. ca. 156.



Locus.

Nascitur in montibus, & petrosis.

Qualitates.

Gale. li. 8. simpl. medica.

Ptarmicæ flores ciendæ sternutationis vim obtinent: est enim temperies eius calida, & sicca: viridis etiamnum ordine secundo: siccatæ tertio.

Cycla

Cyclaminus, Cyclamen, Rapum, Tuber, siue Vmbilicus terræ, aut Panis Porcinus: Græcis, κυκλάμινος: Arabibus, Buchor marien, Buther marien, siue Bothor mariæ: Officinis, Cyclamen, siue Arthamita: Italis, Cyclamino, siue Pan Porcino: Germanis, Schvvinbrott, siue Erdapffel: Hispanis, Pan de Puerco: Gallis, Cyclamen, siue Pain Porcin.



Locus.

Nascitur in vmbrosis, maximè sub arboribus.

Dio. lib. 2. cap. 158.

Qualitates.

Abstergit, incidit, ora venarum aperit, attrahit, & digerit: adeóque vehemens eius facultas est, vt abdomine illito, ventrem subducat, & fœtum interimat.

Gal. li. 7. simp. medica.

Ex Fuchsio.

Calfacit & desiccat tertio ordine.

Dracunculus maior, siue Serpentaria maior: Græcis, Δρακοντία μεγάλη: Arabibus, Luf, siue Alluf: Italis, Dragontea maggiore: Germanis, Natter vvurtz: Hispanis, Taragontia: Gallis, Serpentine, siue Serpentaire.

Dios.li.2. cap. 160.



Locus.

Nascitur in vmbrosis, & circum septa.

Qualitates.

Gale.li.6. simpl.medica.

Quiddam Aro persimile obtinet, tum folijs, tum radice: acrior tamen est, & amarior, ac proinde magis calfactoriæ, & subtiliorum partium. Habet etiam leuem quadam adstrictionem. Radix viscera omnia expurgat, crassos potißimùm & lentos succos extenuás: optimúmque remedium est contumacium vlcerum.

Ex Fuchsio.

Calfacit & desiccat.

Dracun

Dracunculus minor siue Serpentaria minor: Gręcis, Δρακοντία μικρά: Italis, Dragótea minore: Germanis, Kleyn Natter vvurtz: Gallis, Petite Serpentaire.



Locus.

Nascitur in sepibus vmbrosis. Dio. li. 2. cap. 151.

Qualitates ex Dioscoride.

Radix excalfacit, & Venerem stimulat.

Ex Theophrasto.

Radix cibo inepta penitus est, & Medicis tantùm commoda. Theoph. de natu. Plāt. li. 7. cap. 11.

Vide historiam Dracunculi maioris.

Dracunculus hortenſis, ſiue Dracunculus Acetariarum: Italis, Dragoncello: Gallis, Targon.

Locus ex Matthiolo.



Quibuſdam cultorum mangonio factitia eſt, ex Lini ſemine excauatis cepis impoſito, ac deinde terra recondito. Seritur tamen & radice, & ſemine, in Acetariarum vſum.

Qualitates ex eodem.

Perpenſa eius acrimonia, qua maximè linguam vellicat, eorum eſſe Medicamentorum, quæ valentiſſimè excalfaciunt, conijci poteſt.

Lingua

Lingua Serpentina: Græcis, ὀφιόγλωσσον: Italis, Lingua Serpentina, Argentina, siue Lucciola: Germanis, Natterzuonglin: Gallis, Herbe sans cousture, siue Langue de Serpent.

Locus ex Matthiolo, & Fuchsio.



Nascitur in Pratis Vliginosis, & montosis.

Qualitates ex Matthiolo.

Glutinatoria est: et commendatur mirificè ad Enterocelas.

Ex Fuchsio.

Desiccat absq; manifesto calore: idque ex gustu conijcitur.

Arum:

Arum: Græcis, ἄρον: Syris, Lupha: Arabibus, Iarus, ſiue Sara. Officinis, Aron, Barba Aaron, Dragontea minor, ſiue Serpētaria minor: Italis Aro, ſiue Gigaro: Germanis, Aron, ſiue Kleyn natter vvurtz: Hiſpanis, Yaro: Gallis, Vit de Chien.

Locus, ex Matthiolo.



Frequentiſſimum prouenit in campeſtribus, vineis, ſcrobium marginibus, ſemitis propter ſepes, & in maritimis.

Qualitates.

Gal.li.11. ſimp. me.

Terrena conſtat eſſentia, ſed calida: proinde extergendi vim obtinet, verum nō ita valentem ſicut Dracontium. Eſt itaque in exiccando & calefaciendo primi ordinis.

Ex Fuchſio.

Arum noſtrum calidum eſt & ſiccum tertio ordine: idque indicat vehemens eius acrimonia.

Ariſa

Arisarum primum.



Locus ex Matthiolo.

Plurimum naſcitur in agro Romano, non longè ab Vrbe.

Qualitates.

Acrius eſt Aro. Gale. li. 6. ſimp. me.

Ariſa

Arisarum alterum.



Locus.

Nascitur in vmbrosis.

Qualitates.

Huc refer prioris Arisari historiam.

Asphode

Asphodelus, siue, Hastula Regia: Græcis, ἀσφόδελος, Arabibus, Cheunce, Bhunte, Biruach, Abg, seu, Axeras: Italis, Asphodelo, Amphodillo, siue, Hastula Regia: Germanis, Gold vvurtz, siue, Heidnisch: Hispanis, Gamones, Gamonites: Gallis, Afrodilles.

Locus ex Matthiolo.



Montes syluosos amat.

Qualitates.

Asphodeli radix vtilis est sicut Ari, Arisari, & Dracontij, nempe extergentis & discutientis facultatis. Vsta autem cinis calidior & exiccantior, subtiliórque, ac digerere potẽtior efficitur: proinde & Alopecias sanat.*

Gal. li. 6. simp me.

*quidam legunt, Asari.

Scilla

Scilla, Varroni, Squilla: Græcis, σκίλλα: Arabibus, Haſpel, Hanſel, Aſchil, ſiue Alaſchil: Officinis, Squilla, ſiue Scilla: Italis, Squilla: Germanis, Meer zvvibel: Hiſpanis, Cebolla albatrana: Gallis, Squille, Stipoulle, Charpentaire, ſiue Oignon marin.

Locus, ex Matthiolo.



Innumeræ oriũtur in Hiſpaniæ maritimis.

Ex Fuchſio.

Seruntur vbique, vt Allia & Cæpæ.


Qualitates.

Gale.li.8. ſim.me.

Admodum incidẽtem facultatem obtinet, non tamen admodũ calidam. Secundi tamen eſt ordinis ex calfaciẽtium. Præſtat autem aſſam vel elixam ſumere, ad exoluendam eius vehementiam.

Capparis,

Capparis, Latinis, & Græcis: Arabibus verò Cappar, ſiue Kappar: Italis Capparo: Germanis, Kappren: Hiſpanis, Alcaparras: Gallis, Cappres.



Locus.

Tenui plerunque ſolo, aſperiſque locis, in inſulis, & iuxta rudera naſcitur.

Dioſc. li. 2. cap. 169.

Qualitates.

Capparis radicis cortex vincentem habet qualitatem amaram: proximam acrē: deinde acerbam. Conſtat ergo ex pugnātibus & diuerſis facultatibus. Incidit enim, purgat, & abſtergit amaritudine: excalfacit autem, incidit, & digerit acrimonia: porrò contrahit, denſat, & conſtringit acerbitate. Abſtergit item, nec ſegniter deſiccat. Fructu vtimur vt medicamento magis quàm vt alimento.

Gale. li. 7. ſimpl. medica.

Lepidium Dioſcoridis.




Nomenclaturam, locum, & qualitates, vide in hiſtoria Iberidis.

Lepidium

Lepidium Pauli Aeginetæ, & Plinij: Officinis, Piperitis maior: Italis, Piperella: Gallis, Passe rage, Chasse rage, siue, Poyurée.

Pli. li. 19. cap. 8.



Locus ex Fuchsio.

Seritur in hortis, et in multos annos perẽnat.

Qualitates ex eodem.

Excalfacit, ut Nasturtium, in quarto ordine: nõ tamen attingit tertiũ siccitatis gradũ. Huc etiam refer omnem Iberidis historiam.

Ranunculus primus: Græcis, βατράχιον: Italis, Ranunculo: Germanis, Hanen fuosz: Hiſpanis, Hyerua belida: Gallis, Grenoillette, ſiue Baſſinetz.

Locus ex Fuchſio.

Dioſc. li. 2. cap. 171.



Riguis gaudet & opacis, lætiſque pratis, & humidis. Item, naſcitur in limitibus humidis.

Qualitates.

Gal. lib. 6. ſimp. me.

Omnes Ranunculi vehementer acrem facultatem poſſident, adeò vt cum dolore exulcerent. Radix arefacta, ſternutatorium eſt medicamentum, ſimiliter alijs omnibus quæ valenter deſiccant. In ſumma, calida & ſicca valde eſt tum radix, tum vniuerſa adeo herba. Radix ſicca frangit dentes valenti exiccatione.

Ranun

Ranunculus ſecundus, Apium riſus, ſiue Herba Sardonia, aut Sardoa, Salluſtio, Plinio verò, Apiaſtrum.

Plin. libr. 20. ca. 11.



Locus ex Fuchſio.

Riguis & fontium ſcaturiginibus gaudet.

Ex Dioſcoride.

Plurimum in Sardinia prouenit.

Dio. li. 2. cap. 171.

Qualitates.

Venenatam vim ſortitur: cæterà Ranunculo ſimilis.

Tertius Ranunculus: Gallis, Baſſinetz.



Locus ex Fuchſio.

Naſcitur temerè in Pratis, & Campeſtribus.

Qualitates.

Huc refer omnem Ranunculi hiſtoriam.

Ranun

Ranunculus quartus: Germanis, Vveisz Vvalt thendlin: Gallis, Grenoillette blanche: Italis, Pie Coruino.



Locus ex Fuchsio.

Syluosis gaudet, & opacis.

Qualitates.

Eiusdem est temperatura, cuius Ranunculus.

Ranunculus quintus: Italis, Pie di Gallo: Germanis, Druosz vvurtz: Gallis, Piepou.



Locus, ex Fuchsio.


Nascitur in Campestribus, & Pratis.

Qualitates ex Matthiolo.

Radix acris est & exulcerans: folia item septica sunt.

Anem

Anemone: Græcis, ἀνεμώνη: Arabibus, Iackaik alnahamen, siue, Sakaık anhea-men: Italis, Anemone: Germanis, Anemoner roeszlin: Gallis, Passefleur.



Locus. *In Aruis sæpius enascitur: seritur tamen hodie in hortis ad Coronas.*

Dio. li. 2. cap. 172.

Qualitates. *Anemonæ omnes acrem extergēdi, attrahendi, & ora vasorum reserandi facultatem obtinent. Radix commansa pituitam euocat: & succus ex naribus purgat.*

Gal. li. 6. sim. me.

Anemone altera : Gallis, ſeconde eſpece de Paſſe fleur.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Anemones hiſtoriam.

Pulſ

Pulſatilla: Germanis Ruchenschell.



Locus.

Seritur hodie ad Coronas.

Qualitates, ex Matthiolo.

Folia ſapore ſunt perquàm acri, adeò vt nõ minus exulcerent quàm Ranunculus, & Flã mula. Radicis ſapor ſubdulcis, non autẽ acris, veluti foliꝭs & caulibus. Hanc miris laudibus efferunt contra peſtilentiam & hauſta venena, itemq́ cõtra venenoſorũ morſus & ictus.

Anag

Anagallis mas, siue. Morsus Gallinæ: Græcis, ἀναγαλλίς: Italis, Anagallide: Germanis, Gauch heyl: Hispanis, Muruges: Gallis, Morgeline, siue, Mouron à fleurs rouges.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur vbique, maximè in læto, solo.

Qualitates.

Gal. li. 6. simp. me.


Anagallides extergunt valenter: habentq; quendam calorem attractoriũ: ita vt infixos aculeos attrahant. Desiccãt citra mordicationẽ: & glutinatoriæ sunt. Succus ex naribus purgat.

Ex Fuchsio.

Calidæ sunt & siccæ: detergent enim cutem illitæ.

Anag

Anagallis fœmina: Gallis, Mouron bleu.



Locum & Qualitates vide in hiſtoria Anagallidis maſculæ.

Morſus

Morſus Diaboli, aut Succiſa.



Locus ex Matthiolo.

Prouenit in incultis, in ſaltibus, pratis, et dumetis.


Qualitates. ex eodem.

Herba viridis trita et imposita, carbunculis peſtiferis præſenti remedio eſt: aut ſi vinum, in quo decocta fuerit, bibatur. Radix, per ſe eſtur, aut eius decocti vinū vtiliter bibitur ad peſtilentem auram arcendam, & ad vteri dolores. Calidæ, & ſiccæ eſt facultatis. Siccatæ puluis valet ad tineas alui necandas. Radix illita ſugillata emendat.

Hedera

Hedera Helix: Græcis, κισσὸς: Arabibus, Cuſſus: Italis, Hedera: Germanis, Mavver, Ephevvbaum, Ephevv, ſiue, Ebich: Hiſpanis, Edera, ſiue, Era: Gallis, Terreſtre, ſiue, Lyerre.

Locus, ex Fuchſio.



Naſcitur temerè in ſyluoſis, ſcanditq́ue arbores, et humi repit.

Qualitates.

Gal. lib. 7. ſim. me.

Hedera ex cõtrarijs compoſita eſt facultatibus: habet enim quiddã adſtringentis ſubſtãtiæ, quã terrenam & frigidam eſſe cõſtat. Habet item nonnihil acris: quã calidam eſſe vel guſtus comprobat. Aqueam præterea ſubſtantiam quandam tepidam obtinet, certe ſi viridis ſit. Siquidem arefacta hæc prima exhalet neceſſe eſt: manetq́ue, quæ terrea & frigida eſt, adſtringens: & ea quæ calida, & acris.

Hedera

Hedera arborea: Gallis, Lyerre se tenant en pied comme vn Arbre.



Dio. li.2. cap.175.

Locus ex Fuchsio.

Humidis gaudet & parietinis.


Qualitates.

Hedera omnis acris est, & adstringens. Lacryma autem psylothrum est. Vide historiam Hederæ Helicis.

Cheli

Chelidonium maius: Græcis, χελιδόνιον μέγα: Arabibus, Kauroch, Chalidunium, Chilodomontoma, seu Memirã: Italis, Celidonia: Germanis, Schel vvurtz, siue Schelkraut: Hispanis, Celiduenha, siue Yerua de las golundrinhas: Gallis, Chelidoine, Esclere, siue Felongne.

Locus ex Matthiolo.



Fructicat propter sepes in scrobium ripis, secus vias, inter rudera, & in ædificiorum ruinis, seu parietinis.

Qualitates.

Gale. li. 8. simp. medica.

Extergentis admodum & calidæ facultatis est: Succus eius ad acuendũ visum commodus est: vtique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur, digestione indigens.

Ex Fuchsio.

Calfacit & desiccat tertio ordine completo.

Chelidonium minus, Triticum syluestre, siue Scrofularia minor: Græcis, χελιδόνιον μικρὸν: Arabibus, Memiten, seu Chilodomon: Italis, Celidonia minore, seu Fauoscello: Germanis Feigvvartzen Blanterkraut, Pfaffenhoëdlin, & Meienkraut: Hispanis, Scrofularia menor: Gallis, Couillons de Prestres, siue Petite Esclere.

Dios. li. 2. cap. 177.

Locus.

Iuxta aquas & Lacus nascitur.



Qualitates.

Gal. li. 8. simpl. medica.

Chelidonium minus, cùm acrius sit maiore, celeriter illitum cutem exulcerat, & unguésque scabros eÿcit. Succus eius per nares purgat, ut pote admodum acer. Itaque quarti est ordinis calefacientium, & desiccantium. Ex Fuchsio.

Nullam habet euidentē acrimoniā nostrum Chelidonium: modò nō germinet in loco arido.

Aqui

Aquilegia, Aquilina, quibusdam, Chelidonium maius: Italis, Aquilina: Germanis, Ackeley: Gallis, Ancholies.

Locus ex Fuchsio.



Seritur ad coronas, in hortis. Sponte tamen nascitur in pratis vliginosis, montibus syluosis, et inter saxa & fruteta: aquamque perennem subesse vbicunque deprehendatur Aquileges dicunt.

Qualitates ex eodem.

Gustu aliquatenus dulcis est: itáque vim moderatè calfaciendi & digerendi obtinet.

Auricula muris: Græcis, *μυὸς ὦτα, ἢ, μυὸς ὠτίον*: Italis, Orecchia di topo: Germanis, Vvaldt mangolt mit blauuen bluomen: Hispanis: Oreya de raton, Yerua: Gallis, Oreil le de rat, ſiue Eſpece de Mouron.



Locus ex Matthiolo.

Viret in Pratis, in Campis, in hortis, ſecus vias, & vbique ferè locorum,

Qualitates.

Gale. li. 7. ſimpl. medica.

Auricula muris, deſiccat ordine ſecundo: cæterum nullam euidentē caliditatem poßidet.

Gla

Glastum, siue Isatis satiua: Græcis, ἰσάτις ἥμερος: Arabibus, Dili, Dileg, Vesme, Chate, Alchat, Adlen, Adhlen, seu Nil: Italis, Isatide, Glasto, seu Guado: Germanis, Vveidt: Hispanis, Pastel: Gallis, Guede, seu Pastel.

Locus.



Seritur in Gallia Narbonensi, magno prouentu: & in Germania ad Erdfordiam.

Qualitates.


Isatis satiua, qua vtuntur tinctores, facultatis est valenter exiccantis, nondum tamen mordentis: est enim simul amara atque adstringens.

Gal.li. 6. simp. medica.

Ex Matthiolo.

Fit ex Isatide Pictorum Indicum.

Isatis syluestris: Græcis, ἰσάτις ἀγρία: Gallis, Pastel sauuage, Italis, Guado saluatico: Germanis, Vvaldt vveidt.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur in vinetis propè Tubingam, & in pluribus Germaniæ locis.

Galе. li. 6. simpl. medica.

Qualitates.

Isatis syluestris manifestè iam acre quiddam tum gustu tum actione præfert. Proinde quàm satiua valentius desiccat, valentius etiam humidis putredinibus obsistit.

Tele

Telephium, Fabaria, Faba inuerſa, Illecebra, Craſſula minor, ſiue Faba craſſa: Græcis, τηλέφιον, ἢ ἀίζωον ἀγρίον: Italis, Faba graſſa: Gallis, Repriſe, Ioubarbe des vignes, Feue eſpeſſe, ſiue Chicotrin.



Locus.

Naſcitur in cultis, & maximè inter vites.

Dio. li.2. cap. vlt.

Qualitates.

Telephium exiccandi & detergendi facultate eſt, non tamen inſigniter calida, verùm in hoc forſan quiſpiam ipſum primi eſſe ordinis cenſeat. Deſiccat tamen ſecundo ordine intenſo, aut certe principio tertij.

Gal. li. 8. ſimpl.medica.

Ex Matthiolo.

Iſtas qualitates non reperies in noſtrate Fabaria, & ſi notis omnibus ad Telephij hiſtoriam accedat.

Agaricum, Latinis, & Græcis, Arabibus verò, Garichum, ſeu Garicum: Italis, Agarico: Germanis, Dannen ſchvvan: Hiſpanis Agarico: Gallis, Agaric.

Locus.

Dioſ. li. 3. cap. 1.



Naſcitur in arborum caudicibus, quadam putredine.

Ex Matthiolo.

Gignitur in Laricum caudicibus.

Qualitates.

Gal. li. 6. ſim. me.


Primo guſtu dulce, ſed paulopoſt ſubamarum apparet: & acrimoniæ quandam ſpeciem temporis ſpatio inducit, leuiculæq; adſtrictionis. Eſt et conſiſtentia laxa. Conſtat ergo ex ſubſtantia aërea, & terrea à caliditate extenuata: maximúmque habet ſubſtantiæ aqueæ. Hac ratione digerendi, & calfaciendi vim habet, & craßitudinem incidendi, tum infarctus viſcerum expurgandi.

Gentia

Gentiana: Græcis, γεντιανή: Arabibus, Gentiana, Genthiana Baſilica, ſiue Baſateca: Italis, Gentiana: Germanis, Entzian, Bitter vvutz, ſiue Creutz vvurtz: Hiſpanis, Gentiana: Gallis, Gentienne.

Locus.

Dioſ. li. 3. cap. 3.



Naſcitur in ſublimibus montium iugis, vmbroſis locis, aquoſiſque.

Qualitates.


Gal. li. 6. ſim. me.

Radix valde efficax eſt, vbi extenuatione, purgatione, abſterſione, obſtructionis liberatione opus ſit. Nec mirum, cùm impenſè ſit amara.

Ex Auicenna.

Excalfacit ordine tertio, ſiccátque ſecundo.

Cruciata, ſiue Gentiana minor: Italis, Pettinborſa.



Locus ex Matthiolo.

In incultis præcipuè locis naſcitur.

Qualitates ex eodem.

Eadem præſtat quæ Gentiana. Radix pollet contra venenatorum ictus, & peſtilentiā.

Ariſto

Ariſtolochia rotunda: Græcis, ἀριστολοχία: Arabibus, Zaraund, Maſmocra, ſiue Zaraued: Officinis, Ariſtologia: Italis, Ariſtolochia: Germanis, Oſter lutei: Hiſpanis, Aſtronomia: Gallis, Sarrazine ronde, ſiue Ariſto logie ronde.

Locus ex Plinio.

Pli.li.25. cap.8.



Pinguibus locis & cápeſtribus gaudet.

Ex Matthiolo.

Plurima naſcitur in agro Goritienſi, quanquam non vbique proueniat.

Qualitates.

Gale.li.6. ſimp.medica.

Radix amara eſt & ſubacris. Rotunda ad omnia eſt efficacior. Quæ Clematites appellatur, fragrantior eſt, & ad ſanationes infirmior. Rotunda craſſos humores extenuat.

Ex Fuchſio.

Ex amaritudine & acrimonia quam poſſident, cenſentur calida & ſicca in ſecundo ordine intenſo, vel etiá in tertio inchoante. Ari

Ariſtolochia longa, ſeu, Piſtolochia Plinij: Gallis, Foterle, Rattelou, ſiue Sarrazine longue: Italis, Ariſtolochia longa: Germanis, Hol vvurtz.

Plin. libr. 25. ca. 8.

Locus ex Plinio.

ſuprà eo.



Naſcitur in pinguibus locis, & Campeſtribus.

Ex Fuchſio.

Inuenitur vbiq; ferè, maximè in vineis, & ſcrobium marginibus.

Gale. li. 6. ſimp. me.

Qualitates.

Minus tenuitatis obtinet quàm rotunda. Abſtergendi atque excalfaciendi potentiam poßidet: minus tamen abſtergit ac digerit quam rotunda: ſed non minus calefacit, imò etiam plus, modicéque abſtergit. Vide hiſtoriam Ariſtolochiæ rotundæ.

D ulcis

Dulcis radix, siue, Liquiritia: Græcis, γλυκύῤῥιζα: Arabibus, Sus: Italis, Regolitia: Germanis, Leckritz, siue, Sueszholtz: Hispanis, Regaliza: Gallis, Reclisse, Erculisse, seu Reygallisse.

Locus ex Matthiolo.



Abundat hac Apulia, præsertim Gargano monte. Visitur etiamnum in Viridariis ad spectaculū, & ad medicinam sata.

Qualitates.

Natura eius familiaris est temperaturæ nostræ, Temperamentum eius, quantùm ex caliditate & adstrictione est, tepidum est potius quàm temperatum. Cæterum modicè est humidum, & humana natura frigidius.

Gal. li. 6. simpl. medica.

Centau

Centaurium maius, siue, Officinarum Reuponticum: Græcis κενταύριον μέγα: Arabibus, Chanturion, Kibir, Sacurion habre, siue Canthurium.

Dio. li.3. cap.6.



Locus.

Amat solum pingue et apricum, ac syluas & colles.

Ex Matthiolo.

Numerosum nascitur in Gargano Apuliæ monte, & in monte Baldo in agro Veronensi, ad lacum Benacum.

Qualitates.

Gal. lib.7. simpl. medica.

Radix sicut gustu contrarias qualitates, ita in vsu contrarios effectus demonstrat. Gustu itaque acris simul adstringensque apparet, cum leuicula quadam dulcedine. In actionibus, acrimonia quidem caliditatis, adstrictio verò crassæ, terrenæque frigiditatis opera demonstrat. Succus eadem quæ radix efficit.

Cen

Centaurium minus, Fel terræ, siue Febri fuga: Græcis, κεν]αύριον μικρόν: Arabibus, Chanturion sege, & Segir, seu, Katarion sages: Italis, Centaurea minore: Germanis, Tausent gulden Kraut, Fieber Kraut, Erdt gall, seu, Biber, Kraut: Hispanis, Fel de tierra: Gallis, Repeyret, Fiel de terre, Centaurée, siue, Chante poulet.



Locus.

Rigua amat loca. Diosc.li.3. cap.7.

Ex Apuleio.

Firmum solum amat.

Qualitates.

Radix inefficax est. In foliis & floribus vincit qualitas amara, paululum habens adstrictionis. Atque ob eiusmodi temperamentum admodum desiccatorium est medicamentum, expers mordacitatis. Succus earum abstergit & desiccat. Gale.li.7. simp.me.

Chamæ

Chamæleon albus, Ixia, Carduus Suarius, aut Varius, siue Cardopatium: Græcis, χαμαιλέων λευκός: Arabibus, Chemeleon leute, siue, Chamalium: Italis, Carlina: Germanis, Vveisz eber vvurtz: Hispanis, Cardo pinto: Gallis, Carline, siue, Chameleon blanc.

Locus ex Fuchsio.

Dios li. 3. cap. 8.



Nascitur in siccioribus mōtium & Collium locis, & minus herbidis.

Qualitates ex eodem.

Radix calfacit secundo ordine, & desiccat tertio.

Chamæ

Chameleon niger, Carduus niger, aut vernilagium: Græcis χαμαιλέων μέλας: Arabibus, Chemeleon Melamos: Italis, Cameleone nero, Germanis, Schvvartz ebervvurtz: Hiſpanis, Cardo pinto: Gallis, Chardonnette.

Locus.



Prouenit in Campeſtribus ſiccis, & cliuoſis tractibus, & maritimis. Dioſ. li. 3. cap. 9.

Ex Theophraſto.


Loca gelida humidáque amat. Theo. de nat. plát. li. 9. c. 13.

Qualitates, ex Fuchſio.

Radix deſiccat tertio receſſu: & excalfacit in fine ſecundi.

Dipſacus, Labrum Veneris, Carduus Veneris, Virga Paſtoris maior, ſiue, Cardo Fullonum: Græcis, Δίψακος: Arabibus, Dibſacos: Italis, Cardo da cardare, ſiue Garzo: Germanis, Karten diſtel, Garden kraut, Burbenſtrel, ſeu Vveber karten: Hiſpanis, Cardencha, ſeu Cardo penteador: Gallis, Chardon à carder.

Locus ex Matthiolo.



Seritur ſingulari diligentia. Sponte etiam naſcitur in campeſtribus, agrorum & ſcrobium aggeribus & in viis iuxta ſepes.

Qualitates.

Gal. li. 6 ſimp. me.

Radix ſecundo ordine exiccatoria eſt habétque non nihil abſterſorium.

Virga

Virga Paſtoris minor.



Locus ex Matthiolo.

Iiſdem ferè locis naſcitur quibus Dipſacus.

Qualitates.

Huc refer omnem Dipſaci hiſtoriam.

Spina alba: Græcis, *ἄκανθα λουκὴ*: Arabibus & Officinis, Bedeguar: Italis, Spina bianca: Germanis, Vveiſz Gartten Diſteln: Gallis, Eſpine blanche.



Locus.

Dioſc. li. 3. cap. 12.

Naſcitur in montibus, & ſyluoſis.

Ex Matthiolo.

Seritur in hortis.

Qualitates.

Gal. li. 6. ſimpl. medica.

Radix deſiccatoria eſt, & modicè adſtringens. Semen tenuis eſſentiæ, & calidæ facultatis eſt.

Acan

Acanthus, Acantha, Pæderota, Marmoraria, ſiue, Branca vrſina: Græcis, ἄκανθος: Italis, Branca Orſina: Germanis, Beren klavv: Hiſpanis, Yerua giguante, ſiue, Branqua vrſina: Gallis, Branque vrſine.



Locus.

Naſcitur in hortis, petroſis, & riguis,

Qualitates.

Folia mediocriter digerentem facultatem obtinent: at radix exiccatoria eſt, & leuiter inciſoria, & tenuium partium.

Dioſ. li. 3. cap. 17. Gale. li. 6. ſimpl. medica,

Anonis, Ononis, Remora aratri, Acutella, siue, Resta Bouis: Græcis, ἀνωνίς, ὀνωνίς: Italis, Bonaga: Germanis. Havvhechel, siue, Stallkraut: Hispanis, Gatillos, siue, Gathinos: Gallis, Arreste beuf, Bugraues, seu Bugrundes.



Locus, ex Matthiolo.

Nascitur in pratis, cultis, & incultis locis, arido præsertim solo.

Qualitates.

Gal. li.8. sim. me.

Radix tertio quadante nus ordine excalfacit. Cortex eius habet quidpiam abstersorium, & incisorium.

Alba

Alba ſpina, ſiue, Lactaria: Græcis, λευκάκανθα: Italis, Cardo di ſancta Maria: Germanis, Marien Diſtel: Gallis, Chardon noſtre Dame.



Locus, ex Matthiolo.

In Aruis, & campeſtri planicie naſcitur.

Qualitates.

Radix amara eſt: proinde incidit & exiccat tertio ordine: in calfaciendo autem ex primo eſt ordine.

Gal. li.7. ſim. me.

Tragacantha, Latinis & Græcis: Arabibus, Chitira, Itica, Chatheth, Alcuted, ſeu, Alchathad: Italis, Draganta: Germanis, Dragant: Hiſpanis, Alquetira: Gallis, Draganta.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in Gargano Monte Apuliæ.

Qualitates.

Gal. li. 8. ſim. me.

Tragacantha ſimilem gummi vim obtinet, emplaſticam quãdam, & acrimoniam hebetiorem (legunt aliqui, quæ acrimoniam obtundit) & ſanè ſimiliter illi deſiccat.

Eryng

Eryngium, Erynge Plinio: quibusdam, Centum capita: Græcis, ἠρύγγιον: Officinis, Iringus: Italis, Eringio, seu, Iringo: Germanis, Brachen distel, siue, Manstrevv: Hispanis, Cardo corredor: Gallis, Panicault, seu, Eryngium.



Locus.

Nascitur in asperis, et campestribus.

Dioscor. lib. 3. cap. 21.

Qualitates.

Eryngium caliditate quidem aut parum, aut nihil quæ temperata sunt superat. Siccitatẽ verò in tenui essentia consistentem, non paruam obtinet.

Gal. li. 6. sim. me.

Eryngium Marinum, falsò Crocodilium dictum.



Locus ex Plinio.

Pli.li. 22. cap. 7.


Nascitur in littoribus maris.

Qualitates ex eodem.

Valet aduersus venenata: cætera Eryngio simile.

Aloë

Aloë Latinis, & Græcis: Arabibus, Saber, Paber, ſeu, Sabar: Italis, Aloë: Germanis, Alepatic, ſiue, Bitter Aloës: Hiſpanis, Yerua baboſa: Gallis, Aloës, Parroquet, ſeu, Ioubarbe de Mer.



Locus.

Dio. li. 3. cap. 22.

Plurima in India gignitur. Naſcitur etiã in Aſia & Arabia in locis quibuſdã maritimis, & in inſulis.

Ex Matthiol.

Fouetur ad ſpectaculũ in fictilibus vaſis.

Qualitates.

Gale. li. 6. ſimp. me.

Multiplicis eſt naturæ: adſtringit enim mediocriter guſtu, ſed vehementer amara eſt. Succus eius deſiccat abſque mordicatione. Tertij eſt ergo ordinis exiccantium: calfacientium autem primi intenſi, aut ſecũdi exoluti.

Opun

Opuntia Plinii, seu, Ficus Indica.



li.21.c.17.

Locus, ex Plinio.


Huius folio tantùm plãtato radices fiunt: fouetur q; ad spectaculum figulinis.

Qualitates ex eodem.

Homini dulcis.

Abſinthiũ, Latinis, & Græcis: Arabibus, Affinthiũ: Italis, Affenzo: Germanis, Vvermuot, aut, Eltz: Hiſpanis, Aſentios, ſiue, Alosna. Gallis, Aluyne, Fort, ſeu, Ablynce.

Locus ex Apuleio. Dioſ. li. 3. cap. 23.



Non ſolùm cultis gaudet: ſed & Montibus, & locis ſaxoſis.

Qualitates. Gal. li. 6. ſim. me.

Adſtrictoriam, amarã, & acrem ſimul qualitatem poßidet, excalfaciẽs pariter et extergens, roborãs, & deſiccans, Magis tamen calfacit quã refrigeret, propter acrimoniam: Vt ſit calidum primo exceſſu, & ſiccum tertio. Succus herba ipſa calidior eſt.

Abſin

Abſinthium marinum, ſiue, Seriphium: Italis, Aſſenzo marino: Gallis, Petit Fort.



Locus ex Matthiolo.

Frequentiſsimum eſt in Maris Littoribus.

Gal. li. 8. ſim. me.

Qualitates.

Specie & guſtu Abſynthio ſimile eſt: inde igitur qualitates ipſius conijcito.

Abro

Abrotonum mas: Græcis, ἀβρότονον: Arabibus, Catſum, Keſum, ſiue, Gaiſſum: Italis, Abrotano, ſeu Veronica: Germanis, Stabvvertz, Scheszvvertz, ſeu, Gert vvurtz: Hiſpanis, Abrotano, & Hyerua Lombriguera: Gallis, Auronne, ſeu, Brotonne.

Locus ex Matthiolo.



Seritur, & ſponte naſcitur in campeſtribus.

Qualitates. Gale. li. 6. ſimi. me.

Calidum & ſiccum facultate in tertio ordine, poſt media, ſitum eſt: Itaq; nō inſtrenuè calfacit, et deſiccat, imò etiā vlcerat. Digerendi et incidēdi vim etiam quandam habet, rarefaciendi, & mordendi: tenuium enim eſt partium.

Abro

Abrotonum fœmina: Italis, Cipreſſo, ſiue, Santolina. Germanis, Garten Cypresz: Gallis, Cyprés, ſiue, Garderobbe.



Locus ex Fuchſio.


Pingue ſolum & lentum amat: Seritur etiam in hortis.

Qualitates ex Fuchſio.

Ex guſtu acri, amaro, & aliquatenus acerbo conijcitur deſiccare abſq; calore manifeſto. Cætera Abrotano Maſculo ſimile.

Hiſſop

Hiſſopum, ſeu Hiſſopus Latinis, & Græcis: Arabibus, Cyfe, Infa, ſiue Iabes: Italis, Yſopo: Germanis, Firch, Hyſſop, ſeu oſter Hiſſop: Hiſpanis, Hiſopo Yerua, ſeu Hiſſopillo yerua: Gallis, Yſope.



Locus.

Montanum eſt, & hortenſe. Dio. lib. 3. cap. 26.

Qualitates.

Deſiccat & excalfacit ordine tertio: ſed & tenuium eſt partium. Gale. li. 8. ſimpl. medica.

Ex Meſue.

Facit ad pituitoſos tum cerebri, tum neruorum affectus, pituitam enim manifeſto experimento purgat.

Gratiola, siue Gratia Dei: Foroiulien-
sibus, Stanca Cauallo.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in locis humidis, præcipuè in pratis Vliginosis: prouenítque in Paluſtribus.

Qualitates ex eodem.

Vulneraria eſt, amariſsima guſtu, & quadamtenus aſtringens. Bilem pituitámque tam ſicca, quàm recens, abundè trahit, & aluum Vehementer purgat.

Stœcas: Græcis, στοιχὰς: Arabibus, Astocodos, Astuhorados, seu Astuchudes: Officinis, Sticados Arabica: Italis, Stecade: Germanis, Sticas Kraut: Hispanis, Cantuesso: Gallis, Steçados.



Locus.

Nascitur iuxta Galliam, in Insulis eiusdem nominis è regione Massiliæ. Diosc. li. 3. cap. 27.

Ex Matthiolo.

Arabiæ germana est: & ex Alexandria Aegypti comportatur Venetias. Nascitur etiam in Gargano Apuliæ Mõte.

Qualitates.

Gustu amara est, & mediocriter subadstringens. Constat autem essentia terrena frigida exigua, vnde adstringit: & ex attenuata altera copiosiore, à qua vtique amara est. Cæterum obstructiones expedit. Gale. li. 8. simp. medica.

Origanum Heracleoticum, siue Cunila: Græcis, ὀρίγανος: Arabibus, Fandenegi, Fudenegi, siue Faudenegi.



Locus ex Matthiolo.

Exoticum est, & Cretensibus germanum.

Qualitates.

Gal. li.8. simp. medica.

Origanus Heracleotica efficacior est Onitide: sed agrestis valentior vtraque est. Omnes vero incidendi, extenuandi, calfaciendique facultatem possident, hásque tertio excessu obtinent.

Origa

Origanum Onitis.



Locus ex Matthiolo.

Exoticum est, & Cretensibus familiare.

Qualitates.

Huc refer omnem Heracleotici Origani historiam.

Origanum ſylueſtre, ſiue Origanum Offi cinarum: Italis, Origano: Germanis, Vvolgemuot, Rottdoſten, ſiue Coſtentz: Hiſpanis, Oreganos: Gallis, Mariolaine d'Angleterre, ſeu, Origan.



Locus ex Matthiolo.


Sponte naſcitur in Campeſtribus, aſperis, clinoſiſque locis, & Montibus: ſed & gaudet ſepibus, & dumetis.

Qualitates ex Galeno.

Huc refer omnem Heracleotici Origani hiſtoriam.

Trago

Tragoriganum: Gallis, Groſſe Mariolaine baſtarde.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur frequens in Agro Foroiulienſi. Sed & hodie viſitur in hortis.

Qualitates.

Tragoriganum aſſumpſit adſtrictionis quidpiam: cætera Origano ſimile.

Gal. li. 8. ſimpl. medica.

Pulegium: Græcis, γλήχων: Arabibus, Alnam, Alnegen, ſeu Aluegen: Italis, Pulegio: Germanis, Poley, ſiue Hertz poley: Hiſpanis, Poleyo: Gallis, Pouliot, ſeu Pillolet.



Locus ex Fuchſio, & Matthiolo.


Naſcitur in cultis, & aquoſis: fouetúrque in hortis, & fictilibus.

Qualitates.

Gale. li. 6. ſimp. me. *Acre & ſubamarum eſt: itaque valde tum calfacit, tum extenuat. Rubrificat quoque, et vlcerat: & humida, craſſa, & lenta ex Thorace euocat.*

Dictam

Dictamnum: Græcis, Δίκταμνος: Arabibus, Mescatremesir, Alnegem Araba, siue Bary: Germanis, Diptam, seu Vvilden poley: Hispanis, Dittamo real: Italis, Dittamo: Gallis, Diptam.



Locus.

Proprium est Cretæ Insulæ, & rara admodum herba est: amátque solum asperum.


Theoph. de natu. plāt. li. 9. cap. 26.

Qualitates.

Dictamnum tenuiore essentia constat, quàm Pulegium: cæterà illi simile.

Gal. li. 6. sim. me.

Pſeudo Dictamnum.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in quibuſdam Hetruriæ montibus.

Qualitates.

Gal. li. 6. ſim. me. *Pſeudo Dictamnum ad omnia imbecillius Dictamno eſt.*

Saluia

Saluia maior, siue Saluia Mascula, & hortensis, Theophrasto, Sphacelus: Græcis, ἐλελίσφακος: Arabibus, Aelisfacos, seu, Elisphacos: Italis, Saluia maggiore: Germanis, Grosz salbey: Hispanis, Saluia, siue, Salua: Gallis, Grosse Sauge.

Theo. de na. plan. li.6.ca.2.

Locus, ex Matthiolo.



In Campestribus, asperis, incultis, & montibus prouenit: sed & cicuratur in hortis.

Diosc. li.3. cap.34.

Qualitates.

Temperamento est euidenter excalfaciente, & leniter adstringente.

Gal. lib.6. simp.me.

Saluia

Saluia minor, siue, Saluia Fœmina, aut agrestis: Gallis, Petite Sauge.



Locus ex Matthiolo.

Asperis & saxosis gaudet: sed & seritur in hortis.


Qualitates.

Habita proportione syluestrium ad satiuas, similis est saluiæ masculæ.

Mentha:

Mentha: Græcis, ἡδύοσμος: Arabibus, Nahanaha: Italis, Menta: Germanis, Muntz.: Hiſpanis, Yerua buena & ortelana: Gallis, Mente.

Locus ex Fuchſio.



Seritur vbique in hortis. Fimum odit, & inſolato loco gaudet, quanquã magis fructicet in humido.

Qualitates.

Guſtu acris, & facultate calida eſt, ex tertio ordine calfaciẽtium: obq; eam quæ ex cultu accedit humiditatem, mediocriter ad Venerem excitat. Deſiccat ſecundo ordine. Gal. li.6. ſimp. me.

Mentha

Mentha altera, nil differt à priore: proinde ex illa, ſumito de hac iudicium.



Menthaſtrum

Menthaſtrum, ſiue, Mentha ſylueſtris, quibuſdam, Minthe non odorata.



Locus ex Fuchſio.

Lætis gaudet & riguis.

Qualitates.

Acrior eſt & magis calida quàm Mentha, & magis deſiccat. Habet etiam quiddam amarum in ſe, & acerbum. Subſtantia eſt tenuium partium, ſi qua alia eſt herba.

Gale.li.6. ſimp.me.

Mentha

Mentha Græca, Menta Matronalis, Saluia Romana, Herba Diuæ Mariæ, ſiue Lasſulata: Germanis, Vnſer fravven Muntz: Gallis, Mente Noſtre Dame, ou Coq.

Locus, ex Matthiolo.



Seritur in hortis, eſtque Embemmatis familiaris.

Qualitates, ex Matthiolo.

Succus epotus lumbricos necat, frigido vtero ſubuenit ventriculúmq; roborat, tam hauſtus, quàm illitus, & vomitiones compeſcit. Herba infarctus expedit, & capiti robur addit, veneniſque ſerpentium reſiſtit.

Calamintha

Calamintha montana: Græcis, καλαμίνθη: Arabibus, & Officinis, Calamentum.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in excelsis montibus.

Dio. libr. 3. cap. 36.

Qualitates.

Essentia est tenui, & calida siccáq; temperie, ex tertio quodammodo ordine vtraq; qualitate. Gustu acris & palàm calida est ac paulùm omnino subamari habet. Imposita valde excalfacit, & mordicat, vlcerátque cutem. Intus assumpta, calfacit, & sudores ciet. Ad venenata etiam prodest: inciditque propter tenuitatem eius, calorem, & amaritudinem: & abstergit propter solam amaritudinem. Montana adhæc omnia efficacior est reliquis.

Gale. li. 7. simpl. medica.

Calamintha altera, seu Nepeta: Officinis, Calamentum communis vsus: Italis, Calamento, seu Nipotella: Germanis, Vvild poley: Hispanis la Neuada: Gallis, Calament commun, seu Pouliot sauuage.



Locus.

Diosc. li. 3. cap. 36. *Nascitur in campestribus, asperis, & aquosis.*

Qualitates.

Huc refer omnem Calamenti montani historiam.

Cala

Calamintha tertia, Menthastri ſpecies.



Locus.

Naſcitur in campeſtribus, aſperis, præſertimque in locis aquoſis. Dioſ. li. 3. cap. 36.

Qualitates.

Ad omnia inefficacior eſt montana: cæterà illi ſimilis.

Herba Cattorum: Italis, Gattaria, ſeu, Herba Gatta: Gallis, Herbe du Chat.



Locus ex Fuchſio.

Naſcitur in aquoſis.

Qualitates.

Ad Apiaſtrum potius accedit, quàm ad Pulegium, vel Calamentum.

Thymum

Thymum, Thymus, ſiue, Serpillum Romanum: Græcis, θύμος: Arabibus, Haſce: Italis, Thymo: Germanis, Romiſcher quendel, ſeu, Vvelſcher quendel: Hiſpanis, Tomillo ſalſero: Gallis, Thym, primme Mariolaine, ſiue Mariolaine de Languedoc.



Locus.

Gracili ſolo, & petroſo prouenit.

Qualitates.

Incidit, & calfacit manifeſtè: éſtque in calfaciendo & ſiccando in tertio ordine ſitum.

Dioſ. li. 3. cap. 37. Gale. li. 6. ſim. me.

Satureia, Thymbra, ſiue, Cunila: Græcis, θύμβρα: Arabibus, Sahater, ſeu, Shatar: Italis, Tymbra, Coniella, Sauoreggia, ſeu, Peuerella: Germanis, Kunel, Zvvibel yſop, ſeu, Saturey: Hiſpanis, Segurella: Gallis, Sauorée, & Sarriette.

Dioſ. li. 3. cap. 38.



Locus.

Gignitur in aſperis locis, et tenui ſolo: gaudet etiam ſabuloſis, ſeritúrque in hortis.

Qualitates. ex Aegineta.

Aegi. li. 7.

Syluestris eadem quæ Thymum præſtat: hortenſis autẽ imbecillior eſt, ſed ad ciborũ vſum accommodatior.

Ex Fuchſio.

Calfacit & deſiccat exceſſu tertio.

Serpyllum: Græcis, ἕρπυλλος: Arabibus, Hemen: Italis, Serpillo: Germanis Quédel, seu, Hueuer Koël: Hispanis, Serpollio, seu, Serpam: Gallis, Serpollet.

Locus, ex Matthiolo. Dios. li. 3. cap. 39.



Nascitur in petris, locisq; cliuosis. Seritur tamen in hortis magna diligẽtia: emacratumq; & tenue solum amat, modò siccum sit, & insolatum.

Qualitates.

Gal. li. 6. sim. me.

Vsque adeò excalfacit, vt & menses, & vrinas moueat. Est autem & gustu admodum acre.

Sampſuchũ, Amaracus, Marũ, ſeu, Maiorana: Gręcis σάνψιχον: Arabibus, Merzenius, ſeu, Morſangius: Italis, Maiorana, & Perſa: Germanis, Meyeron, Maiorana, & Meyram: Hiſpanis, Maiorana: Gallis, petite Mariolaine.



Locus ex Matthiolo.

Seritur & fouetur diligenti cultura, vmbroſisque gaudet.

Qualitates.

Gal.lib.8. ſim.me.

Tenuiũ eſt partium, & digerentis facultatis: deſiccat enim & excalfacit ordine tertio.

Baccharis, Latinis, & Græcis.



Locus.

Aſperum ſqualidumq́ſolum amat.

Ex Matthiolo.

Naſcitur in Romano agro.

Dio. li. 3. cap. 44.


Qualitates ex Paulo.

Odore Cinnamomo proxima, coronaria, acris. Decoctum eius meatus aperit: folia autem adſtringunt.

Aegin. libro 7.

Ruta: Græcis, πήγανον: Arabibus, Sadeb, ſeu, Sedab: Italis, Ruta: Germanis, Raut, ſeu, Vvein raut: Hiſpanis, Arruda: Gallis, Rue.

Pli. li. 19. cap. 8.



Locus.

Seritur Fauonio, & ab æquinoctio Autũni. Odit hyemẽ, humorem, ac fimũ. Apricis gaudet & ſiccis, terraq́ꝫ maximè lateritia, & cinere, & ſub Fici vmbra libentiſſimè acquieſcit.

Qualitates.

Gal. li. 8. ſimpl. medica.

Calfacit tertio ordine. Eſt autem non ſolùm guſtu acri, ſed & amaro: ex quo etiam digerere ac incidere craſſos lentosq́ꝫ humores poteſt. Tenuium eſt partium, flatusq́ꝫ extinguit. Valenter digerit & deſiccat.

Pan

Panaces Herculeum, siue, Heracleum: Græcis, πάνακες ἡράκλειον: Arabibus, Steucir, Ieusir, seu, Giausir.



Locus. Dios. li. 3. cap. 48.

Plurimum in Bœotia & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; compẽdij gratia, & quæstus qui ex Opopanace prouenit, studiosè colitur.

Ex Matthiolo.

In Apulia frequens nascitur, & in Apennini iugis, & Promõtorio Argentario: studiosè item colitur in hortis.

Qualitates.

Succus seu liquor eius excalfacit, emollit, & digerit: calfacitq; tertio recessu, & desiccat secundo. Cortex radicis minus exiccat & excalfacit quàm succus: quiddam tamen abstersorium obtinet. Fructus calidus est. Gal. li. 8. sim. me.

Pana

Panaces Asclepium, Latinis, & Græcis: Arabibus verò Panax Aschilibet.



Locus.

Pli. li.25. cap.4.

Iuxta Lacus & Amnes inuenitur.

Qualitates.

Gale.li.8. sim. me.

Minus est calidum Heraclio: quamobrem eo, & floribus eius, & semine Melli mistis, ad Vlcera, phymata, & phagedænas vtuntur.

Liguſt

Ligusticum, seu Libysticum: Græcis, λιγύστικον.



Locus.

Gignitur in altissimis asperisque montibus, ac vmbrosis, maximè iuxta fluenta.

Dio.li. 3. cap. 51.

Qualitates.

Radix & semen ex genere excalfacientiū sunt: adeò vt menses cieant, & vrinas prouocent, flatusque discutiant.

Gal. li.8. sim. me.

Pastin

Pastinaca satiua: Græcis, σταφυλῖνος ἥμερος: Arabibus, Iezar, Gezar, seu Giezar: Italis, Pastinaca: Germanis, Pasteney, seu, Pastinachen: Hispanis, Conaoria blanqua: Gallis, Pastenailles, Panais, seu Pastenades.

Locus ex Matthiolo.



Seritur in hortis, in ciborum vsum.

Qualitates.

Gal. li.8. sim.me.

Pastinaca satiua imbecillior: agrestis ad omnia potentior est. Vrinã ac menses mouet cum herba quidem tota, tùm maximè semẽ ac radix. Habet porrò in se abstersorium quidpiam.

Pastinaca

Pastinaca syluestris: Gallis, Panais sauuage: Germanis, Vvild Moren.



Locus ex Matthiolo.

In campis ac incultis sponte nascitur.

Qualitates.

Huc refer historiam Pastinacæ satiuæ: Cæterũ parum vel nihil differt à viribus Dauci. Gal. li. 8. simp. me.

Caro

Carotæ Italis: Germanis, Moren: Gallis, Carrottes, seu, Pastenades.



Locus ex Matthiolo,

Seruntur in hortis, in acetariarum vsum.

Qualitates.

Accedunt ad Dauci naturam.

Seseli

Seseli Massiliense: Græcis, σέσελι: Arabibus, Sisalios: Officinis, Siler montanũ, seu Sisileos: Germanis, Steinbrech: Italis, Seseli: Gallis, Ser montain.

Locus.



Nascitur in asperis, riguis & collibus. Inuenitur etiã num in Insulis. Diosc. li. 3. cap. 53.

Ex Matthiolo.

In omnibus ferè montibus legitur.

Ex Fuchsio.

Seritur, & loca amat calida.

Qualitates.

Radix et semen valde excalfaciunt, tenuiúmque sunt partium. Gale. li. 8 simp. me.

Ex Fuchsio.

Calidum est & siccum in secundo ordine.

Seſeli Aethiopicum.



Locus.

Dio. li.3. cap. 53. *Naſcitur in aſperis, riguis, & collibus. Inuenitur etiamnum in Inſulis.*

Qualitates ex Dioſcoride.

Semen acrius & odoratius Maßilienſi: cætera illi ſimile.

Ex Fuchſio.

Fuchſius cenſet Siler montanum Officinarum eſſe Seſeli Aethiopicum.

Seſeli

Seſeli Peloponenſe: Gallis,
Seſeli de la Moree.



Locus.


Naſcitur in aſperis, riguis, & collibus, inuenitúrque in Inſulis. Dioſ. li. 3. cap. 53.

Qualitates.

Huc refer Maßilienſis hiſtoriam.

Aniſum, Latinis, & Græcis: Arabibus autem Aneiſum, ſeu Anexiſſum: Italis, Aniſo: Germanis, Aniſz, ſeu Eniſz: Hiſpanis, Matahalua, ſeu Yerua dulce: Gallis, Anis.

Locus ex Fuchſio.



Ex Syria tranſlatum eſt in hortos.

Qualitates.

Gale. li. 6. ſimpl. medica.

Aniſi ſemen acre eſt et ſubamarum, acceditque propè ad Vrentium caliditatem. Eſt autem in ſiccando tertij ordinis, ſicut & in calfaciendo. Vrinam ciet, & digerit, atque etiam Ventris inflationes ſedat.

Carum

Carum: Græcis, κάρος: Arabibus, Caruia, Karauia, ſeu Karui: Officinis, Carui: Italis, Caro: Germanis, Mattkumich, ſeu Kim: Hiſpanis, Alcarauea: Gallis, Carui, ſeu, Cheru.

Locus ex Matthiolo.



Naſcitur in Pratis & Collibus Vliginoſis.


Qualitates.

Cari ſemē calfacit & exiccat tertio quodammodo ordine, moderatè acrem qualitatem poßidens. Itaque flatus extinguit, & Vrinas ciet, non ſemen tantum, ſed & Plāta.

Gale. li. 7. ſimpl. medica.

Anethum: Græcis, ἄνηθον: Arabibus, Iebet, seu Sebet: Italis, Aneto: Germanis, Dyllen, siue Hoch kraut: Hispanis, Eneldo: Gallis, Anet.

Locus ex Matthiolo.



Hortis omnibus, vt Fœniculum seritur.

Qualitates.

Gal.li. 6. simp. medica.

Excalfacit secundo ordine intenso, aut tertio remisso: exiccat verò secūdo incipiēte, aut in fine primi. Oleum Anethinum propinqua tēperie est pus mouētibus & cōcoquentibus Medicamētis, nisi quatenus paulò illis tum calidius tum tenuiorum partium est, ac proinde digerendi facultate præditum. Vstum tertij est ordinis tum excalfacientium, tum exiccantium. Viride humidius est & minus quàm siccum concoquit, & digerit.

Cumi

Cuminum satiuum: Græcis, κύμινον ἥμερον: Arabibus, Camum, seu Kemum: Italis, Cumino domestico: Germanis, Kimmel: Hispanis, Comino: Gallis, Comin.

Locus ex Matthiolo.



Tractu gaudet calido, & putrescibili: quamobrem frequentissimum in maritimis nascitur.

Qualitates.

Cymini semine vtimur quemadmodum Anisi, Ligustici, Cari, & Petroselini. Est autē & facultatis excalfaciētis, sicut illorum vnumquodque: tum vrinam mouentis, & flatum discutientis, ex tertio ordine calfacientium.

Gal. li.7. sim. me.

Cuminum ſylueſtre alterum, ſiue Conſolida regalis: Italis, Conſolida regia: Germanis, Ritter ſporn: Gallis, Pié d'Alouette, ſeu Conſolida royalle.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in Segetibus.


Qualitates ex Dioſc.

Dioſ.li.3. *Venenatorum morſibus prodeſt, & calculo*
3.ca. 60. *ſis, & ijs qui Vrinæ ſtillicidio Vexantur, aut concoctum ſanguinem cum lotio reddunt.*

Ammi,

Ammi, Latinis, & Græcis: Arabibus verò, Nanochach, Anazne, Nanachua, seu, Nanachue: Officinis, Ammeos: Germanis, Amey: Italis, Hispanis, & Gallis, Ammi.

Locus ex Fuchsio.



Exoticum est: Verùm si seratur, restibili fertilitate perennat.

Qualitates.

Facultatis est excalfactoriæ & desiccatoriæ, tenuiúmque partium. Sed & gustu subamarum est, & acre. Et clarum est quòd & digerat, & Vrinã moueat. Fuerit autem in calefaciendo, desiccandóque ex ordine tertio intenso.

Gale. li. 6. simp. medica.

Coriandrum: Græcis, κόριον, ἢ, κορίαννον: Arabibus, Rusbor, Rasbera, Kuzbara, ſeu Kuzibara: Italis, Coriandro: Germanis, Coriander, & Coleander: Hiſpanis, Culantro, & Ciliandro: Gallis, Coriandre.

Locus ex Palladio.



Lætis gaudet: ſed & amat quandoque ſolum tenue. Seritur, & ſponte naſcitur.

Qualitates.

Gal. li. 7. ſim. me.

Ex contrarijs facultatibus conſtat: plurimùm enim habet eſſentiæ amaræ, quæ terreſtris eſt, & tenuium partium: nec parũ obtinet humiditatis aqueæ, quæ tepentis eſt facultatis. Habet autem & adſtrictionis pauxillum.

Auice. li. 2. ca. 144.

Auicenna refragatur Galeno, frigidum eſſe aſſeuerans Coriandrum.

Hiera

Hieracium maius, seu Sonchitis: Græcis, ἱεράκιον: Italis, Cicerbita: Germanis, Habichskraut: Gallis, Cicoree iaune.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur in Pratis, & locis cultis.

Qualitates.

Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi.

Dio. lib. 3. cap. 63.

Hiera

Hieracium paruum.



Locus, & Qualitates.

Dios.li.3. cap.63.

Huc refer omnem historiam Hi... acij maioris.

Apium

Apium hortenſe: Græcis, σέλινον κηπαῖον: Arabibus, Charſs, Charſi, ſeu Cares: Italis, Petroſello: Germanis, Peterſilien, ſeu, Peterlin: Hiſpanis, Perexil: Gallis, Perſil.

Locus ex Matthiolo.



Omnibus hortis frequentiſſimum, & omnium olerum familiariſſimum.

Qualitates.

Apium vſque adeò calidum eſt, vt & vrinas, & mēſes cieat. Gal. lib. 2. de ali. fa. & libr. 8. ſim. me.

Ex Fuchſio.

Calefacit ſecundo ordine, & deſiccat in tertio à mediis.

Apium

Apium paluſtre, Paludapium, ſiue Eleoſelinum: Arabes, Aſalis: Italis, Apio commune: Germanis, Epffich, ſeu, Eppich: Hiſpanis, Apio, ſeu Perexil dagoa: Gallis, Ache.



Locus.

Naſcitur in humidis.

Dioſ. li. 3. cap 64.

Qualitates ex eodem.

Satiuo grandius, & ad eadem efficax.

Hip

Hippoſelinum, Leuiſticum, ſeu, Oluſatrum: Græcis, ἱπποσέλινον: Arabibus, Salis: Italis, Leuiſtico: Germanis, Lieb Stockel: : Gallis, Ache large, Leueſche, ſeu Liueſche.



Locus.

In Vmbroſis & paluſtribus enaſcitur, olerum generis Vt Apium.

Dioſ. li. 3. cap. 64.

Qualitates.

Oreoſelini, & Hipposelini ſimilis Vis eſt: Verũ Hipposelinum imbecillius eſt.

Gal. li. 8. ſimpl. medica.

Ex Fuchſio.

Excalfacit & deſiccat tertio ordine.

Smyr

Smyrnium Latinis, & Græcis: Arabibus verò Seniruion: Italis, Macerone, ſeu, Aleſſandrin: Hiſpanis, Apio Macedonico : Gallis, Maceron.

Locus.

Dioſ. li. 3. cap. 65.



Naſcitur in ſaxoſis, & collibus, atque ſqualidis, & limitibus terrenis.

Qualitates.

Gal. li. 8. ſimpl. medica.

Smyrnium ex eodem genere cum Apio eſt, & Petroſelino : éſtque Apio validius, Petroſelino autem imbecillius. Menſes itaque & vrinas mouet, calidum ſiccúmque tertio ordine. Sed & digerere quæ indurata ſunt valet. Reliqua vis eius Apio, & Petroſelino ſimilis.

Impera

Imperatoria, Aſtrentia, Oſtrution, ſeu, Oſterition : Italis, Imperatoria : Gallis, Otruche, Imperatoire, ſeu, l'herbe du Benioin, ſed falsò : Germanis, Meyſter vvurtz.

Locus ex Matthiolo, & Fuchſio.



Frequentiſſima naſcitur in mõtibus: hodiéque colitur in hortis magna diligentia.

Qualitates, ex Matthiolo.

Radix eius guſtu acris admodum deprehenditur, ac mordax, ſubamara, et odorata. Ex quo conijcitur excalfacere tertio exceſſu completo, vel quarto inchoante: ſiccare verò ſecundo. Diſcutit item mirificè flatus ventriculi inteſtinorum, & vteri. In ſumma excalfacit omnes corporis partes quas frigus occupauit.

Elaphoboscum, Cerui ocellus, seu falsò Gratia Dei : Græcis, ἐλαφόβοσκον : Germanis, Vveisz hirtz vvurtz.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in campestribus.

Qualitates.

Gale.li.6. simp.me. *Facultatis est calidæ, & tenuium partium: ac proinde exiccatoriæ secundo maximè excessuum ordine.*

Fœni

Fœniculum : Græcis , μάραθρον: Arabibus, Raienigi : Italis , Finocchio : Germanis, Fenckel: Hiſpanis , Hinoio , ſeu, Funcho: Gallis, Fenoil.



Locus ex Matthiolo.

Seritur Vere ineunte in locis apricis , & modicè ſaxoſis.

Qualitates.

Ex tertio eſt ordine calefacientium , & primo deſiccantium.

Gale.li.7. ſimpl.medica.

Daucum: Græcis, Δαῦκος: Arabibus, Ducu, Gezar, ſeu, Ciezar: Italis, Carotte ſaluatiche, ſeu, Dauco: Germanis, Ber vvurtz: Hiſpanis, Dauco Cretico: Gallis, Carotte ſauuage.

Dioſ.li.3. cap.59.



Locus.

Naſcitur in ſaxoſis, & locis ſole illuſtratis.

Qualitates.

Gale.li 6. ſimpl.medica.

Acrem, & calefaciẽdi facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Radix flatuoſum quiddam obtinet, vltra comprehenſa, ac venereum. Semen excalfaciendi vehementer facultatem habet: digeritque per halitum, foris impoſitum. Herba inferior eſt ſemine, ob aqueæ humiditatis miſturam, quanquam & ipſa calida ſit.

Sena

Sena, ſeu, Sene: Italis, Sena: Germanis, Senet: Hiſpanis, Sen de Alexandria: Gallis, Sené de Leuant.

Locus ex Matthiolo.



Frigoris eſt impatiens: ob idque ſeritur Maio, nec vltra Autumnũ perdurat.

Qualitates, ex eodem.

Dilutum eius modeſtiſsimè, & ſine moleſtia aluũ ſoluit, ſex vnciarum pondere potum.


Ex Meſue.

Educit per inferna bilem tum atram, tum flauam, ſed & pituitam.

Ex Fuchſio.

Deſiccat in primo ordine, & excalfacit ſecundo incipiente.

Colutea: Germanis, Vvelſch linſen: Gallis, Baguenaudier, aut Sené de païs.



Locus.

Theo. de nat. plát. li.3.c.17.

Seritur ſemine, & fimo præcipuè Ouillo.

Qualitates ex Fuchſio.

Deſiccat, Arabibus, primo ordine, & excalfacit ſecundo incipiente.

Pyre

Pyrethrum,ſiue,Saliuaris herba, Græcis, πύρεθρον, Arabibus, Macharcaraha, ſeu, Hacharcharha: Italis, Piretro : Germanis,Bertram:Hiſpanis,Pelitre:Gallis,Piretre.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in quibuſdam Italiæ montibus.

Qualitates.

Radix cauſticam vrentemq́ facultatem obtinet. Gal.lib.8. ſim.me.

Roſmarinum: Græcis, λιβανωτὶς: Arabibus, Xaier almeriem, Alpinalfach, ſeu, Cachola.



Dio.li.3. cap.72.

Locus.

Naſcitur in ſaxoſis & aſperis.

Gal.li.7. ſimp.me.

Qualitates.

Emollientis eſt, & digerentis facultatis: abſtergit etiam & quodammodo incidit.

Roſma

Roſmarinum coronarium, Græcis, λιβανωτὶς στεφανωματικὴ : Arabibus, Elkialgeber: Italis, Roſmarino de gli horti : Germanis, Roſzmarin: Hiſpanis, Romero: Gallis, Romarin.

Locus ex Matthiolo.



Seritur paſſim in hortis, ac viridarijs.

Qualitates.

Decoctum eius regio morbo prodeſt, potum: abſtergit enim, & incidit. Gale. li. 7. ſim. me.

Ex Fuchſio

Calidū eſt & ſiccū: idq́ ex guſtu deprehenditur.

Spondylium, ſeu Sphondylium Latinis & Græcis, quibuſdam, Paſtinaca Syluestris.



Dio.li. 3. cap. 74.

Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in paluſtribus & aquoſis: eſtq; frequentiſsimum in Pratis Vliginoſis.

Gal. li. 8. ſim. me.

Qualitates.

Sphondylij fructus acris, & ſecantis eſt facultatis. Radix illius ad eadem pollet.

Feru

Ferula: Græcis, νάρθηξ: Italis, Ferola: Hispanis Cananheia: Gallis, Ferule.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in æstuosis locis: abundatq; Ferulis Apulia. Fructicat vtplurimum in Maritimis.


Qualitates. Gal. li. 8. sim. nie.

Semen excalfacit & attenuat. Medulla recens adstrictoria est, venenisq; resistit.

Peuce

Peucedanum, Fœniculum Porcinum, aut Pinastellum: Græcis, πευκέδανος Arabibus, Harbatũ: Italis Peucedano: Germanis, Harstrang: Gallis, Queuë de Porceau, seu, Peucedane.

Diosc.li.3. cap. 72.



Locus

Gignitur in montibus opacis.

Qualitates.

Gale.li.8. sim. me.

Peucedani radice quàm maximè, sed tamen etiam succo, & liquore vtimur. Sunt autẽ hæc omnia eiusdẽ facultatis: sed valentior succus, admodũ excalfaciens, & digerens. Olfactu etiã prodest. Incidit & extenuat, tenuium enim est partium, & excalfactorium. Radix validè desiccat: minus tamen calefacit quàm succus. Excalfacit ergo ordine secundo iam completo: desiccat verò tertio iam incipiente.

Melan

Melanthium ſatiuum, Nigella, Gith, ſeu, Papauer nigrum: Græcis, μελάνθιον: Arabibus, Xamin, Sunis, & Sunizi: Italis, Nigella: Germanis, Schvvartz roemiſch, ſeu, Schvvartz Coriander: Hiſpanis, Neguillia, & Alipiure: Gallis, Barbue, ſeu Poyurette.

Locus, ex Matthiolo.



Seritur in hortis, & viridariis.

Qualitates.

Gal. li.7. ſim. me.

Melanthiũ excalfacit atque deſiccat tertio ordine. Videtur etiã tenuium eſſe partium. Intus aſſumptũ flatus extinguit: eſſentia enim eſt ſubtilis, & ad vnguem à caliditate elaboratæ. Amarum etiam eſt. In ſumma, vbi inciſione, exterſione, deſiccatione, & excalfactione eſt opus, præſtantiſsimum id remedium eſt.

Mel

Melanchium Syluestre, Gallis, Barbuës.



Locus ex Matthiolo.


Nascitur in Campestribus: sed & seritur ad Coronamenta.

Qualitates.

Huc refer Nigellæ Historiam.

Pseudo

Pſeudo-melanthium, ſiue Melanthium falſum: Italis, Gittone: Germanis, Raden: Gallis, Nielle des blez.



Locus, ex Matthiolo.

Naſcitur inter Segetes.

Qualitates ex Fuchſio.

Eiſdem facultatibus pollet, quibus Lolium.

Viſc

Viſcum: Græcis, ἰξὸς: Arabibus, Dabach, ſeu, Dibach: Italis, Viſchio: Germanis, Miſtel: Hiſpanis, Viſco: Gallis, Guy.



Locus.

Plin. libr. 16. ca. vl.

Viuit in Arboribus.

Qualitates.

Gal. li. 6. ſim. me.

Viſcum ex plurima aërea, & aquea calida, paucißima terrena ſubſtantia conſtat. Nam acrimonia in eo, amaritudinem excellit. Non excalfacit protinus poſt primam appoſitionem, ſed tẽpus requirit, velut Thapſia: habétque id commune cum omnibus calidis facultate medicamentis, vbi largum continent humorem recrementitium.

Appa

Aparine, Aſpergula, ſiue Aſperula: Græcis, ἀπαρίνη, ἤ, ὀμφαλόκαρπος, καὶ φιλάνθρωπος: Italis, Speronella: Germanis, Klebkraut: Hiſpanis, Preſera: Gallis, Gratteron.

Locus ex Theophraſto.



Nuſquam non prouenit: ſed præſertim inter Lentes.

Qualitates.

Modicè extergit & deſiccat, habétque nonnihil ſubtilium partiũ.

Gale. li. 6. ſimp. me.

Ex Recentiorum placitis.

Succus eius valenter recentia glutinat vulnera: facitque ad Papillarum rimas.

Carduus benedictus, siue Cnicum syluestre alterum: Italis, Cardo santo: Germanis, Carden benedictem: Gallis, Chardon beny.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in montibus: sed & passim seritur in hortis.

Qualitates ex eodem.

Constat terreis partibus calore quodã attenuatis. Tam interius sumpt⁹, quàm adhibitus, valet ad pestilentiam, & aduersus venena lethalia. Decoctis miscetur ad luem Gallicam paratis.

Clino

Clinopodium, Latinis, & Græcis.



Locus.

Nascitur in petrosis.

Dios. li.3. cap.93.

Qualitates.

Excalfaciendi vim obtinet, sed nõdum adurendi. Est verò essentia tenuium partium: vt sit in tertio ordine tum excalfacientium, tum exiccantium.

Gale.li.7. simpl. medica.

Clinopodium alterum.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Clinopodij prioris historiam.

Leontopetalum, Latinis & Græcis.



Locus.

Naſcitur in aruis & ſegetibus: eſt que fre-quentiſsimum in Apulia, & in quibuſdam Italiæ locis. Dio. li. 3 cap. 94.

Qualitates.

Radice maximè Vtimur. Digerendi facultatem, & exiccandi, excalfaciendique in tertio ordine poßidet. Gal. li. 7. ſim. me.

Teucrium, siue Teucris: Græcis, *τεύκριον*: Germanis, Grosz Bathengel: Gallis, Grosse Germandree.



Locus ex Matthiolo.

Fructicat in pluribus locis, maximéque in Clinosis, montibus, & Campestribus.

Qualitates.

Gale. li. 8. simp. medica.

Incidẽtis, & tenuium partium facultatis est: vt sit in tertio ordine exiccantium: in secundo verò excalfacientium.

Trissa

Triſſago, ſiue Trixago: Græcis χαμαίδρυς: Arabibus, Damederios, Chamadrius, ſeu Kemadrius: Italis, Querciuola, ſeu Calamã drina: Germanis, Gamanderle, ſeu Bathengel: Hiſpanis, Chamedreos: Gallis, Germandree.

Locus.



Naſcitur in aſperis & petroſis.

Dioſ. li. 3. cap. 96.

Qualitates.

Vincentem habet qualitatem amaram, & eſt quodam modo acris. Craſſitudines humorum incidit, & viſcerum obſtructiones expurgat, vt ſit tertij ordinis excalfacientium, & deſiccantium: plus tamen deſiccat, quàm calefacit.

Gal. li. 8. ſimpl. medica.

Lychnis coronaria: Græcis, λυχνὶς: Germanis, Mergen roeſzlin.



Locus ex Matthiolo.

Seritur in hortis ad Coronamenta: & ſponte naſcitur in montibus ſaxoſis.

Qualitates.

Gale.li.7. ſimp.me. *Semen calidum eſt ſecundo quodammodo ordine, aut iam etiam tertio: ſiccum ſanè eodem quoque modo.*

Lilium

Lilium: Græcis, κρίνον, ἢ λείριον: Arabibus, Susen: Italis, Giglio: Germanis, Lilgen, seu Gilgen: Hispanis, Azucena, & Lirio blanco: Gallis, Lis blanc.



Locus.

Seritur radice in hortis.

Qualitates.

Lilij flos temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua vtique in gustu amaritudinẽ habet: partim ex aquea, eáque temperata. Oleũ, quod ex eo conficitur, citra morsum digerendi, simúlque emolliendi facultatem obtinet. Radix foliáque per se trita, desiccant, abstergunt & digerunt moderatè. Plus tamen inest facultatis abstergentis in radice, quàm in folijs: quanquam tamen abstergat primo tantùm ordine,

Gale. li. 7. simp. me.

Martagon, Chymiſtis, ſiue Lilium Punicum : Italis, Giglio roſſo : Gallis, Lis Orengé.



Locus ex Fuchſio.

Naſcitur in Montibus, & nemoroſis,

Qualitates ex Fuchſio.

Radix & folia viſcoſa ſunt & amara: itáque faciunt ad vlcera maligna.


Ex Matthiolo.

Meritò annumeratur inter Lilia: ex illis ergo huius qualitates coniicito.

Ballo

Ballote, Marrubiaſtrum, ſeu Marrubium nigrum, aut fœtidũ: Græcis, βαλλωτὴ, καὶ μέλαν πράσιον: Italis, Marrobionero, Marrobiaſtro, ſeu, Marrobio baſtardo: Germanis, Schvvartz Andorn: Hiſpanis, Marroio negro: Gallis, Marrubin noir.

Locus ex Matthiolo.



Naſcitur frequens in agrorum marginibus, & ſecus vias.

Qualitates.

Acris eſt, & abſterſoriæ facultatis. Ægi. li. 7.

Ex Fuchſio.

Pollet amaritudine & acrimonia: itáque excalfacit ſecundo ordine intenſo, aut tertio incipiente: & deſiccat tertio: eâque ratione Marrubio propemodum ſimile.

Apia

Apiaſtrum, Citrago, ſiue, Meliſſa: Græcis, μελισσόφυλλον: Arabibus, Bederangir, Bedarungi, Bederenzegum, Turungem, Trungian, ſeu, Marmacor: Italis, Meliſſa, ſeu, Cedronella: Germanis, Meliſſen, ſeu, Binenkraut: Hiſpanis, Torongil, & Yerua cidrera: Gallis, Meliſe.

Locus, ex Matthiolo.



Seritur, & ſponte naſcitur in nemoroſis.

Qualitates.

Gale. li. 7. ſimpl. medica.

Meliſſophyllum Marrubio eſt ſimile facultate: ſed plurimùm ab eo vincitur: quamobrẽ nec vtitur eo quiſpiam, præſente Marrubio. Cęterùm vbi ad manum nõ erit Marrubium, vti licebit Meliſſophyllo, habita proportionis ratione.

Marru

Marrubium album: Græcis, πράσιον: Arabibus, Farasio, seu, Frasium: Italis, Marrobio: Germanis, Andorn, seu Lungen kraut: Hispanis, Marroio: Gallis, Saupomme, Marrube, seu Marrubin.

Locus.



Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera.

Diosc. li. 3. cap. 102.

Qualitates.

Gal. li. 8. simp me.

Marrubium vt gustu amarum est, ita consentientem huic sapori actionem possidet, Iecur ac Lienem obstructione liberãs, thoracem, pulmonémque expurgans. Illitum detergit ac digerit: ésque calidum secundo ordine iam completo: & siccum in tertio medio, aut completo. Succo ad acumen visus vtuntur.

Stachys.

Stachys Latinis, & Græcis: Italis, Saluia Montana: Germanis, Riechender Andorn: Gallis, Sauge molle, seu, Sauge de Montaigne.



Locus.

Nascitur in montibus, & asperis.

Dios.li.3. cap.103.

Qualitates.


Gale li.8. simpl.medica.

Gustu est acri & amaro, tertiique ordinis excalfacientium. Menses mouet, abortum adfert, & secundas eiicit.

Lingua

Lingua Ceruina: Græcis, φυλλίτις: Italis, Lingua Ceruina: Germanis, Hirtz Zungen: Hiſpanis, Lengoa Ceruina: Gallis, Langue Cerue, ſeu, Langue de Cerf.

Locus.



In vmbroſis & opacis emicat. Aquoſis item delectatur. Dio. libr. 3. c. 104.

Qualitates.

Phyllitis, cùm qualitatis ſit acerbæ, nõ abſurdè diarrhœas, & dyſenterias, potu, iuuat. Gale. li. 8. ſim. me.

Ex Fuchſio.

Guſtu adſtringit, & aliquatenus amara: ex quibus calefacere videtur, primo ordine, & deſiccare ſecundo.

Triſo

Trifolium Bituminoſum, ſiue, Trifolium Aſphaltites: Græcis, τρύφυλλον: Gallis, Treffle velu, ſeu, Triolet blanc: Germanis, Vveyſz klee.

Locus ex Matthiolo.

Virent Prata Trifoliis omnis generis.



Gal. lib. 8. ſimp. me.

Qualitates.


Vis Plantæ eſt calida & ſicca, vt Bitumen, cui odore eſt ſimilis.

Ex Fuchſio.

Trifolium omne guſtu adſtringit aliquatenus, & tenuium eſt partium, Item, quandam acrimoniam poſſident, deſiccántque quodammodo.

Trifolium

Trifolium pratenſe: Italis, Trifoglio: Hiſpanis, Treuol: Gallis, Treffle des prez, rouge.



Locus.

Nomen indicat.

Qualitates.

Vide hiſtoriam Trifolij Bituminoſi.

Trifolium Pratenſe alterum, ſeu, Trifolium acutum, aut Oxytriphyllon: Italis, Trifoglio acuto: Germanis, Spitzerklee: Gallis, Treffle à fucilles pointuës.



Locus & Qualitates.

Iiſdem Natalibus oritur quibus Pratenſe primum, eaſdémque vires habet.

Trifo

Trifolium acetosum, Alleluya, seu, Panis Cuculi: Græcis, ὀξὺς: Italis, Pan Cuculo: Germanis, Buoch klee: Gallis, Alleluya, seu, Pain de Cocu.

Locus ex Fuchsio.



Nascitur in nemoribus saxosis & aquosis: & seritur in Gallia, vmbrosi q; gaudet.

Qualitates.

Edunt qui Enterocelen habent. Pli. li. 27. cap. 12.

Ex Fuchsio.

Acerbitas & ariditas gustu, indicant eiusdem esse temperaturæ cuius Oxalis, frigidæ videlicet, & siccæ.

Trifolium odoratum, ſeu, Trifolium Equinum: Italis, Tribulo, ſeu, Trifoglio degli Caualli: Gallis quibuſdam, Melilot commun.



Locus.

Naſcitur in cultis & inter ſegetes: pratiſq; uliginoſis gaudet, & colles nonnunquam aſcendit. Qualitates ex Matthiolo.

Aquam ſtillaticiam eliciunt odoris gratia. Equi autem hanc herbam auidiſsimè in pabulum ſuum ſequuntur.

Trini

Trinitas, siue Trifolium magnum: Germanis,, Edel leber Kraut: Gallis, Treffle de marais.



Locus, ex Matthiolo.

Nascitur in vliginosis, & inter frutета.

Qualitates ex eodem.

Glutinatoria est tam exterius illita, quàm interius sumpta. Quinetiam valet ad Enterocelas: in quem vsum, puluerem dimidij cochlearis mensura ex vino austero propinant.

Polium montanum, siue, Iua Muschata: Arabibus, Cahade, Iahade, seu, Giade: Gallis, Iue muscate.

Pli. li. 21. cap. 7.

Locus.



Campestre est, quãquam tamen Mõtibus gaudeat.

Qualitates.

Gale. li. 8. sim. me.

Amarũ est gustãtibus, & modice acre. Itaque obstructiones expedit, Vrinamq́; & mẽses ciet. Viride, magna Vulnera glutinat, maximè quod fruticosum est. Aridum illitum maligna Vlcera sanat.

Polium minus.



Locus ex Matthiolo.

Rara est planta, seritur tamen à quibusdam ad spectaculum duntaxat.

Qualitates.

Gal. li.8. sim. me.

Ad Antidota amarius, & acrius est quàm maius, adeo vt ex tertio sit ordine desiccantium, ex secundo autem completo excalfacientium. Illitum Vlceribus malignis magis prodest quàm Polium maius.

Scordium, siue Trissago palustris: Græcis, σκόρδιον: Arabibus, Scordeon, aut, Scordeũ: Italis, Calamandrina palustre: Germanis, Vvasser battenig: Hispanis, Scordio: Gallis, Chamaraz.

Dio. li. 3. cap. 108.

Gal. li. 8. sim. me.



Locus.

In Montibus & palustribus nascitur.

Qualitates.

Scordium ex multiformibus tum saporibus, tũ facultatibus constat. Nam & amarũ quiddam obtinet, & acerbum: acrimoniámque habet Allio persimilẽ. Expurgat & excalfacit viscera, mensesq; & vrinas ciet. Viride illitum glutinatorium est.

Alliar

Alliaris, siue Alliaria, aut Pes Asini: Italis, Alliaria: Germanis, Knoblauchs kraut: Gallis, Alliaire.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur iuxta Sepes, in agrorum marginibus, & in hortis.

Qualitates ex eodem.

Crassos & lentos humores incidit, & extenuat. Seme emplastri modo vuluæ impositũ, mulieres vteristrãgulatu oppressas liberat, & excitat.

Ex Fuchsio.

Calfacit & desiccat quarto ordine, imbecillius tamen quàm Allium.

Tussilago, Farfaria, siue, Vngula Caballina: Græcis, βήχιον: Italis, Falfarella, Farfara, seu, Vnghia di Cauallo: Germanis, Roszhuob, seu, Brant lattich: Hispanis, Vnha de Asno: Gallis, Pas de Cheual, ou d'Asne, siue, Tacconnet.

Diosc. li. 3. cap. 109.

Gal. li. 6. simp. me.



Locus.

Nascitur in amœnis, & riguis.

Qualitates.

Radix sicca et suffita tusses et Orthophnœas iuuat. Est autem modicè acris, ut sine molestia omnes Thoracis abscessus credita sit rumpere. Folia sicca acriora quā ut partibus inflammatione laborantibus conueniant: quod tamen efficiūt viridia, frigida enim & humida sunt ob aqueæ humiditatis admistionem.

Arte

Artemisia, Latinis, Græcis, Italis, & Hispanis: Germanis, Beyfuosz, &, S. Iohans gurtel: Gallis, Armoyse, siue, Herbe de la saint Iehan.



Locus.

Magna ex parte in maritimis nascitur: sed & gaudet sepibus, cultis, & riguis.

Diosc. li. 3. cap. 110. & 111.

Qualitates.

Vtraq; Artemisia excalfacit, & medicè desiccat: calefaciuntq; excessu secundo, desiccántq; primo intenso, aut sēcūdo incipiente. Sunt autem & modicè tenuium partium.

Gale. li. 6. sim. me.

Ambro

Pli.li.27. cap.4.

Ambrosia Latinis, & Græcis. Vagi nominis est Ambrosia, & circa multas herbas fluctuans. Hæc tamen vera Dioscoridis est Ambrosia.

Locus ex Matthiolo.



Saxosis oritur: & si Dioscoridi germana sit Cappadociæ.

Gal. li.6. sim.me.

Qualitates.

Cataplasmate imposita vim habet adstringentē, ac repellentem.

Pli.li.27. cap.4.

Ex Plinio.

Vsus eius ad ea quæ discuti opus sit.

Botrys Latinis, & Græcis: Italis, Botry: Germanis, Trauben Kraut, ſeu krotten kraut: Gallis, Migraine, Millegraine, Patience, ſeu, Piment.



Locus.

Dioſ. li. 3. cap. 113.

Inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus: ſed & in hortis ſeritur ad Vteri affectus.

Qualitates ex Dioſc.

Pota, Orthopnœas mulcet. Idem ſentiunt Plinius & Aegineta.

Ex Fuchſio.

Plin. libr. 27. cap. 8.

Ex amaritudine, calida & ſicca cenſetur. Incidit præterea ob caliditatem, & ſubtilitatem partium.

Gera

Geranium primum, Rostrum Gruis, Rostrum Ciconiæ: Græcis, γεράνιον: Germanis, Storcken schnabel: Hispanis, Pico de Ciguenha: Gallis, Bec de Grue, siue, Bec de Cigogne.

Locus ex Matthiolo.



Gerania passim ferè visuntur in campestribus, secus vias, & iuxta sepes.

Dio. li. 3. cap. 114.

Qualitates.

Vuluæ inflationes discutit potum, ex vino, drachmæ pondere.

Ex Fuchsio, & Matthiol.

Radix dulcedinem quãdam obtinet: digerendiq; vim possidet: reficientibusque se ab imbecillitate vtilissima est, pota bis in die, Drachmæ pondere, in vini cyathis tribus, valet & ad inflationes.

Gera

Geranium Secundum, Geranium Latinorum, Acus muſcata, Pes Columbinus, ſiue, Ruberta, aut herba Roberti.



Locus ex Matthiolo.

Paßim naſcitur in campeſtribus, ſecus vias, & iuxta ſepes.

Qualitates.

Nullius in medicina vſus.

Dio. li. 3. cap. 114.

Ex recentiorum placitis.

Internis vulneribus, & fiſtulis ſanandis potum mirificè prodeſt. Sed hic adhibenda eſt cautio, ne pro Pede Columbino (qui Serapioni Amomum eſt) ſecundum Geranium vſurpent.

Geranium tertiũ, seu Balsamina, quibusdam verò Momordica, quanquam sit secundum Dioscoridis Geranium, Matthiolo, & Fuchsio.



Locus ex Fuchsio.

Cliuosis gaudet.

Qualitates Geraniorum ex Fuchsio.

Radices & Folia Geraniorum desiccant & adstringunt, excepto primo.

Gosipp

Gossipium, Xylon: Officinis, & Barbaris, Cotum, Bombax, Bombasum, siue Cottonaria: Italis, Bambagia: Germanis, Baũ vvoll: Gallis, Herbe du Cotton.

Locus ex Matthiolo.



Hac ætate seritur in Cypro, Creta, & Sicilia Insulis: quin & in Apulia aliisque Regionibus nascitur.

Qualitates ex eodem.

Huius lanugo manifestè excalfacit, ac siccat: quæ si comburatur mirum in modum manantem è vulneribus sanguinem sistit. Seminis medullatussi & difficulter spirantibus auxiliatur, & genitale semen auget. Oleum, quod ex ea exprimitur Lentigines in facie, & omnes maculas delet. Arabibus tamen Lanugo eius calefacit & humectat.

Typha Latinis, & Græcis: Italis, Mazza Sorda: Germanis, Moſzkolben, ſeu Narren kolben: Hiſpanis, Bohordo, ſeu Iunco Ama corocado: Gallis, Maſſe de Ionc.



Locus.

Gignitur in paluſtribus, & aquis ſtagnantibus.

Qualitates ex Matthiolo.

Dioſ. li. 3. cap. 53.

Typhæ pappis additis Betonicæ folijs & Gladioli, ac Biſlinguæ radicibus, omnibus in puluerem tenuiſsimum redactis, & aſſatis ouorum luteis exceptis, vtuntur feliciter ad Enterocelas etiam ætate conſiſtentium. Ieiunis exhibent quotidie Drachmæ pondere, triginta dierum ſpatio: ſed interim præſtanti ligatura, & Emplaſtris glutinantibus ima pubis pars probè muniatur.

Filip

Filipendula.

Locus ex Fuchſio.



Montibus, aſperis, & ſaxoſis gaudet. Inuenitur etiam in pratis non admodum lætis.

Qualitates ex eodem.

Valde amara eſt: ut ſit calida & ſicca tertio ordine.

Ex Matthiolo.

Vrinæ remoratui, & ſtillicidio auxiliatur, renúmque calculis, & doloribus. Suſpirioſis, anhelentibus, omnibúſque, in vniuerſum, morbis frigidis opitulatur: maximéque Comitialibus, inſperſo cibis radicum puluere.

Conyza maior, seu Pulicaria, aut Conyza mascula, Latinis, & Italis: Græcis, κόνυζα: Germanis, Geelmuntz, seu, Dur vvurtz: Hispanis, Attadegua: Gallis, Herbe aux puces.

Locus ex Matthiolo.



Paßim ferè prouenit.

Qualitates.

Gal. li. 7. sim. me.

Conyza maior & minor adsimilis sunt tum temperaturæ, tum facultatis. Gustui amaræ, et acres apparent. Excalfaciunt admodum luculenter folia, & germina illita, per se, aut in oleo cocta. Flores eandem vim habent. Itaque, cum folijs tritos, in vino bibendos exhibet ad menses fortiter educendos, ciendúmque fœtum. Tertij sunt ordinis in excalfaciendo, & exiccando.

Conyza

Conyza minor, seu Conyza fœmina.

Theoph. de natu. plan. li. 6 cap. 2.



Locus, Qualitates.

Per omnia adsimilis est Conyzæ masculæ, & in iisdem locis nascitur.

Conyza media.



Locus ex Matthiolo.

Dio. li.3. cap. 119.

Nascitur humentibus præsertim locis, & secus vias, vbi ex agrorum marginibus, aqueus humor, stillicidio quodam in proximos defluit Canales.

Qualitates.

Gal. li.7. sim. me.

Tertium Conyzæ genus, humidis proueniẽs, vtrisque tum graueolentius, tum imbecillius: minus ergo calefacit & exiccat quàm priores.

Heme

Hemerocallis, siue Lilium syluestre: Italis, Giglio saluatico: Germanis, Heydnisch lilien, seu Goldt lilien: Hispanis, Lilio amarillo: Gallis, Lis iaune.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in Aruis inter segetes, in Pratis, in Montibus, et in Vallibus. Seritur tamen in hortis ad spectaculum.

Qualitates.

Radicem habet Lilÿ similem, non figura tantùm, sed & Viribus. Prodest ambustis: leuiter enim digerentem facultatem habet: & cum hoc repulsorium quiddam.

Gale. li. 6. simp. medica.

Hemerocallis altera: Germanis, Goldevvurtz, ſeu Iunckerlilien.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in montibus Iapidiæ.

Qualitates.

Facit ad omnia quæ prior Hemerocallis.

Lilium

Lilium conuallium, Latinis, & Italis: Germanis, Meybluomlim: Gallis, Muguet.

Locus ex Fuchſio.



Naſcitur in Nemoroſis, Frutetis, & opacis.

Qualitates ex Matthiolo.

Ex floribus Germani Aquam ſtillatiiam, quam vocant Auream eliciũt, ad cordis & cerebri affectus. Imò animam expirantibus propinant, exiſtimantes eos poſſe in vita retineri aliquot horas. Falluntur tamen opinione. Qui plura volet, conſulat Matthiolum.

Leucoium, ſiue Viola alba : Græcis, λευκόϊον: Arabibus, Keiri, Cheiri, ſeu Alcheiri: Germanis, Gelb violen, ſeu Vveyſz vveyl: Hiſpanis, Violetas amarillas, ſeu Violetas blãquas: Gallis, Violiers rouges, blancs, iaunes, & violetz.

Locus ex Matthiolo.



Frequentiſſimum viſitur in hortis, viridarijs, ædiumque feneſtris, & parietibus vbi fouetur diligentiſſimè ad Coronamenta.

Qualitates.

Gale.li.7. ſimpl. medica.

Extergendi facultatem poßidet, ac tenuium eſt partium: plus tamen flores: & inter hos qui ſunt ſicciores magis quàm virides. Semen & radix eiuſdem ſunt facultatis: niſi quòd radix craßioris eſt eſſentiæ, et magis terrenæ. Teſti

Testiculus Canis fœmina: Græcis, ὄρχις, ἢ, κυνὸς ὄρχις: Arabibus, Chasi alkeb, seu Chasi alchelb: Italis, Testicolo di Cane: Germanis, Knaben kraut: Hispanis, Coyon de perro: Gallis, Couillon de Chien.

Locus.



Nascitur in petrosis & sabuletis, & in pratis vliginosis.

Dios. li. 3. cap. 124.

Qualitates.

Radici vis inest calida et humida, ac gustu dulcis est. Maior radix multam habere videtur humiditatem excrementitiam & flatuosam, quapropter epota Venerem excitat. Temperamentum verò minoris ad calidius & siccius vergit: vnde cohibet ac reprimit Venerem.

Gale. li. 8. simp. medica.

Testicu

Testiculus fœmina, minor.



Locus & Qualitates.

Huc refer omnem prioris Orchydis historiam.

Orchis

Orchis Serapias minor, ſiue Teſticulus mas, minor: Germanis, Vvolriechend Mergentrehen: Gallis, Couillon de chien maſle.



Locus.

Naſcitur in petroſis, ſabuletis, & pratis vliginoſi.

Dioſ. li. 3. cap. 125.

Qualitates ex Dioſcoride.

De hac eadem quæ de Teſticulo canis produntur.

Ex Galeno:

Gal. lib. 8. ſimp. me.

Orchis Serapias ſicciorē facultatem obtinet, quàm vt primi ſit ordinis exiccantium. Quocirca ad Venerem non ſimiliter accommodus, atque prior Orchis. Siccatus multò etiam magis deſiccat. Habet etiā quidpiam ſub adſtringens: proinde ventrem, ex vino potus, ſiſtit.

Orchis

Orchis ſerapias maior.



Locus, & Qualitates.

Huc Serapiadis minoris hiſtoriam refer.

Palma Christi, seu, verus Hermodactylus, Auicennæ, Digiti citrini: Germanis, Stendel Vvurtz Vveyblin.

Locus, ex Matthiolo.



Nascuntur ambæ in montibus.

Qualitates ex Auicenna.

Excalfaciunt vtraque, siccántque secundo recessu. Crassa corporis excrementa pellunt. Stillaticia earum aqua Dysentericis auxilio est. Radicum decoctum, vino diutius commistum, sumptúmque tam in prandio quàm in cœna. Comitiales adiuuat. Idem facit puluis Seminis.

Hor

Horminum satiuum, Latinis, & Græcis.



Locus, ex Matthiolo.

Rara admodum planta est.


Qualitates.

Diosc. li. 3. cap. 128.

Valet ad Venerem stimulandam. Abstergit etiamnum, extrahit, & discutit.

Hormi

Horminum falſum, Geminalis, Matriſaluia, ſeu Herba Sancti Ioannis: Italis, Sclarea: Germanis, Scharlach: Gallis, Orual, ſeu, Toutebonne.



Locus ex Fuchſio.

Seritur in hortis frequentiſsimè.

Qualitates ex eodem.

Amaritudo & guſtus adſtrictio indicant ſiccum & moderatè calidum.

Hedysarum, aut Securidaca
Græcis, ἡδύσαρον.



Locus.

Dioſ.li.3.
cap.129.

Naſcitur in ſegetibus & hordeis.


Qualitates.

Gal.li.6
ſimp.me.

Semen acerbum & amarum apparet: quamobrem, potum gratum eſt ſtomacho, & viſcerum obſtructiones expurgat. Idem præſtant totius fruticis ramuli.

Onoſma

Onoſma, Oſmas, Phlonitis, vel Ononis, Latinis, & Græcis.



Locus ex Matthiolo.

Colles amat: gignitúrque in aſperis.

Dioſ. li. 3. cap. 130.

Qualitates.

Ex acri & amara conſtat ſubſtantia: proinde quoque creditur fœtus necare, & eijcere, folijs eius in vino potis.

Gale. li. 8. ſimpl. medica.

Nymphæa, ſeu, Nenuphar: Græcis, Νυμφαία: Arabibus, Nilofar, Ninofan, ſeu, Nilufar: Italis, Nymphea: Germanis, Galb, & Vveyſz ſee bluomen, ſeu, Haar vvurtz: Hiſpanis, Eſcudetes del Rio, & Higos del Rio: Gallis, Lis d'eſtang, Blanc d'eau, ſeu Iaune d'eau.



Locus.

Dio. libr. 3. ca. 131. & 132.

Naſcitur in paludibus & ſtagnantibus aquis, & Amnes amat.


Qualitates.

Gal. li. 8. ſimp. me.

Radix & ſemen deſiccant citra morſum. Radix candida potentioris eſt facultatis. Nõnullam etiam abſtergendi vim obtinet: ſed magis abſtergit radix nigra. Muliebre profluuium, ventriſque, & ſeminis, cohibent & reprimunt.

Andro

Androſaces, Latinis, & Græcis.



Locus.

Gignitur in maritimis.

Dio. li.3. cap.133.


Qualitates.

Humida & acris herba eſt. Exiccata, exhibitáque tum ipſa, tum fructus eius magnopere vrinam mouet: & nimirum diſcutit, & deſiccat.

Gale.li.6. ſimp.me.

Scolopendrium, Splenium, Seu, Hemionium : Græcis, ἄσπληνον: Arabibus, Scolofendrion, ſeu, Sculufendrion : Officinis, Italis, & Gallis, Ceterach, ſeu Scolopendre: Germanis, Hirtz zung: Hiſpanis, Doradilla.

Dioſ. li.3. cap.134.



Locus.

Naſcitur in parietibus, ſaxiſque ſiliceis, & opacis.

Qualitates.

Gale. li.6. ſimp. me.

Tenuium quidem partium, nec tamen calida herba eſt: eáque ratione lapides frangit, & lienes liquat.

Hemio

Hemionitis, siue, Splenium: Græcis, ἡμιονῖτις.



Locus.

In petrosis nascitur.


Dio. li. 3. cap. 135.

Qualitates.

Amaritudinem & adstrictionem simul possidet: quamobrem, cum aceto pota, lienosis auxilio est.

Gal. li. 6. sim. me.

Lunaria minor: Germanis, Monrauten.



Locus ex Fuchſio.

Naſcitur in montibus, indiſſolubili ſocietate iunctā cū Ophry.

Qualitates. ex eodem.

Guſtum terreſtrem habet & adſtringētem: proinde frigida & ſicca cenſetur.

Ex Matthiol.

Mirificè efficax eſt vulneribus glutinādis, itemq́; intrinſecis atque extrinſecis corporis fracturis ſanandis: celebraturque ad puerorum Enterocelas. Tota planta in puluerem conteritur. Dyſentericis item prodeſt.

Anthemis, Chamæmelum, ſeu, Chamomilla: Græcis, ἄνθεμις: Arabibus, Debonigi, ſeu Babunegi: Italis, Camamilla: Germanis, Camillen: Hiſpanis, Manzanilla: Gallis, Camomille.



Locus.

Naſcitur in aſperis, & iuxta ſemitas. Dioſ. li. 3. cap. 137.

Qualitates.

Chamæmelum tenuitate quidem, Roſæ perſimile: calore verò ad Olei facultates magis accedẽs, animali tum familiares, tum tẽperatas. In ſumma, calefacit & deſiccat primo ordine, tenuiumq́ eſt partium: ac proinde digerendi, rarefaciendi, & laxandi facultatem obtinet. Gal. li. 3. & 6 ſim. medi.

Hypecoüm Latinis, & Græcis.



Locus.

Dio.li.4. cap.63.

Nascitur in segetibus, aruisq́ue.


Qualitates.

Gal.li. 8. simi. me.

Vim refrigerandi habet, ex tertio ferè refrigerantium ordine, adeò ut parum absit à Papauere.

Tana

Tanacetum, ſiue Athanaſia: Italis, Athanaſia, ſeu Daneta: Germanis, Reynfarn: Gallis, Tannée, ſeu, Tanaiſie.



Locus, ex Fuchſio.

Naſcitur ad decurſus aquarum, & in vinearum ſcrobibus. Seritur etiam in hortis.

Qualitates, ex Matthiol.

Valet ad vētriculi et alui flatus diſcutiendos, & lũbricos ex ventre pellendos. Vtuntur etiã ad frangēdos renum calculos, & ad ciendam vrinam. Sed id viris magis quàm mulieribus commendant: contrà verò Matricariam fœminis ſolis exhibent.

Buph

Buphthalmum, siue, Oculus Bouis: Græcis, βούφθαλμον: Italis, Occhio di Bue: Germanis, Rinds aug: Gallis, Oeil de Beuf.



Dio. li. 3. cap. 139.

Locus.

Circa oppida nascitur, & in campestribus.

Qualitates.

Gal. li. 6. sim. me.

Flores habet Anthemide acriores: proinde & vehementius discutiunt, adeò vt duritias sanent Cerato misti.

Bellis,

Bellis, seu Belluis: Italis, Primo fiore, & Fior di prima vera: Germanis, Maszlieben: Gallis, Marguerites, seu, Pasquettes.

Locus, ex Matthiolo.



Seritur in hortis: & sponte nascitur in pratis et campestribus.

Qualitates. ex Matthiol.

Valent ad strumas, capitis fracturas, & vulnera Thoracis, quæ in Pectoris cauitatem vsque penetrarunt: in quẽ vsum potionibus inserunt.

Ex Fuchsio.

Calidæ sunt & siccæ. Ex acetoso tamen sapore, nonnihil frigiditatis subesse censendum est. Desiccant tamen manifestè.

Pæonia

Pæonia fœmina: Græcis, γλυκυσίδη καὶ, παιωνία: Arabib9, Feonia: Italis, Peonia: Germanis, Peonien: Hiſpanis, Roſa del Montæ, ſeu Roſa albardeira: Gallis, Pyuoine, ſeu, Pynoine.

Dio.li. 3. cap. 140.



Locus.

Naſcitur in altiſsimis Mõtibus, & præruptis.

Qualitates.

Gale.li. 8. ſim. me.

Radix guſtũ habet adſtringentem, cum quadam dulcedine: & ſi pluſculum dentibus mã das, acrimoniam & quã dam amaritudinem ſubeſſe percipies. Tenuium eſt partium, & exiccatoria: non tamen eſt inſigniter calida: ſed aut ſymmetra, aut paulò calidior. Efficaciſsima eſt ad puerorum Epilepſias.

Lith

Lithoſpermum maius, ſiue Milium ſolis: Græcis, λιθόσπερμον: Arabibus Kulb, Culb, Calt, ſeu, Calab: Italis, Milium ſolis: Germanis, Meerhirsz, & ſtrinſomen: Gallis, grand Gremil, ſeu, Herbe aux Perles.



Locus.

Naſcitur in aſperis & editis locis. Dioſ. li. 3. cap. 142.

Qualitates ex Fuchſio.

Semen Vrinas mouet: eſt ergo calidum & ſiccum ex Galeni ſententia. Gale. li. 5. ſim. me. cap. 12.

Lithoſpermũ minus: Gallis, petit Gremil.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Lithoſpermi maioris hiſtoriam.

Rubia

Rubia satiua, seu Rubea tinctorum: Græcis, ἐρυθρόδανον: Arabibus, Pane, seu Fuealsa bagin: Italis, Rubbia: Germanis, Ferber roët: Hispanis, Ruuia: Gallis, Garance.

Locus.



Seritur magno quæstu. Diosc. li. 3. cap. 143.

Qualitates.

Radix acerba est, & gustu amara. Gale. li. 6. simpl. medica.

Lienem & Iecur expurgat: Vrinas crassas, multásque, ac nonnunquam etiam sanguinolentas vacuat. Modicè extergit.

Ex Fuchsio.

Excalfacit secundo ordine, & desiccat tertio.

Rubia syluestris: Gallis, Garance sauuage.



Locus.

Nascitur in petrosis, & locis insolatis.

Qualitates.

Eiusdem facultatis est, cuius Rubia maior.

Lonchitis altera, Latinis & Græcis: Germanis, Spicant.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in sitientibus, & asperis.

Qualitates.

Folia viridia ad glutinanda vulnera sunt idonea: sed sicca, cum aceto pota, lienes induratos sanant. Gale. li. 7. simp. me.

Althæa, Ibiſcus, ſeu Ebiſcus: Græcis, ἀλθαία: Arabibus, Chitini, Chathmi, Chathmie, ſeu Roſa Zaueni: Italis, Maluauiſco: Germanis, Ibiſch, ſeu, Heyl vvurtz: Hiſpanis, Yerua Cannamera, & Marmaie: Gallis, Guymauue.

Locus ex Fuchſio.



Lætis, & vliginoſis gaudet.

Qualitates.

Gale. li. 6. ſimp. me.

Facultatem habet digerendi, laxandi, phlegmone leuandi, mitigandi, & concoquendi difficilia coctu tubercula. Radix & ſemen idem agunt. Sed tenuiorũ partium, magiſque exiccatoriam & magis exterſoriam quàm illa facultatem oſtendunt. Radicis decoctum adſtringit.


Ex Fuchſio.

Folia & flores excalfaciunt & ſiccant primo ordine: radix verò ſecundo incipiente.

Alcea

Alcea, ſiue Biſmalua: Italis, Biſmalua, Malua ſaluatica, & buonviſchio: Germanis, Sigmars kraut: Hiſpanis, Malua de Vngria, & Malua monteſima: Gallis, Biſmalua.

Locus ex Matthiolo.



Naſcitur in incultis, campeſtribus, & agrorum, ſcrobiúmque marginibus, iuxta ſepes, vias, ac ſemitas.

Qualitates ex Paulo.

Radix in vino pota, dyſenteriæ & eroſionibus medetur. Ægi. li. 7.

Ex Galeno. Gal. li. 7. ſim. me.

Malua ſylueſtris digerentis paululùm & emollientis leuiter eſt facultatis. Fructus eius tanto validior, quanto & ſiccior.

Cannabis, Latinis, & Græcis: Arabibus, Scehedenegi, ſeu Canab: Italis, Canapo: Germanis, Zamer hauff: Hiſpanis, Canhamo: Gallis, Chanure.

Dio. li.3. cap.148.

Gale.li.7. ſimp.me. & li. 2 de alim.fac.



Locus.

Seritur ſemine.

Qualitates.

Semen flatus diſcutit, adeóque deſiccat, vt ſi pluſculum edatur, genituram extinguat. Concoctu eſt difficile ſtomachóque & capiti nocet, prauique eſt ſucci. Multùm calefacit: ideóque largius ſumptum vaporem emittit calidum & medicamentoſum.

Ex Fuchſio.

Semen calidum eſt & ſiccum.

Ex Matthiolo.

Cannabis recentis decoctum, expreſſa fortiter herba, terreſtrium Lumbricorum cauernulis inſperſum, ſtatim eos euocat. Ouiferaciores gallinas facit.

Anagy

Anagyris Latinis, & Græcis:
Gallis, Bois puant.



Locus ex Matthiolo.


Maris Littoribus gaudet.

Qualitates.

Acris, digerentis, excalfacientísque est facultatis. Folia virentia minus sunt acria, idcirco tumentia reprimunt. Sicca incidētis sunt exiccantisque valenter facultatis. Similem ferè facultatem habet radicis eius cortex. Semen autem magis subtilium est partium: sed & vomitum prouocat.

Gal. li. 6. simp. medica.

Anagyris minor: Plinio, Laburnum ſed falſo: Italis, Eghelo.



Locus ex Matthiolo.

Floret in montibus.

Qualitates ex eodem.

Viribus & odoris grauitate omnino priori Anagyridi ſimilis.

Cepæa

Cepæa, Latinis, & Græcis.



Locus ex Plinio.

Naſcitur in littoribus arenoſis. Pli.li.26. cap.8.

Qualitates.

Cepæa Portulacæ ſimilis eſt. Folia ipſius contra veſicæ ſcabies vtiliter bibuntur. Radix, cum Aſparago ſylueſtri pota, vrinæ ſtillicidia, quæ ex obſtructione fiunt, abigit. Aegi.li.7.

Alisma seu Damasonium, Latinis, & Græcis.



Locus.

Dios.li.3. ca. 151.

Aquosos amat tractus.

Qualitates.


Gale.li.6. simp.me.

Constitutos in renibus calculos, aqua in qua decoctum fuerit, pota, comminuit: idque casu experti sumus. Ex quo liquet absterforiam quandam facultatem illi inesse.

Hyperi

Hypericum Latinis, & Græcis, seu Perforata: Arabibus autem, Reiofricon, seu Keiofaricon: Italis, Hyperico: Germanis, S. Iohans kraut: Hispanis, Coraioncillo: Gallis, Millepertuys, seu Trucheran.

Locus ex Fuchsio.



Nascitur in incultis, asperis, & Campestribus.


Qualitates.

Calefacit, & desiccat, tenuísque substantiæ est, adeò vt vrinas & menses prouocet. Sed ad hæc totus sumendus fructus, non tantum semen. Fructus viridis; ad cicatricem ducit cùm alia, tùm etiam ambusta. Si sicco contuso inspergas, sanabis humida & putrida vlcera. Sunt qui Ischiadicis, semen bibendum propinant quadraginta diebus.

Gal. li. 8. simpl. medica.

Ascy

Aſcyrum, ſiue Aſcyroïdes, Hyperici ſpecies: Arabibus, Asbirach.



Locus.


Gale.li.6. ſimp.me. *Naſcitur in incultis, aſperis, & Campeſtribus.*

Qualitates.

Semen eius eſt purgatorium: foliorum verò facultas modicè extergens & deſiccans, vt & ambuſta ſanare credantur. In vino auſtero decocta, glutinatoria ſunt, præſertimque magnorum vulnerum.

Andro

Androsæmum, siue, Dyonisias: Arabibus, Androseman, Androsion, seu, Andresagian.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in cultis, asperis, & Campestribus.

Qualitates.

Huc refer omnem Ascyri historiam.

Coris.

Coris.



Locus ex Matthiolo.

Pli. li.26. cap. 8. *Nascitur paßim in Italia, maximéque sub Tamarica.*

Qualitates ex eodem.

Sup. eod. *Odore suaui est & grato.*

Ex Plinio.

Vis semini excalfactoria: & ideo in flatio-nem facit Enterocelis, Sed & stomacho non inutile: præcipuum ad stranguriam si exulce-rata non sit vesica.

Chamæ

Chamæpytis, Aiuga, Abiga, siue, Ibiga: Græcis, χαμαιπίτυς: Arabibus, Hamesitheos, seu, Chamasithius: Italis, Iua: Germanis, Ye lenger, Ye lyeber: Hispanis, Pinillo, & Yua artetica: Gallis, Iue muscate, seu, Chamepyteos: Officinis, Iua Arthritica.

Locus.



Nascitur in Campestribus passim.

Qualitates.

Gale.li.8. simpl.medica.

Gustu amarum saporem acri validiorem obtinet. Effectu verò expurgat abstergitque viscera plus quã calefacit. Herba viridis magna vulnera cõglutinat, & vlcera putrescentia sanat, mammarúmque durities discutit: est enim, in siccando, ordinis tertij, in calfaciendo verò secundi.

Cha

Chamæpytis altera.



Locus ex Matthiolo.

Non admodum vulgaris est Planta.

Qualitates.

Huc refer omnem prioris Chamæpytios historiam.

Betoni

Betonica, ſeu, Vetonica: Græcis, κέστρον, καὶ ψυχότροφον: Arabibus, Chaſtara: Italis, Betonica: Germanis, Betonien: Hiſpanis, Bretonica: Gallis, Betoyne.

Locus ex Fuchſio.



Gaudet Montoſis, Pratis, Syluoſis, Frigidis, & opacis locis.

Qualitates.

Vim habet incidendi, vt guſtus indicat: amarior enim & ſubacris eſt herba. Conſiſtentes in renibus calculos diuidit, & Pulmonem, thoracem, & Iecur expurgat, abſtergitque. Gal.li. 7. ſimpl. medica.

Ex Fuchſio.

Excalfacit & deſiccat primo ordine completo, aut ſecundo medio.

Bistorta, quibusdam, Britannica.



Locus ex Fuchsio.

Opacis & humidis gaudet.

Qualitates ex eodem.

Radix valde adstringit: ut videatur frigida & sicca. Botanicon, manu scriptum frigidam & siccam censet tertio ordine. Iisdem pollet viribus, quibus Tormentilla.

Tormentilla, aut, Septifolia: Græcis, ἑπτάφυλλον: Gallis, Tormentille: Germanis, Tormentill.



Locus.

Nascitur passim in locis siccis, & Campestribus.

Qualitates, ex Fuchsio.

Radix desiccat tertio ordine, absque manifesto calore.

Ex Matthiolo.

Iisdem pollet facultatibus, quibus Bistorta. Vtriusque Radices abortum prohibent bibitæ, aut Ventri, renibúsque ex aceto illitæ: Vrinæque incontinentiam supprimunt cum succo Plantaginis potæ. Stillatitia earum aqua, aut earum decoctum Venenis omnibus remedio est. Adstringunt, & Vulnera, maximè interna glutinant.

Lysimachia, siue Salicaria: Græcis, λυσιμάχιον: Germanis, Vveyderich rott: Gallis, Corneille, seu, Soucy d'eau. or Cornelo

Dio. li. 4. cap. 3



Locus.

Gignitur in aquosis, & palustribus.

Qualitates.

Gale. li. 7. simp. me.

Superantem habet qualitatem adstrictoriam, per quã & vulnera glutinat, erũpentémque ex naribus sanguinem, adhibita, compescit. Pota, Dysenterias, sanguinis reiectiones, ac muliebre profluuium sanat.

Ex Fuchsio.

Vincentem habet qualitatem adstrictoriam, & desiccatoriam.

Lysima

Lyſimachia ſecunda: Gallis, Chaſſe boſſe: Germanis, Geel Vveyderich.




Locus.

Naſcitur in aquoſis & paluſtribus, maximéque in Salicetis. Dio.li.4. cap.3.

Qualitates.

Eiuſdem eſt facultatis cuius Lyſimachia prior: Ruellio tamen efficax eſt ad Peſtilentes tumores, adhibita.

Polygonum mas, Sanguinaria, Sanguinalis, Proſerpinaca, Seminalis, Corrigiola, & Centinodia: Græcis, πολύγονον: Arabibus, Baſi alrahagi: Italis, Corrigiola, aut Centinodia: Germanis, Vveygrasz: Hiſpanis, Corriola: Gallis, Renoüée, ſeu Corrigiole.



Dio. li. 4. cap. 4.

Locus.

Repit humi, in campis, ædificiorũ areis, & in vijs publicis: eſtq́ frequentiſsima.


Qualitates.

Gal. li. 8. ſim. me.

Polygonum vti adſtrictionem quandá obtinet, ita ſanè vincit in eo aqueũ frigidum: vt ſit ſecundi ordinis refrigerãtium, aut etiam quodammodo in initio tertij. Videtur etiam deſiccatorium eſſe. Eſt & cruentorum vulnerum glutinatorium. Mas validior eſt fœmina.

Poly

Polygonum fœmina.



Locus.

Naſcitur in riguis. Dio. li. 4. cap. 4.

Qualitates.

Imbecillioris eſt ad omnia facultatis Polygono maſculo: cæterà illi ſimile. Gal. li. 8. ſim. me.

Polygonatum, ſiue, Sigillum Salomonis: Græcis, πολυγόνατον: Italis, Fraſſinella, Ginocchietto &, Sigillo di ſanta Maria: Germanis, Vveysz Vvurtz: Hiſpanis, Fraſſinella: Gallis, Genoillet, Genoilliere, &, Sigillum Salomonis.

Dio. li. 4. cap. 5.



Locus.

Naſcitur in Montibus.

Qualitates.

Gal. li. 8. ſimpl. medica.

Miſtam habet tum facultatẽ, tum qualitatem: obtinet enim adſtrictionis pariter & acrimoniæ, & amaritudinis quidpiã, & indicibilis cuiuſdã inſuauitatis. Radice tantùm ferè Vtimur. Sunt qui ex ea ſtillaticiam eliciãt aquam, ad faciem detergendam.

Matthio.

Clem

Clematis, ſiue, Vinca peruinça: Græcis, κλήματις δαφνοειδής: Italis, Prouenca: Germanis. Singruen: Hiſpanis, Peruinqua: Gallis, Peruenche.



Locus.

Humi ſerpit, Læto, pinguiq́ ſolo prouenit. Dio. li. 4. cap. 6.

Qualitates.

Profluuijs & dyſenterijs cum vino pota prodeſt, dētiumq́ dolores manſa mitigat. Vteri quoq; doloribus in Peſſo admota, vſui eſt. Gal. li. 7. ſimp. me.

Ex Aegineta

Guſtu adſtringenti eſt, et amaro, deſiccatq́ abſque mordicatione: vincentem tamen habet deſiccatoriam facultatem.

Clematis altera Dioſcoridis : Germanis, Leinen:Gallis, Liſeron:Italis, Vitalba.



Locus.

Dio.li.4. cap.7.

Repit per Arbores, vt Smilax.]

Qualitates.

Gale.li.7. ſim. me.

Folia acrem ſiue cauſticam facultatem obtinent, adeò vt lepras excorient. Fuerit itaque quarti ordinis excalfacientium initio.

Flammu

Flammula: Italis, Flammola: Gallis, espece de Liseron: Hispanis, Vitalba recta.



Locus.

Nascitur in Sepibus.

Qualitates ex Plateario.

Excalfacit desiccatq; ordine tertio, aut potius quarto.

Ex Matthiol.

Efficacissima est in morbis frigidissimis. Editur in quartanis, magno iuuamento. Oleum eius Ischiadicis, articulorum, Iliumq; doloribus, Vrinæ angustijs, & renum calculis calidum inungunt, aut Clysteribus infundunt magno successu.

Symp

Symphitum petræũ, Latinis, & Græcis.

Dio.li.4. cap.9.



Locus.

Naſcitur in petris, & Mõtibus petroſis.

Qualitates.

Gal. li. 8. ſimp.me.

Ex contrarijs conſtat facultatibus: habet enim incidẽdi vim quãpiam, & contrahẽdi. Ineſt, illi præterea humiditas quædam non immodicè calida, per quã guſtãtibus dulce apparet, & odoratu iucundum. Commanducatum ſitim extinguit.. Secundum igitur omnium ſupradictorum miſtionem, ſimul abundè digerere poteſt: ſimulq; corpora contrahere & conſtringere: vnde enterocelis imponitur.

Symp

Symphytum alterum, Solidago, ſiue Conſolida maior, quibuſdam falsò, Alum, ſeu Alus: Italis, Conſolida maggiore: Germanis, Vvalvvurtz: Hiſpanis, Suelda maiore, & Conſuelda maior: Gallis, Conſyre, Oreille d'Aſne, ſeu, Conſolida maior.

Locus ex Matthiolo.



Frequentiſſima naſcitur in pratis vliginoſis.


Qualitates.

Similem Petræo Symphito vim obtinet: nō tamen guſtantibus dulce eſt, nec odorantibus, odoratum: iiſque qualitatibus à Petræo diuerſum eſt. Cæterum quatenus viſcoſitatem quandam & mordacitatem obtinet, Scyllæ ſimile. Ad omnia facit, quæ Symphytum petræum.

Gal. li. 8. ſim. me.

Conſo

Consolida, aut Solidago minor: Gallis, Herbe au Charpentier.



Locus.

Nascitur temerè in pratis vliginosis.

Qualitates ex Matthiol.

Vulneraria est: maximeque expetitur vbi glutinare, ad stringere, & reprimere sit opus. Mirum etiam in modum prodest disruptis, fractisque internis & externis corporis partibus, illita, & intus sumpta. Folia illita vel eorum succus valde prodest vlceribus manantibus & excedentibus tum oris, tum testium, pudendorumque virilium & muliebrium,

Confolida media: Italis, Laurentina, feu, Morandola: Germanis, Guldin gunfel: Gallis, Herbe au Charpentier, Moyenne confyre, feu, Bugle.



Ex Fuchfio.

Locus.

Nafcitur in Pratis Vliginofis.

Qualitates ex Matthiol.

Iifdem pollet facultatibus quibus minor Cõfolida. Speciatim tamen pota, fanguinis grumos in Vẽtriculo, vel in alia corporis parte concretos, difijcit & diffoluit.

Guftu adftringens eft & amara: indeq; calida & ficca cenfetur.

Sani

Sanicula, siue, Vrsi Auricula: Gallis, Oreil le d'Ours.



Locus ex Matthiolo.

Copiosè nascitur in quibusdam Montibus.

Qualitates ex eodem.

Pota quotidie mirificè prodest ad Enterocelas, & Thoracis vulnera: quin & ad alia vulnera tam intus sumptum, quàm exterius illitum.

Pilo

Piloſella maior: Italis, Auricula di Topo: Germanis, Meuſzohr: Gallis, Piloſelle, ſeu Oreille de Rat.



Locus ex matthiolo.

Naſcitur in Montibus inter ſaxa. Plerunque tamen inuenitur in Sabuletis cliuoſis.

Qualitates ex eodem.

Mirifica eſt ad vulnera interna et extera glutinanda: quinetiam ad Enterocelas, tam illit aquàm pôta. Tota enim planta vehementer adſtringit: vnde dyſentericis, cœliacis, vteri profluuijs, billoſis vomitionibus, cruentis ſputis, & omnibus in vniuerſum, fracturis, opem fert, ſed præcipuè caluariæ.

Ex Fuchſio.

Guſtu acris eſt, & adſtringens: proinde deſiccare & calefacere cenſetur.

Scabiosa, quibusdam Aetij Psora: Italis, Scabiosa: Germanis, Apostemen kraut: Gallis, Scabieuse.

Locus ex Fuchsio.



Nascitur in pratis vliginosis.

Qualitates ex eodem.

Amaritudo indicat calidam esse & siccam, eiusdémque temperaturæ, cuius Morsus Diaboli.


Ex Matthiolo.

Decoctum illius potum quotidie, aut succus herbæ, per se, aut vnguentis additus & illitus mirificè prodest aduersus scabiem. Anthracibus pestiferis vtiliter illinitur: adeò vt lethales abscessus trium horarum spatio prorsus abolere existimetur. Pota, prodest omnibus pectoris vitiis.

Pery

Periclymenum, Syluæ Mater, Volucrum maius, Matrissylua, Lilium inter spinas, seu Caprifolium: Græcis, περικλύμενον: Italis, Vinci bosco, Matriselua, seu Caprifoglio: Germanis, Geyszblatt: Hispanis, Madresylua: Gallis, Cheurefueil.

Locus.



Nascitur in aruis ac Sepibus, conuoluens se adminiculis propter assidentibus.

Dios. li. 4. cap. 13.

Qualitates.

Fructus & folia adeò vehementer incidētis, simul & excalfacientis facultatis sunt, vt si plusculum bibatur vrinam sanguinolentam efficiant: quanquam principio vrinam tantum moueant. Illita cum oleo excalfaciunt. Semen quoque desiccat. Dosis est drachmæ pondus cum vino, si tamen copiosius bibatur sterilitatem adfert.

Gale. li. 8. simpl. medica.

Tribulus terrestris: Græcis, τρίβολος χερσαῖος: Arabibus, Hasach, seu Haserk: Italis, Triboloterrestre: Germanis, Vvaltek letlin: Gallis, Chaussetrappes, seu Saligotz terrestres.

Theoph. libr. 6. de nat. plan. cap. 5.

Locus ex Theophrasto.



Apud septa villarum erumpit: & iuxta Amnes & rudera nascitur.

Qualitates.

Dio. li. 4. cap. 13. Gal. li. 7. sim. me.

Tribulus ex humida essentia modicè frigida, & sicca non mediocriter, & ipsa frigida, componitur. In terrestri tamen superat terreũ frigidũ, quod & adstringens ostendimus: in aquatico verò aqueum. Fructus terrestris, cùm sit tenuium partium potus, lapides in renibus comminuit. Congruunt autem vtrique contra omnes influxus.

Tri

Tribulus aquaticus: Græcis, τρίβολος ἔνυδρος: Italis, Tribolo aquatico: Germanis, Vvassernusz, Secknusz, aut Kern nusz: Hispanis, Abroyos, & Abrollos: Gallis, Saligotz, Escharbotz, Chastaignes d'eau, seu Truffles d'eau.



Locus.

Aquis & fluminibus familiare.

Dio. li. 4. cap. 13.

Qualitates.

Huc refer omnem Tribuli terrestris historiam.

Saxifraga: Græcis, σαξίφραγον, καὶ σαξίφραγον: Italis, Saſſifragia: Germanis, Steyn brech Gallis, Perce-pierre.



Locus.

Dio. li. 4. cap. 15.

In petris naſcitur & aſperis locis: maximéque in maritimis, & ad fluuiorum ripas aſperas.

Qualitates ex Matthiolo.

Expetitur ad renum & veſicæ calculos comminuendos, & ad vrinam remoratam ciendam.

Limo

Limonium, Pyrola, Beta syluestris, Tintinnabulũ terræ, officinisque, Behen rubrum: Græcis, λειμώνιον: Italis, Behen rosso: Germanis, Glid vveych: Gallis, Bete des Prez.

Locus.



Nascitur in pratis, & palustribus.

Dio.li.4. cap.16.

Qualitates.

Semen, vt pote austerum, cœliacis disentericis, sanguinem spuentibus et ad profluuium muliebre exhibẽt acetabuli mensura.

Gal. li.7. simp.me.

Ex Fuchsio.

Folia & semen valde adstringunt: semen autem desiccat tertio ordine.

Limonium alterum.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in pratis vliginoſis, & in paluſtribus.

Qualitates.

Eandem vim habet quam Limonium prius.

Cario

Cariophyllata, Herba benedicta, aut Sana munda: Italis, Gariofillata: Germanis, Benedictē vvurtz: Gallis, Benoiste, Galliot, aut Ressize.

Locus ex Fucsio,



Seritur in hortis ad intinctus: & sponte nascitur in montibus, locisque opacis & iuxta sepes.


Qualitates ex eodem.

Desiccat & calefacit secūdo ordine. Folia & radix gustu valde adstringunt.

Ex Matthiolo.

Bibitur ad interna thoracis vulnera, ad Enterocelas, & ad dysentericos & cœliacos affectus, Radix attenuat, discutit, adstringit, & roborat.

Gladiolus segetalis, aut Machæronion: Græcis, ξιφίον: Arabibus, kasiflon: Italis, Gladiolo, seu Monacuccie: Germanis, Schvvertel: Gallis, petit Glayeul de marais.



Locus.

Nascitur in Aruis, & Pratis.

Dio. li. 4. cap. 20. Gal. li. 8. simpl. medica.

Qualitates.

Radix superior attrahentem, digerentem, & exiccantem facultatem poßidet.

Sparganium, seu Carex: Græcis, σπαργάνιον: Arabibus, Safarhe ramon: Germanis, Riedtgrasz.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Montium radicibus.

Qualitates.

Desiccantis est facultatis.

Gal. li. 8. simp. medica.

Spatu

Spatula fœtida, aut, Sphatuda fœtida: Græcis, ξύρις: Gallis, Glayeul puant.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in aquosis.

Qualitates.

Gal. li. 8. sim. me.

Xyris tenuium partium, attractoriæ, digerendi, ac nimirum etiam desiccandi est facultatis, cũ radix, tum multò etiam magis eius fructus: qui quidem & vrinam ciet, & lienes induratos sanare potest.

Ex Fuchsio.

Insignis est acrimoniæ, vehementer enim linguam vellicat & incendit: ex quo conijcitur calidam & siccam esse.

Anchu

Anchusa, Onoclæa, seu Calyx: Græcis, ἄγχουσα: Italis, Ancusa: Germanis, Rott ochsen zung: Hispanis, Soagem: Gallis, Orcanette.

Locus.



Læto solo nascitur. Dio. li. 4. cap. 23.

Qualitates.

Radicem habet admodum refrigerãtem, & desiccantem, tum adstringentem, & subamaram, tum quæ sufficiat extenuandis, & extergẽdis humoribus biliosis, corporibúsque condensandis. Folia imbecilliora sunt radice: adstringunt tamen & ipsa, & desiccant. Gale. li. 6. simp. me.

Anchu

Anchusa altera, Alcibiadion, seu Onochelos: Gallis, Seconde Orcanette.



Locus.

In sabulosis nascitur.

Dio. li. 4. cap. 23. Gal. li. 6 simp. me.

Qualitates.

Onochelos calidior est Lycopside, & magis medicata: nam plusculum & gustu ipso protinus acrimoniæ. Porrò Lycopsis refrigerat & desiccat: magisque radix eius quàm Onocleæ adstringit.

Anchuſa tertia, ſiue Anchuſa parua.



Locus.

In ſabuloſis naſcitur.

Qualitates.

Alcibiadio perſimilis eſt: verùm calidior eſt & amarior, magiſque medicata: ac proinde ad latos lumbricos peridonea.

Gale. li. 6. ſimp. me.

Ex Dioſcoride.

Si manducatum ſemen in ſerpentis fauces inſpuatur, eam interficiet.

Dio. li. 4. cap. 23.

Echium

Echium, Dorias, Alcibium, seu, Buglossum agreste: Græcis, ἔχιον: Italis, Buglosa saluatica: Germanis, Vvild ochsen zung: Hispanis, Yerua della biuora: Gallis, Buglose sauuage.

Locus ex Fuchsio.



Nascitur vbique ferè in viis, & semitis, locisque asperis & incultis.

Qualitates ex Paulo.

Ægi.li.7.

Herba non modò à serpente demorsis, cũ vino pota, auxiliatur: sed præsumentes quoq; ex ictu nihil molestũ pati sinit. Semen idem præstat munus.

Ex Fuchsio.

Gale.li.5 simp.me. cap.20.

Lac generat. Ex Galeno ergo calefacit, nec tamen valde desiccat.

Ocima

Ocimaſtrum, ſeu, Ocimoïdes: Græcis, ὠκιμοειδές, ἢ, φιλεταίριον: Italis, Baſilico ſaluatico. Germanis, Vvild Baſilien: Hiſpanis, Albahaqua monteſina: Gallis, Baſilic ſauuage.



Locus ex Matthiolo.

Paßim naſcitur inter ſegetes, prope ſepta, & in agrorum marginibus.

Qualitates.

Radix ſuperuacanea eſt: ſemen autem tenuium partium, & deſiccantis citra mordacitatem facultatis eſt. Gal. li.8. ſim. me.

Ocimum aquaticum, ſeu Echinos: Græcis, ἔχινος: Italis, Baſilico aquatico: Hiſpanis, Baſilgo de agoa: Gallis, Baſilic d'eau.



Locus.

Naſcitur apud fontes & fluuios.

Dio.li. 4. cap.27. Gale.li.6. ſimpl.medica.

Qualitates.

Semen acerbum eſt ac proinde repellentis & exiccatoriæ facultatis.

Gra

Gramen: Græcis, ἄγρωστις: Arabibus, Vagem, Negen, Negien, Thel, Kel, seu, Negil: Italis, Gramigna: Germanis, Grasz: Hispanis, Grama, & Gramenha: Gallis, Dent de Chien.



Locus.

Iuxta vias nascitur. Dio. libr. 4. ca. 28.

Qualitates.

Gale. li. 6. sim. me.

Radix mediocriter frigida est & sicca, mordacitatem quandam exiguam & partium tenuitatem obtinens. Herba primo quidem excessu refrigerat: in humiditate & siccitate moderata. Semen imbecillum est. Radix esculenta est viridis: dulcis enim est instar aquæ: sed tamen acre quiddam exiguum, & subacerbum obtinet.

Sideritis prima, aut Sideritis Heraclea, ſeu Herculea: Arabibus, Sidrichis.



Locus.

Dio. li. 4. cap. 29.

Naſcitur in petroſis.

Qualitates.

Gal. li. 8. ſimp. me.

Sideritis habet quidem etiam abſtergendi quandam facultatem. ſed plurima eius pars humida eſt, & mediocriter frigida. Paucula verò ineſt adſtrictio: quare phlegmonem ſedat & glutinat.

Sideritis altera.



Locus, ex Matthiolo.

Non admodum frequens est planta.

Dio.li.4. cap.30.

Qualitates.

Huius vis, foliorúmque ad vulnera præcipua est: cætera priori Sideriti similis.

Sideritis tertia, quibusdam Heraclea.



Locus.

Nascitur in maceriis, & vineis.

Dio. li. 4. cap. 31.

Qualitates ex Diosco.

Huius ea vis est, vt quamuis recenti vulneri imposita, sanguinem supprimat: cæterà Sideriti primæ similis.

Achillea

Achillea sideritis: Græcis, ἀχίλλειος: Arabibus, Sichritis, &, Egilos.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in incultis & campestribus.

Qualitates.

Achillea Sideritin viribus æmulatur: caterùm adstrictione exuperat: quare ad sanguinis eruptiones, Dysenterias, & muliebre profluuium congruit.

Rubus, aut Sentis: Græcis, βάτος: Arabibus, Buleich, & Haleich: Italis, Rouo: Germanis, Bramen, aut, Katzen: Hispanis, Carza: Gallis, Ronce.

Theo. de na. plan. li 3. c. 18.

Locus.




Sepibus, frutetisq; implicatur, aut humi serpit, aut in altum tollitur, arboris instar crassescẽs.

Qualitates.

Gal. li. 6. sim. me.

Folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, eaq; non obscura. Sed folia mollia & recens nata plurimũ in se habent substãtiæ aqueæ, parum verò adstrictionis: eadem ratione & germina: quæ constant ex terrea & frigida essentia, & aquea, tepida. Fructus maturus nõ parũ habet succi calidi tẽperati, modiceq; adstringit. Immaturus valde exiccatorius est, ob terreã quã abũdat substãtiã. Flos fructui ĩmaturo par est. Radix autẽ adstringit, & tenuiũ est partiũ.

Helxine cissampelos, Conuoluulus minor, Volubilis media, siue Vitealis: Græcis, ἐλξίνη κισσάμπελος: Arabibus, Acsin: Italis, Vilucchio minore, seu, Minutola: Germanis, Mittel Vvind: Hispanis, Campanella Yerua: Gallis, Campanette, Clochette, Vitreole, seu petit Liset.



Locus.

Nascitur in sepibus, vinetis, & segetibus. Dio. li. 4. cap. 35.

Qualitates.


Digerendi facultatem habet. Gal. li. 6. sim. me.

Ex Fuchsio.

Calefacit.

Nummularia, Centummorbia, quibusdam, species Lunariæ minoris: Italis, Numularia: Germanis, Pfenningkraut.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in scrobium marginibus, præsertim vligine madentibus.

Qualitates, ex Fuchsio.

Valde adstringit gustu: ex quo desiccare videtur secundo aut tertio ordine.

Ex Matthiolo.

Glutinandi & cohibendi facultate prædita est.

Eupa

Eupatorium Græcorum, Hepatorium, siue, Agrimonia: Græcis, ἠπατώριον: Arabibus, Cafat, Cifit, seu, Gafet: Italis, Agrimonia: Germanis, Odermenig: Hispanis, Agramonia: Gallis, Agrimoine.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur in Montibus, campestribus, pratisq́ue, & secus vias.

Qualitates.

Eupatoriũ herba tenuium partium, incidendi, extergendique facultatẽ citra manifestam caliditatem obtinet. Quocirca obstructiones iocinoris expurgat. Inest ei & adstrictio modica, per quam robur visceri addit.

Gale. li. 5. simp l. med.

Eupa

Eupatorium Auicennæ, siue, Eupatorium Officinarum, Ruellio autem falsò Hydropiperis secunda species.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in vliginosis locis, & in scrobium marginibus.

Qualitates ex Matthiolo.

Ex amaritudine & odoris præstantia qua pollet tota planta, percipi potest id & obstructiones aperire, & crassos lentosq́ humores mirificè incidere posse. *Poten*

Potentilla, Protentilla, ſeu Agrimonia ſylueſtris, aut Tanacetum ſylueſtre: Germanis, Gren ſing: Italis, Potentilla: Gallis, Agrimoine ſauuage.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in vliginoſis locis, & propter ſemitas.

Qualitates ex eodem.

Vniuerſa planta adſtrictoria et exiccatoria facultate pollet. Idcirco mulierũ profluuia, & dyſenterias cohibet, & vulnera recentia glutinat. Prodeſt item & ſanguinem reijcientibus. Pudẽdorum & oris vlcera ſanat. Firmat commotos dentes, ſtringitq́ gingiuas, & dentium dolorem mulcet, ſi eius decocto os ſæpius colluatur.

Quinq

Quinque folium: Græcis, πεντάφυλλον: Italis Cinquefoglio: Germanis, Vveiſz funff, ſeu, Fingerkraut: Hiſpani, Cinco en rama: Gallis, Quintefueille.

Locus.

Dioſc. li. 4. ca. 38.



Naſcitur in riguis, & aquarijs ductibus.

Qualitates.

Gal. li. 8. ſim. me.

Radix deſiccat vehementer: minimùm verò acris eſt: quare in multo eſt vſu, velut alia quoque omnia, quæ cùm ſint tenuium partium, citra morſum deſiccant. Eſt enim hæc radix deſiccatoria ex tertio quodammodo ordine, minimùm habens euidentis qualitatis.

Diapen

Diapensia, siue, Sanicula. Germanis, Sanickel: Gallis, Saniclet.

Locus ex Fuchsio.



Nascitur in Syluis opacis, in campestribus, & prope aquaductus.

Qualitates ex eodem.

Amaritudinem & adstrictionem gustu præ se fert: proinde videtur calefacere & siccare secundo ordine.

Ex Matthiolo.

Chirurgici maximè vtuntur ad intrinseca vulnera, enterocelas, & fistulas, eius puluerē, vel decoctum potui exhibentis: quinetiam ea vtuntur ad morbos omnes vbi adstringenti solidantique medicamine sit opus.

Fra

Fragaria: Græcis, κόμαρος: Italis, Fraghe: Germanis, Erdt ber kraut: Gallis, Fraiſier.

Locus ex Fuchſio.



Sponte naſcitur in ſyluis, dumetis, montibus opacis, & ſecus vias: ſeritur etiamnum in hortis.

Qualitates ex Matthiol.

Fragaria refrigerat ordine primo, ſiccatq; ſecūdo.

Ex Serapione.

Calefacit & ſiccat ſecundo ordine.

Ex Fuchſio.

Folia, guſtu, amara ſunt & adſtringentia: vnde conijcere licet deſiccatoria eſſe, non autem humida.

Euph

Euphragia, Euphrasia, siue Ocularia: Græcis, ἐυφρωσύνη, καὶ ὀφθαλμική: Italis, Eufrasia: Germanis, Augentrost: Gallis, Eufraise.

Locus ex Fuchsio.



Nascitur temerè in Pratis, & Cliuosis insolatis.

Qualitates ex eodem.

Desiccat & calefacit manifestè.


Ex Matthiolo.

Sicca & recens in cibis diutius sumpta, vel in medicamentis, præstat valenter ad omnia impedimenta quæ oculorum claritati officiũt. Vinum quod ex ea fit senum oculos iuuenescere facit.

Lolium murinum, siue Hordeum murinum: Græcis, φοίνιξ: Italis, Gioglio saluatico: Germanis, Vvaldt trohr, seu Bintzenhelmer: Gallis, Yuraye sauuage.

Locus.

Dio. li. 4. cap. 39.



Nascitur in aruis, tectisque recenter illitis.

Qualitates ex Plinio.

Trita, è vino pota herba, præclarè ciet menses.

Ex Dioscoride.

Pli. li. 22. cap. 25.

Pota in vino austero alui profluuium, & emanantem vulua sanguinem sistit, vrinæque impetus infræmit.

Rhodia

Rhodia radix : Græcis, ῥοδία ῥίζα: Italis, Radice Rhodia: Germanis, Rosen vvurtz.



Locus ex Matthiolo.

Non adeò vulgaris est planta: etsi ea facilè in Apennino & Gargano montibus nascatur.


Qualitates.

Tenuium partium, & discutientis est facultatis. Calefacit autem secundo ordine, aut tertio incipiente.

Gal. li.8. simpl.medica.

Equiſetum, ſeu Cauda Equina: Græcis, ἵππουρις: Arabibus, Dhenben alchail, Dhenib alchi, ſeu Daneb alchail: Italis, Aſperella, ſeu Coda di Cauallo: Germanis, Roſz ſchvvantz: Hiſpanis, Coda de Mula, ſeu Rabo de Mula: Gallis, Queue de Cheual, Prelle, ſeu Cheualine.

Locus.



In riguis & ſcrobibus naſcitur.

Qualitates.

Dioſ. li. 4. cap. 43.

Adſtringentem cũ amaritudine facultatem poßidet: ac proinde valenter, ſimúlque citra mordacitatẽ exiccat. Vulnera maxima, cataplaſmate impoſita, conglutinat, etiam ſi præſectos eſſe neruos contingat: Præterea Enterocelas mirificè conglutinat.

Coc

Coccum infectorium, Granum infectorium, siue Coccus Baphica, Græcis, κόκκος βαφική: Arabibus, Charmé, Kermes, & Chermes: Italis, Graña de Tintori: Germanis, Scharlach ber: Hispanis, Grana para tennir, & Grana en Grano: Gallis, Graine d'escarlatte.



Locus.

Optimum gignitur in Galatia, & Armenia: deinde Asia, & Cilicia: Vltimum ex omnibus Hispanicum,

Dio. li. 4. cap. 43.


Qualitates.

Granum tinctorium adstringentem simúlqueamaram facultatem poßidet, Vtraque sine morsu desiccat: proinde ad ingentia vulnera congruit, præsertímque neruorum, tritum cum aceto, aut Oxymelite.

Gale. li. 7. simpl. medica.

Pimpinella ſaxifragia, Saxifragia hircina, ſiue Sanguiſorba : Germanis , Hergots baertlin.

Locus ex Fuchſio.



Naſcitur in Campeſtribus , incultis, ſiccis, & locis inſolatis.

Qualitates ex Matthiolo.

Radix in qua vis tota conſiſtit excalfacit, ſiccatque ordine ſecundo completo, aut ſanè tertio incipiente. Præſtat ad renũ & veſicæ calculos: expedit enim renes & veſicam calculis, & vrinam remoratam pellit. Succus radicum ex vino hauſtus deleterijs medicamentis & venenoſorum animalium morſibus prodeſt: qua ratione ad peſtilentiam radices has laudibus miris efferunt.

Pimpi

Pimpinella, Pampinula, ſeu Bipennula: Italis, Pimpinella, aut Solbaſtrella: Germanis, Bibenell: Gallis, Pimpenelle.

Locus ex Fuchſio.



Naſcitur frequentiſſima in Frutetis, et locis opacis: ſeritúrque in hortis ad acetarias.

Qualitates ex eodem.

Calefacit & deſiccat ſecundo ordine intenſo, aut tertio incipiente.

Ex Matthiolo.

Guſtata non leuiter adſtringit, & lentoris copiam præbet: Vnde facilè conijcitur eam eſſe adſtrictoriæ facultatis. Vulnera igitur & Vlcera ſanat. Contagioſis, peſtilentibúſque febribus maximè commendatur.

Tragum, siue Scorpio, aut Traganos: Græcis, τράγος καὶ σκορπίος.



Locus.

Nascitur in maritimis.

Qualitates ex Diosco.

Dio. li. 4. cap. 46. *Racemorum acini decem ex vino poti, cœliacis & fœminis fluxione vuluæ laborantibus auxiliantur.*

Iuncus

Iuncus: Græcis, σχοῖνος: Arabibus, Dis: Italis, Giunco: Germanis, Bintzen ſchmelen: Hiſpanis, Ionco: Gallis, Ionc.

Locus ex Matthiolo.



Proptèr ſtagnantes aquas naſcitur.

Qualitates.

Iuncus ſterilis nullius in medicina vſus eſt, Semen fertilis conſtat ex temperie terrena, eſſentiáque leuiter frigida, & aquea leuiter calida: vt & inferna deſiccare poßit, & ſenſim frigidos ad caput vapores ſubmittere, quibus ſomnum conciliet.

Gal. li. 8. ſimp. me.

Hepatica, siue Lichen: Græcis λειχὴν: Arabibus, Azez alsacher: Italis, Lichene: Germanis, Stein laberkraut, seu Brunnen leber kraut: Hispanis, Epatica, seu Figadella: Gallis, Epatique, seu Porcorau.

Locus.

Diosc.li.4. cap. 48.



Aspergino sis petris adheret, vt Muscus.

Qualitates.

Gale.li.6. simp.me.

Extergentem ac modicè refrigerantem facultatem habet, vtramque verò resicccantem. Porrò quod ex talibus substantijs componitur, aduersum esse inflammationi nil mirum est.

Pul

Pulmonaria: Gallis. Herbe aux Poulmons.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in opacis.

Qualitates ex eodem.

Mirificè confert ad Pulmonis Vlcera sananda, & ad sanguinis reiectionem. Qua in re decoquitur ad dimidias, datúrque decoctum potandum addito saccharo: Vel succus ex ea expressus serapij modo cum saccharo paratus.

Saxi

Saxifragia, Ruta parietum, seu Paronychia: Græcis, παρονυχία: Gallis, Percepierre.

Locus ex Matthiolo.

Dio.li.4. cap.49.



Nascitur in petris, & siccis arborum trũcis, & in syluis opacis inter saxa.

Qualitates.

Gal.lib.8. simp.me.

Paronychia ab effectu nominata est: sanat enim Paronychias, fauósque. Vis eius est tenuiũ partium, & exiccatoria morsu vacãs. Digerit etiam: éstque calida & sicca tertio ordine: tenuiúmque partium.

Heli

Helichryſum Latinis, & Græcis: Galeno, Amaranthum croceum.



Locus.

Naſcitur in aſperis, & torrentium alueis, & ſecundum Plinium, in frutetis.

Dio.li.4. cap.52. Pli. li.21. cap.25.

Qualitates.

Facultatis eſt incidentis, & extenuantis. Coma igitur eius menſes cum vino pota educit, et grumos ſanguinis liquare creditur, non ſolùm in ventre, ſed & in veſica, pota cum mulſo: deſiccátque, ſimpliciter pota, omnes fluxiones, quanquam ſit ſtomacho infeſta.

Gale.li.6. ſimpl.medica.

Ama

Amarantum purpureum : Italis, Fior velluto: Germanis, Samat bluom, seu, Floramor : Gallis, Passe-velours.

Locus, ex Fuchsio.



Seritur in hortis, ad coronamēta, & vliginosis solóque tenaci gaudet.

Qualitates, ex Matthiolo.

Huic facultas inest frigida & sicca: proinde flos eius potus, cœliacos & dysentericos iuuat, mensiūq; abundantiam cohibet, & albas vteri fluxiones. Quinetiam cruenta expuentibus prodest: præsertim si in pulmone vel pectore vas aliquod fractum fuerit.

Chry

Chrysanthemum, Caltha, seu Buphthalmos Latinis, & Græcis.



Locus.

Propter Oppida nascitur.

Qualitates, ex Dioscoride.

Dio.li.4. cap.53.

Flores cum cerato triti Steatomata discutere produntur. Regio morbo correptis colorem bonum breui reddunt, si sequente longo balnei v̄su, post exitum ebibantur.

Agera

Ageratum: Italis, Herba Giulia: Officinis, Eupatorium Mesue.



Locus ex Matthiolo.

Paßim naſcitur.

Qualitates.

Gale.li.7. simp.me. *Digerit, & inflammationes leuiter quodammodo reſoluit.*

Ageratum

Verbenaca recta, Verbena mas, Columbina, siue, Columbaris: Græcis, περιστερεὼν ὄρθος: Italis, Verminacola, Berbena, & Berbenaca: Germanis, Eisen kraut: Gallis, Veruaine masle.



Locus.

Nascitur in aquosis. Dio.li.4. cap.55.

Qualitates.

Vim habet adeo exiccantem, ut vulnera glutinet Verbenaca recta maximè discutit, & perfectè corroborat, præsertim viridis, imò & arida cum radicibus & simul cum Serpyllo oleo incocta. Gale. li.8. sim. me. & li.2. de cõp. medica. sec. loc.

Astragalus Latinis, & Græcis: Gallis Chiches de Montaigne.



Locus.

Dios. li.4. cap.57.

Nascitur in ventosis, opacis, & niualibus.

Qualitates.

Gale. li.6. simpl. medica.

Radices habet adstrictorias: éstque in numero non instrenuè exiccantium. Nam vlcera vetera cicatrice obducit, & aluum fluxu tentatam sistit, si quis in vino decoctam radicem bibat.

Hiacin

Hyacinthus Latinis, & Græcis: Italis, Cipolle Canine, seu, Hiacyntho: Germanis, Mertzen bluomen: Hispanis, Mayos flores: Gallis, Iacinthe, seu Vaciet.



Locus, ex Matthiolo.

Nascitur vbique in Campestribus inter segetes, & in Syluis prouenit.

Qualitates.

Radix primi est ordinis in desiccando, secundi verò completi, aut certè tertij incipientis in refrigerando. Itaque pueros diutissimè seruare impuberes illita cum vino creditur. Semen leuiter extergit & adstringit: ordine tertio quadamtenus desiccans: cæterùm in medio consistens caliditatis & frigiditatis.

Gale.li.8. sim.me.

Papauer erraticum, ſeu Papauer Rhoeas: Græcis, μήκων ῥοιάς: Italis, Papauero ſaluatico: Germanis, Klapper roſen: Hiſpanis, Amapollia, ſeu Papoulla: Gallis, Pauot ſauuage, Confanons, Ponceau, ſeu Coquelicot.



Locus.

Vere in Aruis cum hordeo naſcitur.

Qualitates.

Dio. li. 4. cap. 59.

Semen validè refrigerat: ita vt nequaquam eo quis innoxiè ſolo vti poßit, ſicut ſatiuo ſiue domeſtico, melli admiſcens. Admodum verò, ſi ita ſumptum ſit, ſomnum conciliat.

Papa

Papauer hortenſe, ſiue Satiuum: Græcis, μήκων ἥμερος: Arabibus, Thaxthax, ſeu Chaschas: Italis, Papauero domeſtico: Germanis, Mag ſomen: Hiſpanis, Dormidera: Gallis, Pauot blanc, ſeu Pauot priué.



Locus.

Hortenſe eſt.

Qualitates.

Papauerum facultas refrigeratoria eſt. Semen mediocriter ſomnum conciliat: proinde pani ipſum inſpergunt, ac melle maceratum edunt. Dio. li. 4. cap. 60.

Ex Fuchſio.

Refrigerat quarto ordine, ſicut cætera Papauerum genera.

Papauer corniculatum, ſiue cornutum: Græcis, μήκων κερατίτης: Arabibus, Almacharam: Italis, Papauero cornuto: Germanis, Gelbolmagen, Moen, &, Beel magſamen: Hiſpanis, Dormidera marina: Gallis, Pauot cornu.

Dio. li. 4. cap. 61. Gal. li. 7. ſim. me.



Locus.

Naſcitur in maritimis & aſperis,

Qualitates.

Vim habet incidendi & abſtergendi. Radix herbæ, in aqua decocta, ad dimidium, hepaticos affectus adiuuat. Folia, & flores ſordida admodũ & maligna Vlcera iuuant. Sed ab his abſtinere oportet Vlceribus iam expurgatis: adeò enim abſtergere Valent, Vt puræ quoque carnis nonnihil eliquent.

Hype

Parthenium, ſeu, Matricaria: Græcis, παρθένιον: Arabibus, Achuen, Vchuen, Achuan, ſiue, Alachuan: Italis, Matricaria, & Amarella: Germanis, Muotter kraut, ſeu Mettrã: Gallis, Matricaire, Maronne, ſeu, Herbe de la Mere.

Locus ex Matthiolo.



Seritur in hortis, & ſponte prouenit in locis calidis.

Qualitates.

Bilẽ & pituitam extrahit non ſecus atque Epithymum, ſiccata, & pota cum Aceto mulſo. Decoctum inſeßionibus accommodatur ad inflammationes, et duritiẽ vuluarũ.

Dioſ. li. 3. cap. 138.

Ex Fuchſio.

Calefacit & deſiccat moderatè.

Hyoſciamus, Apollinaris, Altercum, ſine, Faba Suilla: Græcis, Ὑοσκύαμος: Arabibus Bengi: Italis, Iuſquiamo: Hiſpanis, Velenho Gallis, Iuſquiame, ſeu, Hanebane: Germanis, Bilſomen, ſeu, Bilſen.

Locus ex Fuchſio.



Naſcitur in Agrorum & ſcrobium marginibus, & inter rudera.

Qualitates.

Gale. lib. 8. ſimpl. medica.

Hyoſciamus, cui ſemen atrum eſt, inſaniam ac soporem adfert. Hinc autem, is cui ſemē mediocriter flauum eſt, propinquam facultatē obtinet. Vtrique fugiendi ſunt, vt inutiles, veneniſi & deleterij. Cæterum cui ſemē ac flos candidus eſt, ex tertio quodammodo eſt ordine refrigerantium. Oleum, quod ex ſemine elicitur pſilothrum eſt.

Pſyl

Psyllium, siue herba pulicaris: Græcis, ψύλλιον: Arabibus, Bazora chathona, seu, Bezer cothume: Italis, Psillio: Germanis, Psilien kraut: Hispanis, Zargatona: Gallis, Herbe á puces.



Locus

In aruis & incultis nascitur. Diosc. lib. 4. cap. 55

Qualitate.

Semen admodum utile est, ex secundo refrigerantiũ ordine: in desiccando verò & humectando medium quodammodo est, & symmetrum. Galen. li. 8. simpl. medica.

Solanum hortense, Solatrum, siue Morella: Græcis, στρύχνος κηπαῖος: Arabibus, Hameba thanaleb, Hameb alchahaich: seu, Hanalalthaleb: Italis, Solatro: Germanis, Nachtschadt Hispanis, Yerua mora: Gallis, Solatrum, seu, Morelle.

Locus ex Fuchsio.



Nascitur passim in opacis, & secus vias.

Qualitates.

Galen. li. 5. & 8. sim. me.

Vtimur eo ad omnia quæ refrigerari, ad stringique postulant: potest enim hæc duo ordine secundo: in gradu verò siccitatis & humiditatis ferè symmetrum est.

Sola

Solanum halicacabum, Veſicaria, Halicacabus, ſiue Alkakẽgi: Græcis, στρύχνος ἁλικάκαβος, ἢ. φυσαλίς: Arabibus, kekengi, Alkekẽgi, & Kekenegi: Italis, Halicacabo: Germanis, Iuden Kirſen, ſeu, Boberellen: Hiſpanis, Bexiga di perro: Gallis, Baguenaudes.

Locus, ex Fuchſio.



Naſcitur in vinetis:

Qualitates.

Halicacabum in foliorũ facultate hortenſi Solano ſimile eſt, fructum habens ciendæ vrinæ idoneum: proinde multis cõpoſitis facultatibus, quæ ad iecur, ad veſicã, & renes acommodantur, miſcetur.

Gal. li.8. ſim. me.

Solan

Solanum somniferum, siue, Solatrum soporiferum: Græcis, στρύχνος ὑπνωτικός: Gallis, Solatrũ dormitif: Germanis, Dollkraut, aut, Schlaffkraut.

Diosc. lib. 4. ca. 68.

Gal. lib. 8. sim. med.



Locus

Nascitur in saxis, non procul à Mari.

Qualitates.

Papaueris succo persimilis est, cortex radicis, nisi quod eousque imbecillius est, vt tertij habeatur ordinis refrigerantium, cùm Opium sit quarti. Semen vrinam ciendi vim habet, verũ si plus duodecim Corymbis hauseris, dementiam furiã ve asciscet. Radicis cortex desiccat secundo ordine completo, & tertio incipiente: refrigerat verò secundo incipiente. Quatuor drachmæ sumptæ mortem inferunt, pauciores insaniam. Vna innoxiè sumitur.

Solan

Solanum somniferum alterum.



Locus.

Nascitur inter saxa.

Qualitates.

Huc refert omnem Solani soporiferi historiam.

Sola

Solanum quintum, ſiue Solatrum maius: Gallis, Solatrum dormitif commun: Italis, Herba bella Donna: Quibuſdam cenſetur tertia Theophraſti Mandragora.

Theo. li. 6. de na. plan. c. 2.



Locus.

Naſcitur in Montibus inter ſaxa, & ſeritur in hortis.

Qualitates ex Matthiolo.

Eandem vim habet quam Solanũ ſomnificum. Eius baccæ, largius ſumptæ, interficiunt, facto inexpugnabili ſomno.

Stra

Stramonia: Germanis, Rauchoepffel, aut Stechoepffel: Gallis, Põme espineuse: Italis, Pomo spinoso.



Locus ex Fuchsio.

Seritur in hortis.

Qualitates ex Matthiolo.

Plerique existimant hanc viribus Solano non dissimilibus præditam esse.

Man

Mandragoras mas siue candidus, Antimelus, aut Circea: Græcis, μανδραγόρας: Arabibus, Iabora, & yabroach: Italis, Mādragora: Germanis, Alraun: Hispanis, Mandracola: Gallis, Mandragore, seu, Mandegloire.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in Montibus, maximè in Gargano Mōte Apuliæ: & seritur in hortis, fouetúrque in fictilibus, spectaculi gratia

Qualitates.

Gale. lib. 7. simpl. medic.

Vincentem habet facultatem refrigeratoriam, adeò vt tertij sit ordinis refrigerantium. Veruntamen & caliditatis cuiusdam particeps est, & in primis humiditatis: proinde soporem conciliandi vim ea habent. Radicis cortex, cùm sit valentißimus, non tantum refrigerat, sed & desiccat. Reliquū, quod intus est, imbecillū existit.

Man

Mandragoras niger, seu fœmina: Gallis, Mandegloire femelle.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Mandragoræ candidi historiam.

Mala insana: Italis, Melanzana, seu Petranciani: Germanis, Melantzan: Gallis, Pommes d'Amours.

Locus ex Fuchsio.



Seruntur vt Melopepones, & Cucumeres.

Qualitates ex eodem.

Frigida sunt, & humida.

Ex Matthiolo.


Sunt qui vtantur ad Venerem excitãdam, quòd flatuosa sunt & concoctu difficilia. Frequentius tamen mansa biliosos generant humores, pariúntque viscerum obstructiones: vnde postea diuturnæ proueniunt febres, & habitus malus.

Auicenna.

Aconit

Aconitum Pardalianches, Scorpio Plinio, Cammoron, Thelyphonon, seu Myoctonon Latinis, & Græcis: Italis, Aconito: Germanis, Vvolffs beer, seu Doll vvurtz: Hispanis, Centella: Galiis, Aconit, la Tore, seu Estrangle Lyepard.

Locus.



Nascitur in Montibus, & nudis Cautibus, nullo iuxta, ne pulue re quidem nu triente.

Pli. li. 27. cap. 3.

Qualitates.

Putrefacien di facultatem obtinet, & lethale est: itaque in cibo, potúque fugiendum. At tamen ad putrefaciẽdum externas corporis partes, aut circa sedem idoneum est. Herbæ verò radix ad hæc vtilis est.

Gale. li. 6. simp. medica.

Aconitum cynoctonum, Lycoctonon, seu Luparia: Græcis ἀκόνιτον κυνόκτονον: Italis, Aconito per amazzar Lupi e Cani: Germanis, Vvolffs vvrtz. Hispanis, Yerua matta Louo, seu Yerua de Ballesteros.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in omnibus ferè montibus.

Qualitates.

Gale. li. 6. simp. medica.

Lycoctonon similem priori Aconito facultatem habet: sed peculiariter lupos, sicut illud Pardos interficere consueuit.

Aconi

Aconitum tertium, siue Luparia: Gallis, La Tore à fleurs iaunes: Italis, Vulparia.



Locus.

Nascitur in omnibus ferè montibus.

Qualitates.

Deleterium est vt cætera Aconita.

Aconitum quartum, seu Luparia aut Vu[lparia] altera : Gallis , Aconit aux fleur[s] iaunes.



Locus ex Matthiolo.


Nascitur in omnibus fere montibus.

Qualitates.

Deletericæ facultatis est, ut cætera Aconita.

Herba

Herba Paris, Vua versa, siue Vua vlpina. aut Aconitum Pardalianches falsum: Gallis, Raisin de Renard.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur in omnibus ferè syluis, & Montibus.

Qualitates ex Matthiolo.

Semen contra veneficia, & morbos diuturnos præstantissimum est medicamentum. In quē vsum sumet illius puluerem, drachmæ pondere, in vigesimum vsque diem.

Napellus.



Locus.

Nascitur in Montibus.

Qualitates ex Matthiolo.

Napelli vis in necandis hominibus adeò immanis sæuáque existit, vt nullis ferè antidotis occurri poßit, nisi quàm primum & statim succuratur.

Napellus secundus.



Locus, Qualitates.

Idem cum priore Napello est.

Cicuta: Græcis, κώνειον: Arabibus, Sucaran: Italis, Cicuta: Germanis, Ziger kraut, Schirling, ſeu Vveterich: Hiſpanis, Ceguda: Gallis, Cignë, Cocuë, aut Seguë.

Locus ex Matthiolo.



Paſsim prope Vrbium & Oppidorum mœnia prouenit.

Qualitates.

Gal. li.7. ſimp.me.

Extrema refrigerantis eſt facultatis.


Ex Matthiolo.

Cicuta radix manſa, et in cibum ſumpta, aut pota, eam amentiam facit, quam Græci, ab ipſa Cicuta, κονίον appellant.

Taxus

Taxus: Græcis, σμῖλαξ: Italis, Taſſo: Germanis, Eiden baum: Hiſpanis, Texo: Gallis, If.

Locus ex Matthiolo.



Naſcitur in montibus, ſaxoſis ac præruptis locis, & inter Abietes & Piceas.

Qualitates.

Venenoſæ eſt facultatis. Gale.li.8. ſim.me.


Ex Plinio.

Vaſa Viatoria ex ea, Vinis, in Gallia facta, mortifera fuiſſe compertum eſt, &c. Pli. li.16. cap. 10.

Apocy

Apocynum, Cynocrambe, Cynomorũ, siue, Brassica Canina: Græcis, ἀπόκυνον: Syris, Periploca repens.

Locus ex Matthiolo.



Rara & exotica planta est, Syrisque familiaris: pergulis, & Scenis inumbrandis aptissima, topiarióque operi.

Qualitates.

Gale. li. 6. simp. me.

Canes celerrimè interimit, hominibúsque est venenum. Multùm grauiter olet. Proinde calida omnino est non instrenuè: non tamen proportione desiccat. Illita admodum digerentis est facultatis.

Nerium

Nerium, Rhododendrũ, Rhododaphne, siue, Oleander: Græcis, νήριον, ἢ ῥοδόδενδρον: Italis, Oleandro: Germanis, Olander: Hispanis, Adelfa, seu, Eloendro: Gallis, Oleandre, Rosage, seu Rosagine.



Locus.

Nascitur in amænis, maritimis, & secus amnes.

Dio. li. 4. ca. 77.

Qualitates.

Illitum discutiendi vim obtinet: intus sumptum, sanis hominibus perniciosum ac venenosum, plerisque etiam pecudibus.

Gal. li. 8. sim. me.

Fungi

Fungi: Græcis, μυκήτες: Arabibus, Hathar, seu, Father: Italis, Fonghi: Germanis, Pfifferling, Schvvemm, aut Keysckem: Hispanis, Hongos, Cogomelos, & Cyllerquas: Gallis, Potirons, Champignons, seu Moucerons.



Locus.

Siccos & nemorosos tractus amant: & nascuntur vbique.

Qualitates.

Gal. li.8. sim. me.

Fungus frigida humidáque admodum planta est: quamobrem etiam proximè ad deleteriam enecantémve facultatem accedit. Et sanè inter eos sunt qui interficiant: potißimùm qui ex natura mistam habent qualitatem putredinosam.

Colchicum ephemerum, Bulbus agreſtis, Officinis falsò, Hermodactylus: Græcis, κολχικόν: Arabibus, Surugen: Italis, Colchico: Germanis, Zeittloſz, aut Vvild ſaffran: Gallis, Mort au chien, ſeu Chiennée.



Locus.

Naſcitur vbique in Pratis vliginoſis.

Qualitates.

Strangulando enecat, eſt enim deleteriæ facultatis. Gal. li. 6. ſimp. me.

Ex Matthiolo.

Turcæ, cum inebriari volunt, flores vino macerant: dilutóque eorum poto adeo ſtupidi redduntur, vt in Ecſtaſin abeant.

Epheme

Ephemerum, seu Iris syluestris: Græcis, ἐφήμερον: Gallis, Flambe blanche sauuage: Italis, Giglio matto.

Locus ex Fuchsio.



Frequentissimum nascitur in montibus, pratis, & syluis.

Qualitates.

Galc. li. 6. simp. me.

Radix adstringens est, & boni odoris: ex quibus palā fit, quòd mistæ sit facultatis, temperaturæque, nempe repellentis, & halitu digerentis. In dentium doloribus colluitur efficaciter: folia autem tuberculorum tum augmēto, tum vigori congruunt. Oportet autem ea vino decocta, priusquàm pus moueas, illinere.

Helxine

Helxine, Parietaria, Vitriola, ſiue Perdicium: Græcis, ἑλξίνη: Italis, Parietaria, aut Vitriola: Germanis, Tag vnd nacht: Hiſpanis, Yerua del muro: Gallis, Paritoire, Parietaire, ſeu Vitriol.



Locus.

Naſcitur in parietinis, ſepibus, & maceriis. Dio. libr. 4. ca. 81.

Qualitates.

Vis ei ineſt abſtergendi & leuiter conſtringendi cum humiditate ſub frigida, Phlegmonas omnes in initio & augmento ſanat vſque ad ſtatum, maximè ſi calidæ fuerint. Diutina tuſſi vexatis quidam exhibent. Gale. li. 6. ſimp. me.

Alſine: Græcis, ἀλσίνη: Italis, Centone, Panarina, ſeu Pizza gallina: Germanis, Huenerdorm, ſeu Vogel Kraut: Gallis, Mouron.



Locus.

Lucis opaciſque gaudet.


Qualitates.

Dio. li. 4. cap. 82. Gale. li. 6. ſimpl. med.

Similem Helxinæ facultatem obtinet, nempe refrigerantem & humectantem: eſt enim eſſentiæ aqueæ frigidæ: quare & citra adſtrictionẽ refrigerat. Quocirca ad feruentes phlegmonas, & mediocria Eryſipelata competit.

Lens

Lens Paluſtris, ſiue Lenticularia: Græcis, *φακὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελμάτων*: Arabibus, Tahaleb, ſeu Thaleb: Italis, Lente de gli paludi: Germanis, Vvaſſer linſen: Hiſpanis, Lenteya dellagoa: Gallis, Lentille de marais, ſeu de Mer.



Locus.

Inuenitur in aqua non fluente. Dio. li. 4. cap. 83.

Qualitates.

Humidæ frigidæq; temperaturæ eſt, vtrinque ex ſecundo quodammodo ordine. Gal. li. 8. ſimp. medica.

Sedum maius, aut Semperuiuum maius: Græcis, ἀείζωον μέγα : Arabibus, Beia halalen, seu, Hai alhalez: Italis, Sempreuiuo maggiore: Germanis, Grosz hausz VVurtz: Hispanis, Sempreuiua, & Yerua puntera: Gallis, Grande Ioubarbe, & Oüye.



Locus.

Dio.li.4. cap.84.

Nascitur in montibus & testaceis, & supra domicilia seritur.

Qualitates.

Gal.li. 6 simp.me.

Aïzoon maius & minus desiccat quidem leuiter quandoquidem & mediocriter adstringit, omnis alterius vehementis qualitatis expers: quare in eo plus cæteris abundat essentia aquea. Cæterùm non mediocriter refrigerat: est enim ex tertio ordine refrigerantium.

Se dum

Sedum minus fœmina, Semperuiuum minus, aut Vermicularis: Græcis, ἀείζωον μικρὸν: Italis, Sempreuiuo minore, seu Pignola: Germanis, Kleyn hausz Vvurtz: Gallis, petite Ioubarbe, seu Couille au Loup.




Locus.

Nascitur in petris, parietinis, & maceriis, necnon in scrobibus opacis. Dio. li. 4. cap. 85.

Qualitates.

Eiusdem est temperamenti, cuius Semperuiuum maius.

Semperuiuum tertium, seu Illecebra: Græcis, ἀειζώου εἶδος τρίτον: Arabibus, Alsebram, Handrachabara, seu, Tilafon: Italis, Sempreuiuo terzo.



Locus ex Matthiolo.

Diosc. li. 4. ca. 86.

Nascitur in saxis, antiquisque ædificiorum parietibus, & saxorum rimis.


Qualitates, ex Dioscoride.

Visci excalfactoria, acris & exulcerans. Illita cum axungia strumas discutit.

Vmbi

Vmbilicus Veneris, ſiue Acetabulum: Græcis, κοτυληδών: Italis, Cope, triuole: Hiſpanis, Scudetes: Gallis, Eſcuelles.

Locus ex Matthiolo.



Frequens naſcitur in ſaxis, & vetuſtis ædificiorum parietibus.

Qualitates.

Cotyledon facultatis mistæ eſt, nempe humidæ, ſubfrigidæ, & cuiuſdam obſcurè adſtringētis, & cum ea leniter amaræ: vnde refrigerat, repercutit, abſtergit, & diſcutit. Putantur folia cum radice manducata calculos confringere, & vrinam mouere.

Gale. lib. 7. ſimpl. medic.

Vmbilicus Veneris alter, quibusdã Cymbalium, seu, Cotyledum alterum.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Montibus, saxisq́; inhæret

Qualitates.

Diosc. lib. 4. ca. 88.

Facit eadem quæ Semperuiuum.

Vrtica prima: Græcis, ἀκαλύφη: Arabibus. Huniure, Vraithlatun, ſeu, Angiara: Italis, Ortica: Germanis, Neſſel: Hiſpanis, Ortiga: Gallis, Ortiè.



Locus.

Solo tactu, vel etiam noctu, ab omnibus facilè dignoſcitur.

Qualitates.

Semen & folia (nam hæc potiſsimũ in vſum veniũt) digerentis ſunt facultatis. Sed & quiddam flatuoſum obtinent, quo & Venerẽ extimulãt: maximeq; vbi cũ Muſto ſemẽ bibitur. Porrò vehemẽter calfacit, eſtque admodũ tenuiũ partiũ: proindeq; craſſos viſcoſoſq; humores educit ex pectore, & pulmone. Actu tamen flatuoſa eſt, nõ poteſtate: flatus enim generat dũ cõcoquitur, In ſumma, ſubtiliũ eſt partiũ, & tẽperatura ſicca, nõ tamẽ tãtũ habet caliditatis vt etiã mordicare poſsit.

Gal. li. 6. ſim. me.

Vrtica secunda: Gallis, Seconde espece d'Ortie.



Locus, Qualitates.

Eadem nimirum quæ & superior est: nisi quòd minus aspera est priore.

Vrtica

Vrtica Græca, seu, Vrtica syluestris: Gallis, Ortie sauuage, seu, Ortie gringette.



Locus.

Nascitur vbique temerè.

Qualitates.

Acrior est & mordacior cæteris Vrticis.

Cardiaca, siue Agria Palma: Italis, Cardiaca: Germanis, Hertz gespan: Gallis, Gripaume, seu, Cheneueuse.

Locus ex Matthiolo.



Prouenit vbique iuxta semitas, circa sepes, & post vrbium mœnia.

Qualitates ex eodem.

Gustu adeò amarescit vt facilè existimari possit ad secundum excalfacientium ordinem, & tertium siccātium accedere. Præstat ad Cordis affectus: medeturq; cõuulsis ac resolutis. Pectus à pituita detergit: Lūbricos necat: obstructionesq; frigidas aperit, & mēses vrināq; ciet. In puluere contrita, & cochlearis mensura ex vino hausta difficilè parientibus mirum in modum opitulatur.

Galio

Galiopsis vrtica Labeo, vrtica fœtida siue vrtica mortua: Græcis γαλίοψις: Italis Ortica fetida: Germanis, Vvelschnessel: Hispanis, Ortiga muerta: Gallis, Ortie puante.

Locus.



Nascitur circa sepes, ædificiorum areas, ac semitas vbique.

Dios. lib. 4.ca.90.

Qualitates ex Diosc.

Folia, caules, semen succúsque durities & carcinomata dissipant, strumasque panos, & parotidas discutiunt. Oportet, bis die, tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere.

Scro

Scrophularia maior, Millemorbia, Ficaria, Ferraria, siue, Castrangula: Germanis, Braun Vvurtz: Gallis, Grande scrofulaire.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in scrobium marginibus, riguis, & vliginosis locis.


Qualitates ex eodem.

Radix strumas & hæmorrhoidas sanat. In quem vsum radix effoditur Autumno, repurgatáque tunditur cum recenti butyro: operculatóque fictili in vliginoso loco reponitur, vbi dimittitur per quindecim dies. Deinde lento igne butyrum illud liquefit, & percolatum asseruatur, quo prædicti morbi vtilissimè illinuntur.

Galion

Galion Latinis, & Græcis: Italis, Galio: Germanis, Megerkraut, Vnſer fravvẽ, V vegſtro: Hiſpanis, Coaia leche yerua: Gallis, Petit Muguet.

Locus.



Naſcitur in paluſtribus. Dioſ. lib. 4. cap. 91

Qualitates.

Galium ideo nomẽ ſortitum eſt ſuum, quòd lac coagulet. Adſimile autem eſt Aparinæ, facultatem obtinens exiccatoriam, & ſubacrẽ. Flos eius ſanguinis profluuijs competere videtur, & combuſtis mederi. Gal. li. 5. ſim. me.

Sene

Senecio: Græcis ἠριγέρων: Italis, Cardoncello, aut, Spelliciosa: Germanis, Creutz Vvurtz: Hispanis, Buon varon.



Locus.

Dio. li. 4. cap. 92. Gale lib. 6. simpl. medica.

Nascitur maximè in maceriјs, & circum oppida.

Qualitates:

Facultatem mistam obtinet, simul refrigeratoriam & modicè digerentem.

Mus

Muſcus marinus, ſiue Corallina: Græcis, βρύον θαλάσσιον: Arabibus, Thahaleb, ſeu Thabel, ſicut Lens Paluſtris: Germanis, Meermiesz ſeu, Mermoeſz: Hiſpanis, Mallorquiana yerua: Gallis, Coralline.



Locus.

Naſcitur in ſcopulis, teſtaceiſque haud procul à Mari.

Dioſ. li. 4. cap. 94.

Qualitates.

Conſtat ex terrena et aquea eſſentia, vtraque frigida: ſiquidem & guſtum adſtringit: & calidis quibusuis illitus, ea euidenter refrigerat, & adiuuat.

Gale. li. 6 ſimp. me.

Pota

Potamogeton, Stachytes, siue Fontalis: Græcis, ποταμογείτων: Germanis, Sam kraut, aut Sechalden kraut: Italis, Potamogeto: Gallis, Herbe des Estangs.



Locus.

Dio. li. 4. cap. 96. *Nascitur in palustribus, lacubus, & aquis stagnantibus.*

Qualitates.

Gal. li. 8. simp. me. *Adstringit & refrigerat similiter Polygono: sed essentia eius crassior quàm Polygoni est.*

Stratiotes Millefolium, ſeu Millefolium maius: Græcis, στρατιώτης χιλιόφυλλος: Italis, Millefoglio: Germanis, Garben: Hiſpanis, Milloyas yerua: Gallis, Millefueille, Cumin, ou Aneth ſauuage.

Locus ex Matthiolo.



Non admodum vulgaris eſt planta. Naſcitur in ſaxoſis.

Qualitates.

Adſtrictionis nonnihil habet: proinde & vulnera glutinare poteſt, & vlceribus eſſe vtilis. Sunt qui eo & ad ſanguinis eruptiones vtantur & ad fiſtulas.

Gal. li. 8. ſimpl. medica.

 Mille

Millefolium minus.



Locus.

Naſcitur paßim in aſperis agris, præcipuè circa ſemitas.

Qualitates.

Huc refer prioris Millefolij hiſtoriam.

Verba

Verbaſcum album fœmina, Officinis, Tapſus barbatus: Græcis, φλόμος: Italis, Verbaſco: Germanis, Vveyſz vvullkraut: Gallis, Bouillon blanc femelle.

Locus ex Fuchſio.




Naſcitur paſſim in Campeſtribus, & ſyluoſis.

Qualitates.

Radix guſtu acerba eſt & fluxionis affectibus prodeſt: ſed & ad dentium dolorem eam quidam colluunt. Attamen folia moderatè digerendi vim habent, & deſiccandi.

Gal. li. 8. ſimpl. medica.

Verbaſcum album mas: Gallis, Bouillon blanc maſle.



Locus.


Naſcitur paßim in Campeſtribus.

Qualitates.

Eandem temperaturam & vim habet, quam Verbaſcum fœmina.

Ver

Verbascum nigrum: Gallis, Bouillon noir.



Locus.

Nascitur passim in Campestribus & Syluosis.

Qualitates.

Easdem vires obtinet quas Verbascum primum.

Verbaſcum Lychnitis, Lanaria, Tryallis, Candelaria, Candela Regis, ſeu Tapſus barbatus: Græcis, φλόμος: Germanis, Kunigs kertz.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Verbaſcorum hiſtoriam.

Verba

Verbascum syluestre, Gallis Bouillon sauuage, seu Bouillon à fleurs iaunes.



Locus.

Nascitur in Campestribus.

Qualitates.

Huc refer omnem Verbascorum historiam. Folia tamen ambustis sunt cataplasmata.

Primula veris, Verbasculum, Herba Paralysis, Arthetica, Arthritica, Brachæ cuculi, siue Verbascum odoratum: Italis, Fior di Prima vera, aut Brache di Cuculo: Germanas, Schlusselbluomen: Gallis, Prime vere, seu Brayes de Cocu.

Locus.



Nascitur passim, vere ineunte in pratis.

Qualitates ex Matthiolo.

Efficacem vim tribuunt ad articulorum dolores. Decoctum radicis ad renum & vesicæ calculos cōfert. Succus potus, & illitus, fractis, luxatisque ossibus valde prodest. Eodem expresso ex floribus, mulieres vtuntur ad erugandam faciem, eiusque maculas detergendas.

Primu

Primula veris altera.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Verbasculi historiam.

Blas

Blattaria, Dioscoridi, Verbascum aureos flores emittens: Gallis, Herbe aux Mittes.



Locus ex Matthiolo.

Pli.li.25. cap.9.

Nascitur passim in Campestribus.

Qualitates ex eodem.

Ex amaritudine colligere licet, eam abstergere, & aperire posse.

Aethio

Aethiopis Latinis, & Grecis.



Locus.

Naſcitur in montibus, & plurima in Ida monte Troadis, & in Meſſenia Siciliæ. Dio.li.4. cap.100.


Qualitates, ex Paulo.

Radicis decoctum potum auxiliatur iſchiadicis, pleuriticis, & ſanguinem reÿcientibus. Arteriæ etiam aſperitates cum melle lenit. Aegin.libro 7.

Perſo

Personata, Prosopis, Prosopion, siue, Lappa maior, aut Bardana: Græcis, ἄρκτιον: Italis, Lappola maggiore: Germanis, Grosz Kletten: Hispanis, Bardana, aut Pagamacera maior: Gallis, Gletteron, seu Glouteron.

Locus ex Fuchsio.



Nascitur passim, maximeq; in pratorum & agrorum marginibus.

Qualitates.

Gale. li. 6. simpl. medica.

Discutit simul & desiccat, sed & adstringit mediocriter. Quamobrem folia eius veteribus vlceribus mederi possunt.

Perso

Perſonata altera, Plinio, Perſolata, falsò dicta Petaſites: Germanis, Peſtilentz Vvurtz.

Pli. li.25. cap.9.



Locus ex Fuchſio.

Naſcitur in pratis vliginoſis, & riguis.

Qualitates, ex eodem.

Ex amaritudine, quam poßidet, deſiccare tertio ordine videtur. Puluis radicis ex vino ſumptus efficacißimus eſt aduerſus febres peſtilentes, tormina, & vteri ſtrangulatus. Sudorem maximè ciet.

Epipa

Epipactis, seu Elleborine: Græcis, ἐπιπακτίς.



Locus.

Dio.li.4. cap.104.

Nascitur in locis vliginosis.

Qualitates.

Iocineris vitiis vtilis est, & contra venena bibitur.

Fuma

Fumaria, ſiue, Fumus Terræ: Græcis, καπνὸς: Arabibus, Sechiterig, aut, Sahete-regi: Italis, Fumus terræ: Germanis, Erdtrauch: Hiſpanis, Palomilla: Gallis, Fume-terre, ſeu Pié de Geline.



Locus.

Naſcitur in parietinis, et ſepibus, & paßim in hortis. Pli.li.25. cap.13.

Qualitates.

Acris ſimul & amaræ qualitatis eſt particeps, nec tamē planè expers eſt acerbæ. Quāobrem vrinam biliosam multam prouocat. Herba exiccata ſubductionis gratia melicrato inſpergitur: volenti autem roborare ſtomachum, vino diluto inſpergat. Gale.li.7. ſimp.med.

Fumaria altera Plinij, Fuchsio Pistolochia falsò dicta.

Pli.li.25. cap.13.



Locus, ex Plinio.

Nascitur in hortis & segetibus hordeaceis. Fuchsio tamen fruticat in syluis, & locis opacis.

Vires ex eodem.

Claritatem facit inunctis oculis, delachrymationémque, ceu fumus, vnde illi nomen.

Lotus

Lotus vrbana, Officinis, Melilotus: Græcis, λωτὸς ἥμερος: Italis, Meliloto: Germanis, Edler Steyn klee: Gallis, Melilot.



Locus.

Nascitur in hortis, pratisque, & inter segetes. Dio.li.4. cap.106.

Qualitates.

Vt mediocriter concoquendi vim possidet, sic etiam exiccandi: in caliditatis frigiditatisque coniugatione media quodammodo est, & temperata. Gal.lib.7. simp.me.

Lotus ſylueſtris: Græcis, λωτὸς ἄγριος: Arabibus, Handachocha, Garch, & Thusf: Germanis, Stein klee: Italis, Loto ſaluatico: Gallis, Grand Treffle des pierres.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in incultis & pratis.

Qualitates.

Gale. li. 7. ſimpl. medica.

Semen eius ſecundi eſt ordinis calefacientium: habétque nonnihil abſterſorium.

Millefo

Millefolium paluſtre: Græcis, μυριόφυλλον.



Locus.

Naſcitur in paluſtribus.

Qualitates.

Dio.li.4. cap.110.

Myriophyllon adeò deſiccat, vt vulnera glutinet.

Gale.li.7 ſimp.me

Millefolium paluſtre alterum.



Locus, & Qualitates.

Huc refer que dicta ſunt de Millefolio priore.

Myrrhis,

Myrrhis Myrrha, aut, Cicutaria.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur in hortis, in pratis: & inter segetes.

Qualitates.

Radicē habet odoris iucūdi, & dulcē, quæ mensēs mouet & ea quæ in thorace ac Pulmone sunt expurgat. Itaque ex secundo ordine fuerit excalefacientium, adiuncta quadā partium tenuitate.

Gale. lib. 7. simpl. medica.

Angelica: Germanis, Angelic: Gallis, Angelique.

Locus ex Fuchſio.



Naſcitur in Montibus, & ſeritur in hortis.

Qualitates ex Matthiolo.

Radix guſtu acris eſt & ſuauiter odorata. Excalfacit pariterque deſicat ordine ſecundo completo, aut tertio incipiente. Proinde aperit, attenuat, & diſcutit. Venenis mirificè aduerſatur: quare peſtilentiam arcet hauſta, aut frequenter commanſa. Ipſa per ſe ſumpta pituitoſos lentóſque humores digerit. Radix in puluerem trita animi deliquijs & cæteris cordis affectibus opem ʋnicè præſtat.

Cirſ

Cirsium, quibusdam falsò, Buglossum: Græcis κίρσιον.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in vliginosis locis.

Vires.

Radix, adalligata loco laboranti, dolores varicum sedat. Dio.li.4. cap. 114.

Aster Atticus, Bubonium, siue Inguinalis: Græcis, ἀςὴρ ἀτ]ικος: Arabibus, Astaraticon: Italis, Aster Attico: Germanis, Sternkraut: Gallis, Petite espargoutte, seu, Petit Muguet.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in asperis, incultis, & conuallibus.

Qualitates.

Gal. li 6. sim. me.

Aster Atticus Bubonium dictum est, nō ob id tantum quòd illitum, sed etiā quòd suspensum Bubonas sanare creditur. Habet quiddam etiam digerens: habet verò non minimè & refrigerans quiddam ac reprimens, adeò vt mistæ sit facultatis vt Rosa: verùm non adstringit.

Alchi

Alchimilla, Stellaria, siue, Patta Leonis: Italis, Piè di Leone, seu Alchimilla: Germanis, Synnavv: Gallis, Piè de Lyon.

Locus ex Matthiolo.



Plurima in montibus prouenit, & in pratis clinosis.

Qualitates ex Fuchsio.

Folia, radiceque valide adstringunt & desiccant: vnde potionibus vulnerarijs peropportuna est, & desiccandis adstringendisque fœminarum locis. In quem vsum stillatitia eius aqua, aut decocto, aut puluere vtuntur. Vide Matthiolum.

Vio

Viola purpurea: Græcis, ἴον μέλαν, καὶ ἴον πορφυροῦν: Arabibus, Seneffige, Sonofrig, ſeu, Benefefegi: Italis, Viola mammola: Germanis, Mertzen violen: Hiſpanis, Violeta: Gallis, Violette de Mars.

Locus.

Dio. li. 4. cap. 117.



Opacis & aſperis naſcitur. Seritur etiam in hortis ad coronamẽta.

Qualitates.

Gal. li. 6. ſim. me.

Violæ folia aqueam & ſubfrigidam ſubſtantiam ſuperantem poſſident: proinde tum per ſe, tum cum polenta illita, calidas phlegmonas mitigant.

Ex recentioribus.

Violæ, citra noxam, deiectoria facultate præditæ ſunt.

Iacea

Iacea, seu, herba Trinitatis, Italis, Iacea: Germanis, Ireyſſam kraut: Gallis, Penſeés, aut, Menues penſeés.

Locus ex Fuchſio.



Naſcitur ſponte in cultis: ſeriturq́; in hortis ad Coronamẽta.

Qualitates ex Matthiolo.

Quibuſdã ad inteſtinorum ramices mirificè commẽdatur: cenſetúrque eodẽ ordine quo Symphitum. Sunt etiam qui eandem ægrè ſpirantibus, & pulmonum imflammationibus non obſcurè opem ferre tradant: quin & ſcabiem ſanare, & cætera cutis vitia delere.

Buglossum verum, Borrago, siue, Lingua Bouis: Græcis, βȢγλωσσον: Arabibus. Lisen althaur, seu, Lesan althaur: Italis, Borragine: Germanis, Burretsch: Hispanis, Borraia, &, Borraienes: Gallis, Borrache.

Locus.

Dios. lib. 4. ca. 123



Nascitur in campestribus & sabulosis: seriturque in hortis.

Qualitates.

Gal. li. 7. sim. me.

Humidæ, calidaque tēperatura est: itaque Vinis iniectum lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed & ijs, qui ob faucium asperitatem tussiunt, coctum in melicrato conuenit.

Bu

Buglossum vulgare: Gallis, Buglose.



Locus.

Nascitur in Campestribus & sabulosis.

Qualitates ex Matthiolo.

Eisdem pollet facultatibus quibus Borrago.

Cyno

Cynoglossum verum, Latinis & Græcis.



Locus.

Prouenit in ſabuletis.

Vires ex Dioſcoride.

Dio.li.4. cap.124. *Folia cum ſuillo adipe veteri, medentur morſibus canum, alopeciis, & ambuſtis. Emollit aluum decoctum herbæ cum vino potum.*

Co

Cynogloſſum vulgare, ſeu Lingua Canis officinarum: Plinio, alterum Cynogloſſum.



Locus.

Naſcitur paſsim ſecus vias.

Vires ex Plinio.

Radix eius pota ex aqua ranis & ſerpentibus aduerſatur. Pli. li. 25. cap. 8.

Ex Fuchſio.

Recentioribus cenſetur frigida & ſicca ſecundo ordine.

Hippoglossum, Lingua Equina, Lingua pagana, Bislingua, seu Bonifacia: Græcis, ἱππόγλωσσον: Italis, Bislingua, seu Bonifacia: Germanis, Zæpfflin kraut: Hispanis, Lengoa de Cauallo: Gallis, Bislingua.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur frequentissima in Liguriæ Alpibus, & syluosis montibus.

Qualitates ex recentioribus.

In Vteri affectibus, magno datur iuuamento, radicis aut herbæ puluis cochlearis mensura, ex Vino vel iure. Est & ad puerorum Enterocelas præstantissimum medicamentum: si diutius diluculo hauriatur puluis idem sesquidrachmæ, pondere ex Symphiti decocto. Vide Matthiolum.

Anthi

Antirrhinon: Plinio, Anarrhinon, seu Lichnis syluestris: Græcis, ἀντίῤῥινον: Italis, Antirrino: Germanis, Orant, Sterck kraut, aut Steick kraut: Hispanis, Cabezza de Ternera: Gallis, Oeil de chat, seu Mouron violet.

Pli li. 25. cap. 10.



Locus.

Nascitur passim in Aruis.

Qualitates.

Semen est ad sanationes inutile. Herba autem similis est cum Bubonio facultatis, sed minoris multò. Itaque ex illo de hoc conijcito.

Gale. li. 6 simp. me.

 Adian

Adiantum, Capillus Veneris, seu Polytrichon: Græcis, ἀδίαντον: Arabibus, Bersceguaſcen, Bersauſan, & Chulbare albir: Italis, Capel venere: Germanis, Fravvenhar: Hiſpanis, Culantrillo de pozzo: Gallis, Capilli Veneris, aut Salua via.

Dio. li. 4. cap. 131.



Locus.

Vmbroſis, & paluſtribus, circa parietum aſpergines, & fontium ſpecus enaſcitur.


Qualitates.

Gale. li. 5. ſimp. medica.

Adiantum in caliditate quidem & frigiditate ſymmetrum eſt: verum deſiccat, extenuat, & diſcutit, non tamen vllam manifeſtam caliditatem adfert, ſicut nec frigiditatem. Verùm poſuerit ipſum quiſpiam, ſecundum hanc oppoſitionem & temperiem, in ordine medio.

Tri

Trichomanes, Politrychon, ſeu Callitrychon: Græcis, τριχόμανες: Italis, Politrico: Germanis, Steinbrech: Hiſpanis, Politrico: Gallis, Politricum, ſeu Capilli veneris.



Locus.

Naſcitur in eiſdem locis quibus Adianton.

Qualitates.

Dio. li. 4. cap. 132. Gale. li. 8. ſimpl. medica.

Trichomanes eadem præſtat quæ Adiantum: ex hoc ergo de illo conijcito.

Xanthium, Lappa minor, siue Lappa in uersa: Græcis, ξάνθιον καὶ φασγάνιον: Italis, Lappola minore: Germanis, Bettlersleijsz, aut Spitzkletten: Hispanis, Lappa menor: Gallis, Petit Gloutteron, petite Bardane, seu Grappelles.

Dio. li. 4. cap. 133.

Gal. li. 8. simpl. medica.



Locus.

Nascitur lato, & pingui solo, & lacubus exiccatis.

Qualitates.

Fructus discutiēdi vim obtinet.

Ex Fuchsio.

Calidum & siccum censetur ex amaritudine & acrimonia quam gustu præ se fert.

Aegi

Aegilops, siue Festuca: Græcis, αἰγίλωψ: Arabibus, Dausir, Dalifit, Dosana, Dauser, seu Dusser: Italis, Squala: Gallis, Coquiole.



Locus ex Matthiolo.


Nascitur frequens inter segetes: sed frequentißima inter hordeum & Zeam.

Qualitates.

Digerendi vim poßidet: id quod ex gustu patet, leuiter enim est acris. Verùm & ex eo liquet quòd phlegmonas induratas, & agilopas sanet. Gal. li. 6. simp. me.

Galega, siue Ruta capraria, quibusdam falsò Glaux dicta: Italis, Lauanese, aut Lauamani.

Locus ex Matthiolo.



Prope riuos aquarum nascitur, & in vliginosis locis, scrobiúmque aggeribus & passim in montibus.

Vires ex eodem.

Præstat mirificè contra pestilentiam, & venenosorum animalium morsus. In quem vsum herba per se estur, atque illinitur. Succus eius, drachmis quatuor haustus, comitiales valde iuuat.

Osy

Oſyris, ſeu Linaria : Græcis, ὄσυρις: Italis, & Hiſpanis, Linaria: Germanis, Harn kraut: Gallis, Linaire.



Locus ex Fuchſio.

Naſcitur paßim vbique, maximè in Campeſtribus.

Qualitates.

Oſyridi amara ineſt qualitas, & obſtructiones expediendi facultas: quare & in iecinore conſiſtentes obſtructiones adiuuat. Gale. li. 8 ſimp. medica.

Smilax aſpera, Rubus Ceruinus, Hedera ſpinoſa, ſiue Hedera cilisſa: Græcis, σμίλαξ τραχεῖα: Italis, Rouo Ceruino: Germanis, Scharpffe vvinden: Gallis, Tan, ſiue Smilax aſpre.



Locus.

Dio. li. 4. cap. 139.

Naſcitur in paluſtribus & aſperis.


Qualitates.

Gal. li. 7. ſim. me.

Folia guſtata aliquid habent acrimoniæ & alioqui, ſi illis vtaris, calefaciunt.

Smi

Smilax Læuis, Campanella, Funis arborum, siue Volubilis maior: Græcis, μίλαξ καὶ σμίλαξ λεία: Italis, Vilucchio maggiore: Germanis, Vvinden, aut Zaungloeklin: Hispanis, Correguela mayor: Gallis, Liset, seu Campanette.



Locus.

Conuoluitur arboribus.

Qualitates,

Facultate quodammodo Smilaci asperæ par est.

Dio. li. 4. cap. 140. Gale. li. 7. simpl. medica.

Lupus

Lupus ſalictarius, Lupulus, Lupus reptitius, ſiue Hinnulus: Græcis, βρύον: Italis Lupolo, ſeu Bruſcandela: Germanis, Hopffen: Gallis, Houblon.

Locus ex Fuchſio.



Naſcitur ferè vbique in ſepibus. Seritur tamen in Germania ſtudiosè ab ijs qui Zythum conficiunt.

Qualitates, ex Fuchſio.

Calefacit & deſiccat ſecundo ordine, maximè radix.

Ex Meſue.

Flauam bilem detrahit, ſanguinem ab ea expurgat, & eius inflammationes extinguit. Syrupus ex ſaccharo & eius ſucco paratus vtiliſsimè exhibetur in febribus à bile & ſanguine excitatis.

Ruſcus

Ruſcus, Murina ſpina, ſiue, Myrtus ſylueſtris: Græcis, μυρσίνη ἀγρία, καὶ ὀξυμυρσίνη: Arabibus, Cubebe: Italis, Ruſco, & Pongitopi: Germanis, Bruoſch, aut Meuſz dorn: Hiſpanis, Ius barba, & Gilbarbera: Gallis, Bruſc: Officinis, Bruſcus.



Locus.

In aſperis & præcipitibus locis naſcitur. Dio.li.4. cap.141.

Qualitates, ex Dioſcoride.

Folia & baccæ, in vino potæ vrinam cient, menſes pellunt, veſicæ calculos frãgunt, ſtillicidio vrinæ medentur, dolores capitis ſanant, & regium morbum.

Laurus

Laurus Alexandrina, siue Laurus Idæa: Græcis, δάφνη ἀλεξάνδρεια, καὶ ἐπιφυλλόκαρπος: Arabibus, Gar Alexandriæ: Italis, Lauro Alexandrino: Germanis, Zæpfflinkraut: Gallis, Laurier Alexandrin.

Dio.li.4. cap.142.

Gale.li.6. simp.me.



Locus.

Inuenitur in montosis.

Qualitates.

Lauri herba temperatura euidenter est calida, & gustantibus acris simul & subamara est: potáque tum vrinam, tū menses prolicit.

Laurus

Laurus Alexandrina altera.



Locus, Qualitates.

De hac ex priore coniicito.

Daphnoi

Daphnoides, ſiue, Laureola: Græcis, δαφνοειδὴς: Arabibus, Daphnides: Italis, Laureola: Gallis, Laureole.



Locus.

Naſcitur in montoſis.

Qualitates.

Dio.li.4. cap.143. Gale.li.6. ſimp.me.

Eſt perſimilis viribus Lauro Alexandrinæ, ſicut & Chamædaphne.

Ex Fuchſio.

Validè calida eſt, & ſicca.

Chamæ

Chamædaphne, siue Laureola mas: Græcis, χαμαιδάφνη: Arabibus, Chamedaphnes: Officinis, Laureola: Gallis, Laureole masle.



Locus.

Nascitur in montosis.

Qualitates.

Gal. li. 6. simp. me.

Est persimilis viribus Daphnoidi, & Lauro Alexandrinæ.

Veratrum album, ſiue Elleborus albus: Græcis, ἐλλέβορος λευκὸς: Arabibus, Cherbachem, ſeu Charbech abaid: Italis, Elleboro biaco: Germanis, Vveiſz nieſz vvurtz: Hiſpanis, Verde gambre blanquo, & Yerua de Balleſte: Gallis, Ellebore blanc, ſeu Verare blanc.

Locus.

Dio. li. 4. cap. 145.



Naſcitur in montibus & aſperis.

Qualitates.

Gale. li. 6. ſimpl. med.

Elleborus vterque tum albus, tum niger extergentis ſimul & excalfacientis eſt facultatis: vt ſint tertij ordinis excalfaciẽtium & deſiccantium. Porrò niger guſtu calidior eſt: candidus ſubamarus.

Elleborus niger, seu Veratrum nigrum: Græcis, ἐλλέβορος μέλας: Arabibus, Cherbachen, seu Charbech asued: Italis, Elleboro nero: Germanis, Christvvurtz: Hispanis, Verde gambre negro, & Elleboro: Gallis, Ellebore noir, Verare noir, seu Obre.




Locus.

In collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Dio. li. 4. cap. 146.

Qualitates.

In fistulam, callo induratam demissus, duobus, tribúsve diebus callū detrahit. Dentibus prodest cum aceto colluentibus. cætera Elleboro albo persimilis. Gal. li. 6. simp. medica.

Consiligo Matthioli.



Locus, ex eodem.

Plurima nascitur in Bohemia, præsertim in agro Pragensi.

Vires ex eodem.

Radices per auriculam perforatam insertæ, pecorum pulmonariam atque etiam alios morbos curant, Ellebori nigri modo.

Ophris,

Ophris, quibusdam, Elleborus albus, sed falsò: Germanis, *Zvveyblatt*.

Locus, ex Fuchsio.



Nascitur frequentissima in montibus, & in montium radicibus.

Qualitates, ex eodem.

Gustu lentorem quendam emittit, non sine dulcedine: vnde videtur calida esse & sicca.


Ex Matthiolo.

Præfertur vniuersa planta ad denigrandos capillos, fracturas sanandas, & vulnera glutinanda.

Cucumer syluestris, anguinus, erraticus, siue, Asininus: Græcis, σίκυς ἄγριος: Arabibus, Chefe allimar, Khate allhenei, seu Chetha alhamar: Italis, Cocomero saluatico: Germanis, Vvilder cucumer, seu, Esels cucumer: Hispanis, Cocombrillos amargos: Gallis, Cocombre sauuage.

Dios. lib. 4. ca. 149

Gal. li. 8. sim. me.



Locus.

Nascitur in sabuletis, & ruderibus.

Qualitates.

Vniuersa planta in vsu est. Succus summè quidem amarus est, leuiterque calidus: vt ex secundo sit ordine excalfacientium. Digerendi etiam vim possidet: & subtilium est partium. Radix similem succo facultate obtinet: abstergit nanque, digerit & emollit. Porrò cortex ea potentius desiccat

Sta,

Staphis agria, Vua ſylueſtris, Herba pedicularis, & pituitaria: Græcis, σαφις ἄγρια, ἢ ἀσαφις ἀγρια: Arabibus, Alberas, Habelras, Muibazagi, ſiue Miubezegi: Italis, Stafuſaria: Germanis, Biſmiintz: Hiſpanis; Fabaraz, Paparraz: Gallis, Stafis agria, ſeu Herbe aux poux.



Locus.

Naſcitur in opacis. Pli. li. 23. cap. 1.

Qualitates.

Vehementer acrem obtinet facultatem, abſtergitque valenter. Sed & vrendi vim aliquam habet. Gal. li. 6. ſim. me.

Thapſia Latinis & Græcis: Arabibus, Hiá tum, & Drix: Gallis, Turbit blanc.



Locus ex Matthiolo.

Plurima naſcitur in Apulia, præſertim Gargano monte.


Qualitates.

Gale. lib. 6. ſimpl. medic.

Acrē habet ac vehemēter excalfaciētē facultatē cū humiditate. Quamobrē ex alto violēter extrahit: & ipſū quod extraxit, digerit.

Spar

Spartium siue, Spartum: Græcis, σπάρτιον: Italis, Spartio: Germanis, Pfrimmen: Gallis, Geneſt d'Eſpaigne.



Locus ex Fuchſio.


Siccis & aridis gaudet, iuncusque eſt proprie aridi ſoli. Plin. libr. 29. cap. 2.

Qualitates.

Semen, & Virgarum ſuccus non instrenue trahentis eſt facultatis. Gal. li. 8. ſimp. me.

Genista, Genesta, Genistella, seu Genestra: Italis Genestra: Germanis, Ginst: Hispanis, Genestra, Giesta, & Giesteira: Gallis, Geneste.

Locus ex Fuchsio.



Nascitur in Sabuletis, aridisque locis, in collibus, & secus vias.

Qualitates ex Mesue.

Planta tota perturbat, prouocat, incidit & attenuat, obestq́; cordi & ventriculo. Epotum semen pituitam vtrinque valentissimè purgat, & ab articulis quoque humores trahit. Renum & vesicæ excrementa & calculos pellit. Fit ex floribus oxymel, cuius vsu indurati lienes resoluuntur. Dosis florũ à drachmis duabus ad quinq;: seminis verò, à drachmis duabus ad quattuor.

Nar

Narcissus: Græcis, νάρκισσος: Arabibus, Narces, seu Nargies: Italis, Narcisso: Germanis, Vethbluomen, Hornungs bluomen, aut, Zeit losen: Gallis, Narcisse, Campanette, seu, Iannette.



Locus.

Nascitur in montibus, seriturque in hortis ad coronamenta.

Dio. li. 4. cap. 155.

Qualitates.

Gale. lib. 8. simpl. medica.

Narcissi radix adeo exiccandi facultate pollet, vt & maxima vulnera conglutinet, vel ad incisiones vsque quæ circa tendones accidunt. Habet etiam quiddam abstersorium & attractorium.

Ricin

Ricinus, Palma Christi, Cataputia maior, Regium granum, Pentadactylon, siue Croton, Græcis, κίκι, καὶ κρότων: Arabibus, & officinis, Cherua: Italis, Girasole, Mirasole, seu, Faggiuolo turchesco: Germanis, Vunder baũ, seu, Kreutz baum: Hispanis, Figheira del'inferno: Gallis, Palma Christi.

Plin. libr. 15. ca. 7.



Locus.

Germana est Aegypti & Hispaniæ: seritur tamen hodie in hortis.

Qualitates.

Galen. li. 7. simpl. medica.

Ricini semen quemadmodum expurgat, detergit, ac digerit, sic quoque foliũ: sed vndequaque debilius. Oleum quod ex semine cõficitur, calidius, & tenuiorum est partium quàm oleum commune: ac proinde etiam discutit.

Tithy

Tithymalus masculus, Characias, Amygdaloides, siue lactaria herba: Græcis, τιθυμάλος χαρακίας: Arabibus, Xauser, seu, Ethula: Germanis, Vvoliffs milch: Hispanis, Leche tresna, seu, Leche tregna: Gallis, Tithymale de Montaigne.

Locus.



Nascitur in asperis, & montibus.

Dio. li.4 cap. 159.

Qualitates.

Tithymali omnes vincentē habēt acrē, calidāque facultatē. Inest verò & amaritas: validissimus itaq; est eorū liquor. Secūdū locū tenēt semen & folia. Sed & radix dictarū facultatū particeps est, sed non ex æquo. Valentissimus tamen omnium est Characias: deinde Myrsinites: post, qui in petris nascitur: deinceps qui Verbasco adsimilis est, & Cyparissias: deinde marinus: postremò Helioscopius.

Gal.lib.8. sim. med.

Tithyma

Tithymalus fœmina, siue Myrsinites, Myrtites, Cariytes, siue candida Lactaria.



Locus.

Dio.li.4. cap.159.

Nascitur in asperis.

Qualitates.

Vide historiam Tithymali Characiæ.

Thity

Tithymalus paralius, Tithymalis, Lactuca marina, siue, Lactuca Caprina.

Dio.li.4. cap.159.



Locus.

Nascitur in maritimis.

Qualitates.

De hoc ex Tithymalo Characia conijcito.

Tithy

Tithymalus Helioscopius.

Diosc. li. 4. ca. 159



Locus.

Circa oppida nascitur, potißimum in ruderibus.

Qualitates.

Eandem habet vim quàm cæteræ Tithymalorum genera.

Tithy

Tithymalus Cyparissias, siue Esula minor: Arabibus, Scebram minus.



Locus.

Nascitur vbique ferè circa oppida, & secus vias.

Qualitates.

Huius pro omni Tithymalo inualuit vsus: ex alijs ergo de hoc conijcito.

Tithymalus Dendroides.



Locus.

Bio.lib.4. cap. 159.

Nascitur in petris.

Qualitates.

Imbecillior est cæteris Tithymalis, quanquam sit eiusdem facultatis.

Pytiu

Pytiusa, siue Esula maior: Græcis, πιτύουσα: Arabibus, Scebram maius, Alsebram maius, Mehezeheregi, siue Phthias: Italis, Esula maggiore: Gallis, Turbit noir.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Montibus, maximéque in Gargano Monte Apuliæ,

Qualitates.

Species est Tithymalorum, quòd succum habeat vt illi, quódque similiter illis purget, cateráque omnia viribus illis sit adsimilis. Gale. li..8 simp medica.

Lathyris, siue Cataputia minor: Græcis, λάθυρις: Arabibus, Mendana: seu Mahendane: Italis, Cacapuzza, seu Cataputia minore: Germanis, Springkraut, Spring koerner, seu Tereib koerner: Hispanis, Tartago: Gallis, Espurge.

Locus ex Fuchsio.



Nascitur vbique in hortis, locisque cultis & sabulosis gaudet.

Qualitates.

Gale. li. 7. simp. medica.

Succum habet vt Tithymalis, eodémque modo purgat totáque illis facultate similis est: nisi quòd semen gustantibus videatur dulce, quod sanè etiam maximè purgatoriam vim obtinet.

Peplus

Peplus, siue Esula rotunda: Græcis, πέπλος: Gallis, Reueille matin des vignes.



Locus.

Nascitur inter vites, & in hortis.

Dio. li. 4. cap. 162.

Qualitates.

Succum habet similem Tithymalis, cùm in alijs, tum quia purgat ceu alij.

Gal. li. 8. simpl. medica.

Chamelæa, Oleaſtellum, Leo terræ, ſiue Herba viduifica: Græcis, χαμελαία: Arabibus, Mezerion, ſeu Alemezerion: Germanis, Zylandt: Gallis, Boys Gentil.



Locus ex Matthiolo.

Naſcitur in montibus.

Qualitates.

Gale. li. 8. ſimpl. medica.

Vincentem habet qualitatem amaram: proinde ſordida admodũ vlcera, & quæ maximas habent cruſtas, cũ melle purgare poteſt.

Thy

Thymelæa, Piper Montanum, ſeu Leo terræ: Arabibus, Mezereon.



Locus.

Naſcitur in montibus & aſperis:

Qualitates ex Dioſc.

Semen per inferna, bilem, pituitam, aquã ſque detrahit, ſi viginti granorum pars interna bibatur. Verùm fauces adurit: proinde temperandum eſt, & adhibenda hic cautio. Vide Meſuen in Mezerio.

Dio. li. 4. cap. 167.

Sambucus: Græcis, ἀκτῆ: Arabibus, Iafa-cti: Italis, Sambuco: Germanis, Holder, seu Holler, Hispanis, Sabugo, & Caninero: Gallis, Sureau, Suseau, Suyer, aut Seu.



Locus ex Fuchsio.

Nascitur in opacis, & asperis: gaudétque fluuiorum ripis.

Qualitates.

Vtraque Sambucus desiccandi, conglutinandi, modicéque digerendi facultatem obtinent.

Ebu

Ebulus: Græcis, χαμαιάκτη: Arabibus, Chameactis: Italis, Ebulo: Germanis, Attich, ſeu Niderel holdel: Hiſpanis, Hiezguſo, aut Sabugo pequegno: Gallis, Yeble.



Locus, Qualitates.

Eiſdem locis gaudet quibus Sambucus, eaſdémque vires habet.

Apios, ſeu Iſchas, Latinis & Græcis.



Locus.

Naſcitur in montibus. E Creta tamen & Apulia adfertur ad nos.

Qualitates ex Theophraſto.

Theoph. de natu. plāt. li. 9. cap. 10.

Datur ad expurgandum corpus: quòd altera radicis parte ſuperius, altera inferius purget.

Colocynthis, ſiue, Cucurbita ſylueſtris: Græcis, κολοκυνθις: Arabibus, Chandel, Handel, ſeu Handal: Italis, & Hiſpanis, Coloquintida: Germanis, Coloquint, & Vvilder Kurbſz: Gallis, Coloquinte, aut Courge ſauuage.

Locus ex Fuchſio.



Seritur ſemine, in hortis.

Qualitates.

Colocynthis guſtu amara eſt: ſed quæ amariſsimo medicamento epoto adſunt opera, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem, quam validam in ſeſe continet: nimirum cum iis quæ expurgat, antè & ipſa per aluum excerni præuertens. Viridis ipſius ſuccus intritus Iſchiadicis prodeſt.

Gal.li.6. ſimpl.medica.

Epithy

Epithymum, Latinis, & Græcis: Arabibus, Epitimo, & Efichemo: Italis, Epitimo: Hiſpanis, Cabellos, & flores de Thomillo: Gallis, Epitimum, ſeu Teigne de Thym.

Locus.

Dio.li.4. cap. 172.



Flos eſt adnaſcens Thymo, ſeu Podagra Thymi eſt.

Qualitates.

Gale.li.6. ſimp.me.

Epithymum Thymi facultatem habet: ad omnia tamen efficacius eſt: deſiccat enim & excalfacit ordine tertio.

Caſſutha

Caſſutha, Caſſy tha, Cuſcuta, ſiue Podagra Lini: Italis, Cuſcuta: Germanis, Flachs ſeiden: Gallis: Couche m'icy.



Locus.

In frutices & herbas Epithymi modo proſilit: viuitq́ earum adminiculo fulta, nulla radice nixa: ſed velut ab alarum ſinu prodeuntibus cirris, capillamentiſue longiſsimis.

Qualitates, ex Matthiolo.

Eadem illi ineſt facultas, quæ & plantis in quibus naſcitur. Excalfacit tamen ordine primo, ſiccátque ſecundo. Abſtergit, & quadam cum adſtrictione corroborat. Conſule Matthiolum ſuper eius viribus.

Alypum

Alypum, siue Alypia, Latinis & Græcis, Gallis, Turbit blanc.



Locus.

Gignitur in maritimis.

Dio. li. 4. cap. 173. Aegin. libro 7.

Qualitates, ex Paulo.

Alypi semen inferius purgat bilem, pari Epithymo mensura, cum sale, & aceto: intestina verò leuiter exulcerat. Cæterum ad nos sola adfertur radix, quæ vicem Turpeti albi supplet.

Vitis

Vitis ſylueſtris, Atragena Theophraſto: Græcis, ἄμπελος ἀγρία: Italis, Vite ſaluatica: Gallis, Vigne ſauuage, aut Tam.



Locus.

Naſcitur in Dumetis, Sepibus, & montibus ſyluoſis.

Qualitates.

Racemi extergendi vim habent: ſed & adſtrictionem quandam extrema germina obtinent, quæ & ſale condiri aſſolent. Galen.

Vitis

Vitis alba, Bryonia, siue Psylothrum: Græcis, ἄμπελος λευκὴ: Arabibus, Fesire, Alfesire, Fessera, siue Alfescera, Nezargiesan, aut Nezarchasen: Italis, Vite bianca, aut Zucca saluatica: Germanis, Stick vvurtz & Teufel Kirbsz: Hispanis, Nuexa, & Anorca: Gallis, Coleuurée, aut Feu ardant.

Locus ex Matthiolo.



Paßim secus vias, & propter sepes prouenit.


Qualitates.

Gale. li. 6. simpl. medica.

Prima germina adstringunt modicè cum quadam acrimonia et subamarore. Radix abstergentem, desiccantē, & tenuium partium, ac moderatè calidam vim obtinet. Corymbi depilatorij sunt.

Vitis

Vitis nigra, siue Vua Taminia: Græcis, ἄμπελος μέλαινα: Arabibus, Fesire sentanim, Fesi resim, Alfesi resim, & Faserim: Italis, Vite nera, seu Tamaro: Hispanis, Congorca: Gallis, Tam, aut Coleuurée noire.



Locus.


Nascitur in apricis.

Qualitates.

Viti albæ ad omnia similis, nisi quòd imbecillior.

Plin. li. 23 cap. 1. Gale. li. 6. simp. me.

Balſamina, Viticella, ſeu Momordica: Italis, Viticella, Caranza, Balſamina, ſeu Pomo di Ieruſalẽ: Germanis, Balſam Kraut, ſeu Mænnlin: Gallis, Merueilles.



Locus ex Matthiolo.


Nuſquam niſi ſatæ prouenit.

Vires ex Matthiolo.

Folia vulnera recentia glutinant. Oleum ramicoſis pueris efficax remedium eſt, ſi eo locus ſæpius perungatur. Vide Matthiolum.

Filix

Filix mas: Græcis, πτέρις: Arabibus, Sarax, aut Sarachs: Italis, Felce: Germanis, Vvalde farn: Hispanis, Helecho yerua: Gallis, Feugiere masle.



Locus.

Nascitur in montibus & saxosis. Dio. li. 4. cap. 178.

Qualitates.

Latum Lumbricum radix ĩterficit, quattuor drachmarum pondere ex aqua mulsa pota. Ad eundem modum sumpta, fœtum viuum necat: mortuum autem eijcit: est enim amara paulùm habens adstrictionis. Vlceribus imposita desiccat ea: non tamen mordax est. Gal. li. 8. sim. me.

Filix fœmina: Græcis, θηλυπτερὶς: Italis, Felce femina: Gallis, Feugiere femelle.



Locus.

Naſcitur vbique, ſed maximè frigido ſolo.

Pli. li. 27. cap. 9.


Qualitates.

Gale. li. 8. ſim. me.

Similem vim priori Filici ſortita eſt: quanquam & hæc ſterilitatem adferre credatur.

Filicu

Filicula, siue Polypodium : Græcis, πολυπόδιον: Arabibus, Bisberg, Aibeig, & Besfaigi : Italis, Polipodio : Germanis, Engelsuesz, Baumfarr, & Dropffavvertz: Hispanis, Filipodio : Gallis, Polipode.



Locus.

Nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibꝰ præsertim quercuum.


Dio. li. 4. ca. 180.

Qualitates.

Dulcem simul & austeram habet vincentē qualitatem: vt facultatis sit ad modum desiccantis, citra morsum tamen.

Gal. li. 8. sim. me.

Polipodium alterum.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus.

Qualitates.

Eiusdem est temperatura cuius prius.

Dryo

Dryopteris, siue Filix quercus: Græcis. Δρυόπτερις: Italis, Felce quercina: Germanis, Baum farn, seu, Eychel farn: Gallis, Fuchiere des Chesnes.



Locus.

Nascitur in veterum quercuum musco. Dios. lib. 4. ca. 181.

Qualitates.

Gustu mistam facultatē præfert, dulcem, acram, amaram: in radice verò item acerbā. Facultatem habet septicam: proinde etiam pilis glabram cutem efficit. Gale. lib. 6. simpl. medica.

Cnicus, Cnecus, Carthamus, Crocus hortensis, siue Crocus Sarracenicus: Græcis, κνίκος: Arabibus, Kartham, seu, Chartham, Italis, Saffarano Sarracinesco: Germanis, Vvilder Saffran: Hispanis, Alacor, & Semente de Papaios: Gallis, Saffran bastard.



Locus.

Seritur in hortis.

Qualitates.

Gal. li. 7. simi. me.

Cnici semine duntaxat ad purgationes vtimur. Tertij est ordinis excalfacientium, si quis foris eo vti volet.

Mercu

Mercurialis mas: Græcis, λινόζωστις: Italis, Mercorella: Germanis, Bingelkraut: Hispanis, Mercuriale, & Ortiga muerta: Gallis, Vignoble, seu Mercuriale.



Locus.

Nascitur in campestribus cultis.

Pli. li. 25. cap. 5.

Qualitates.

Mercuriali vtuntur omnes ad ventris pur gationes dũtaxat. Verũ enimuero si quis eius facere periculũ volet in Cataplasmate, sanè cã digerẽtis admodũ facultatis esse experietur.

Gal. li. 7. sim. me.

Mercurialis fœmina: Italis, Mercorella femina: Gallis, Mercuriale femelle.



Locus, Qualitates.

Eisdem natalibus gaudet eandémque facultatem obtinet quam & superior: nisi quòd hæc pota à purgatione menstrua & genitalibus admota facit vt fœminæ gignantur, superior verò masculi.

Cyno

Cynocrambe, Brassica Canina, siue Mer.curialis syluestris: Græcis, κυνοκράμβη: Italis Mercorella bastarda: Germanis, Vvild bingel kraut: Gallis, Mercuriale sauuage.



Locus ex Matthiolo.

Omnibus ferè locis prouenit, in campis, in vijs, & in vineis.

Qualitates ex Dioscoride.

Folia cũ caulibus pota, aluũ ciet. Ius decocta & pituitam, & bilem, aquámque detrahit. Dio. li. 4. cap. 184

Helio

Heliotropium maius, Officinis Verrucaria: Græcis, ἡλιοτρόπιον μέγα. tournesol

herbe au chancre

Locus.

Dioſ. lib. 4.ca.185



Naſcitur in aſperis, in campis, ſecus vias, circa ædificiorū plateas, aridis item & ſabuloſis locis.

Vires ex Dioſcoride.

Decoctum potum pituitam bilémque per aluum ex trahit. Adalligatur herba ad conceptus impediendos. Qui plura volet, conſulat Dioſcoridem.

Helio

Heliotropium minus Latinis & Græcis, Gallis, Soucy de Marais.



Locus.

Nascitur in palustribus, & iuxta Lacus. Dio. li. 4 cap. 186.

Vires ex Diosc.

Herba cum suo semine pota, adiecto nitro, hissopo, Nasturtio, & aqua, latas tineas, teretesq́ excutit. Pensiles verrucas, quæ acrochordones vocantur, cum sale illita, tollit.

Caltha,

Caltha, Calendula, siue Calthula: Italis, Fior Rancio: Germanis, Ringelbluom: Gallis, Soussy.

Locus ex Fuchsio.



Nascitur in cultis, & seritur in hortis.

Qualitates ex eodem.

Mediocriter dulcis est, & aliquatenus amara: Vnde conijcere licet illam esse calidam & siccam.

Ex Matthiolo.

Gustu est adstringenti, cum leuiuscula amaritudine. Ex quo non video quomodo mēses ciere poßit, nisi id fiat occulta quadam facultate. Siccatæ puluis, cauis dentium immissus dolorem leuat.

Scor

Scorpioides, Latinis, & Græcis.



Locus ex Matthiolo.

Rara admodum planta est.

Qualitates.

Excalfacit quidem ordine tertio, desiccat verò secundo.

Gal.lib.8. sim.med.

Ex Plinio.

Valet aduersus animal nominis sui.

Pli.li. 22. cap. 15.

Vitis

Vitis vinifera: Græcis, ἄμπελος οἰνόφορος: Arabibus, Harın, seu Karm: Italis, Vite domestica: Germanis, Vveinreb: Gallis, Vigne.

Diosc. li. 5. cap. 1.



Locus.

Nota, notissimaque.

Qualitates.

Folia refrigerant & adstringunt, idē efficiunt Capreoli. Lacryma caudicum vitis, quæ velut gummi cōcrescit, calculos pellit. Vua Omphacina frigida & sicca est: matura autem calefacit & humectat primo ordine, ex Symeone Sethi.

Historiæ Plantarum

FINIS.

SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM FACULTATES secundum locos ex Dioscoride.

AD CAPITIS DOLOREM EX FRIGIDITATE GENITUM.

IRIS *Illyrica cum aceto, & rosaceo illita.*
Oleũ sylvestris olivæ inunctũ.
Oleum amygdalinum illitum per se.
Viticis semen emplastri modo adhibitum.
Amygdalæ amaræ cum aceto vel rosaceo fronti vel temporibus illitæ.
Torpedo marina viua per se tantum admota.
Lana succida cum aceto, & rosaceo imposita.
Sisymbrium fronti, & temporibus illitum.
Hederæ corymborum, vel foliorum succus cum

aceto, & rosaceo perfusus.
Aloë temporibus, & fronti ex aceto, & rosaceo illita.
Mentha fronti per se illita.
Serpyllum coctum, adiecto rosaceo, acetóque madefactum, & appositum.
Melilotus rosaceo, aut aceto madefacta, & imposita.
Baccharis folia illita per se.
Ruta cum rosaceo, & aceto illita.
Anisum potum per se.
Sphondylium cum ruta illitum.
Peucedanum ex aceto & rosaceo illitum.
Melanthium fronti per sese illitum.
Conyza minor per se illita.
Anagyris tenera folia drachmæ pondere ex vino pota.
Rhodia radix recens cum rosacei momento imposita.
Hippoglossum pro serto capiti impositum.
Chamædaphnes folia trita, & imposita.
Elaterium ex lacte naribus infusum.
Rusci folia, & baccæ in vino pota.
Scammonia ex aceto, & rosaceo perfusa.
Aqua marina vapor operto capite receptus.

AD

AD CAPITIS DOLORES A CALIDA CAVSA EXORTOS.

Oleum ſylueſtris oliuæ inunctum.
Vnguentum roſaceum linimenti modo impoſitum.
Liguſtri flores fronti ex aceto illiti.
Roſarum aridarum ex vino maceratarum expreſſus liquor appoſitus.
Viticis ſemen appoſitum.
Portulaca per ſe impoſita.
Melilothus cum aceto, aut roſaceo aſperſa.
Nymphea radix pota, & per ſe naribus indita.
Rhodia radix cum roſaceo fronti, temporibúſque adhibita.
Papaueris liquor fronti cum roſaceo illitus.
Pſyllium ex roſaceo, acetóque, aut aqua impoſitum.
Hippogloſſi ſertum appoſitum.
Sedum maius cum roſaceo illitum.
Solani hortulani folia adhibita.
Viniferæ vitis folia, & capreoli impoſita.
Ophites lapis adalligatus.

Ad expurgandum caput.

Braſsicæ ſuccus naribus infuſus.
Anemonis ſuccus naribus infuſus.

Betæ ſuccus naribus infuſus.
Chelidonij ma. ſuccus naribus infuſus.
Cyclamini ma. ſuccus naribus infuſus.
Cepæ ſuccus naribus infuſus.
Pyrethrum diu manſum.
Staphis agria diu manſa.
Colocynthis in catapotijs deuorata.
Vua paſſa cum pipere commanducata.
Atramentum ſutoriū lanis naribus inditū.

Capitis dolores excitant.

Styracinum oleum olfactum.
Oliuæ flauæ in cibis acceptæ.
Glandes in cibis acceptæ.
Palmulæ Phæniciæ in cibis acceptæ.
Iuglandes nuces in cibis acceptæ.
Arbuti fructus deuorati.
Ferulæ caules deuorati.
Mei radices largius ſumptæ.
Abſinthij liquamentum hauſtum.

Ad veternoſos.

Viticis ſemen cum roſaceo, et aceto perfuſum.
Caſtoreum ex aceto, & roſaceo naribus infuſum.
Cæpa decocta, & in cibum ſumpta.
Sinapi deraſo capiti appoſitum.
Sphondylium ſuffitū, & ex oleo capiti illitū.
Peucedanū cum aceto, & roſaceo inunctum.

Ad ſomnum conciliandum.

Iris Illyrica pota.

Amomum

Amomum fronti illitum.
Amygdalæ amaræ deuoratæ.
Viticis ſemen potum.
Lactuca in cibum ſumpta.
Aloe illita per ſeſe, vel ex roſaceo.
Baccharis odorata.
Iunci Aethiopici ſemen potum.
Papaueris erratici quinque, ſex ve capita in vini cyathis tribus ad dimidium decocta, & potui data.
Papaueris foliorum, et vaſculorum decoctum, tum bibitum tum perfuſum.
Hyoſcyami ſemen potum, ac appiſitum.
Solani ſomnifici radicū cortex drachmæ pondere in vino potus.
Mandragoræ radicis ex vino decoctum cyathi vnius menſura potum.
Mandragoræ poma olfacta naribus.
Mandragoræ liquor ſedi pro balano ſubditus.

Somnia terribilia tumultuoſaque repreſentant.

Fabæ in cibum acceptæ.
Lentes in cibum acceptæ.
Picnocomi ſemen drachmæ pondere potum.
Smilacis leuis ſemen cum dorycnio potum ternis ſingulorum obolis.

Ad ſternutamenta cienda.

Sinapi ſemen tritum, & naribus admotum.

Ptarmicæ flores admoti.
Struthij radix trita, & admota.
Ranunculi radix ſicca, & in puluerem trita, naribus indita.
Daphnoides naribus indita.
Veratri albi radix trita & impoſita.

Ad vertiginoſos.

Balſami ſemen per ſe potum.
Peucedanum ex aceto, & roſaceo illitum.
Galbanum olfactum.
Brioniæ radix pota per continuum annum quotidie drachmæ pondere.
Vitis nigræ viticulæ primæ recentes decoctæ, & in cibis acceptæ.
Vinum Scillinum potum.
Acetum Scillinum potum.

Ad apoplexiam.

Vitis albæ radix cõtinuo anno quotidie drachmæ pondere hauſta.

Ad comitiales.

Cardamomum ex aqua potum.
Cancamum per ſe potum.
Balſami ſemen hauſtum.
Bitumen Naptha ſuffitum comitiales deprehendit.
Populi nigræ ſemen ex aceto.
Ficus ſiccæ in cibum acceptæ.

Concu

Conculæ Indicæ suffitæ excitant.
Coagulum leporinum potum.
Mustelæ ventriculus coriandro infarctus, inueteratúsque deuoratus.
Mustelæ eiusdem sanguis potus.
Asininum iecur tostum in ieiuno sumptum.
Vngula asini combusta epota.
Equorum lichenes triti, & ex aceto hausti.
Lapis in hyrundinum pullorum primæ fœturæ ventriculo inuentus pro amuleto in ceruí aluta suspensus.
Serum lactis potum quousque aluum citet.
Phocæ coagulum bibitum.
Vrsinum fel ad lingendum datum.
Testudinis fel naribus inditum.
Testudinis terrestis sanguis potus.
Ciconiæ fimum ex aqua potum.
Plātago cum lēticula decocta, in cibis sumpta.
Sinapi tritum naribus inditum.
Piper diu mansum.
Scilla hausta.
Agaricus drachmæ pondere cum oxymelite haustus.
Eryngíj radix ex dulci aqua ebibita.
Rutæ syluestris semen potum.
Seselis Massiliensis radix, & semen potum.
Peucedanum ex aceto, & rosaceo capiti inunctum.
Sagapenum potum.

Laserpitij liquor cum aceto mulso bibitus.
Ladanum olfactum:
Ammoniacum in eclegmate cum melle datũ.
Trifolij semen, & folia pota.
Conyza cum aceto bibita.
Anthyllis altera ex oxymelite pota.
Betonicæ folia hausta.
Quinquefolium triginta diebus haustum.
Papaueris Spumei Semen cum mulsa aqua potum.
Veratrum nigrum potum.
Hippophæsti succus trium obolorum pondere haustus.
Vitis alba drachmæ pondere anno toto quotidie hausta.
Vitis nigræ viticulæ primæ virentes coctæ, & in cibis sumptæ.
Acetum mulsum potum.
Vinum, & acetum Scillinum potum.
Selenites lapis tritus ebibitus.
Aetites lapis cũ cyprino vnguento, aut gleucino, vel alio excalfaciente illitus.
Cotes naxia pota.

Ad phrenesim.

Vnguentum crocinum perfusum, aut naribus admotum, vel illitum.
Vitex cum aceto, & oleo instillatus.
Asparagus in vino albo potus.

Serpillum

Serpillum cum aceto & rosaceo impositum.
Sphondylium suffitum impositum, et capiti ex oleo inunctum.
Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.

Ad cerebri inflammationes, quas syriasin vocant.

Cucurbitæ ramenta sincipiti apposita.
Peponis ramenta sincipiti adhibita.
Heliotropij folia fronti adhibita.
Acetum fronti illitum.

Ad melancholiam.

Ocimi semen potum.
Veratrum nigrum potum.
Betonicæ folia pota.
Epithymum potum.

Ad crapulam & ebrietatem arcendam.

Crocum ex passo præsumptum.
Punicorum malorum succus haustus.
Myrti baccarum succus haustus.
Braßica summo cibo sumpta.
Absinthium præsumptum.

Ad capitis defluxiones.

Vnguentum irinum naribus illitum.
Styrax illita suffitáque.
Bitumen naphtha suffitum.
Cinnamomum potum.

Mei radices tritæ cum melle in eclegmate deuoratæ, vbi fluxio pectus afficiat.
Nuces auellanæ tostæ, & cum exiguo piperis potæ.
Dracunculi maioris radix tosta, vel elixa deuorata.
Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.
Hyssopum cum fico, ruta, melléque ex aqua decoctum potum.
Helicrysij coma trium obolorum pondere in vino diluto pota.
Hyoscyami semen oboli pondere, addito papaueris semine haustum.

Ad cerebrum roborandum.

Agallochum potum.

Ad capitis manantia vlcera.

Thus cum Nitro confricatum.
Fici & caprifici lacteus succus cum polenta appositus.
Vrina inueterata apposita.
Fœnum græcum appositum.
Cicer adhibitum.
Maluæ ex vrina humana emplastrata.
Allij cinis ex melle inunctus.
Cyclamini decoctum fomenti modo adhibitū.
Bulbi cum cremato Nitro adhibiti.
Melilotus ex aqua cum creta chia, vinóque, aut galla inuncta.

Rubi folia imposita.
Lilij cremata radix ex melle adhibita.
Adiantum in lixiuio decoctum.
Acida muria inspersa.

NERVORVM.

Ad conuulsionem.

Iris Illyrica ex aceto pota.
Acori decoctum bibitum.
Cardamomum ex aqua potum.
Iunci odorati radicis drachma vna cum pari pondere piperis per dies aliquot data.
Costus ex vino, & absinthio exhibitus.
Balsamum ex aqua haustum.
Helenium ex melle in eclegmate exhibitum.
Vnguentum Sampsuchinum more cataplasmatis appositum.
Vnguentum Metopium illitum.
Bdellium illitum.
Iuniperi baccæ bibitæ.
Cedrides deuoratæ.
Halimi radix drachmæ pondere in aqua mulsa hausta.
Ficulneus cinis ex oleo illitus.
Erinacei terrestris caro in cibum sumpta.
Castoreum inunctum, & potum,
Serpillum potum.
Fimum caprinum cum aceto bibitum.

Dracun

Dracunculi radix tosta, & elixa deuorata cum melle.
Asphodeli radix drachmæ pondere pota.
Capparis semen potum.
Capparis cortex pariter haustus.
Argemone emplastrata.
Agaricus sumptus trium obolorum pondere cum mulso.
Rhaponticum potum.
Galbanum deglutitum.
Gentianæ radix drachmæ pondere pota.
Aristolochia rotunda bibita.
Centaurij maioris radix ex vino pota.
Spinæ albæ semen potum.
Acanthij radices potæ.
Abrotani semen cum aqua potum.
Leucacanthæ radicis ex vino decoctum exhaustum.
Origanum estum cum fico.
Eryngij radix pota cum aqua mulsa.
Pulegium cum posca potum.
Calaminthæ decoctum haustum.
Baccharis radix in aqua decocta, & pota.
Panaces herculeum linitum.
Libanotis radices cum loliacea farina emplastratæ.
Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.
Clinopodium bibitum.
Chamædryi decoctum potum.

Laser

Laser oboli pondere datum & deuoratum.
Sagapenum potum:
Galbanum deuoratum.
Betonicæ folia denarij pondere cum hydromelite data.
Xyridis radix ex passo bibita.
Symphytum ex aceto mulso bibitum.
Psyllium illitum.
Serpyllum potum, aut illitum.
Verbasci decoctum bibitum.
Bryoniæ eclegma ex melle.
Vinum scillinum haustum.
Vinum chamædryites bibitum.
Vinum tragoriganites bibitum.
Satyrij radix ex vino nigro austero bibita.
Coris ex vino pota.

Ad resolutionem neruorum.

Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.
Capparis semen, & cortex potus.
Sagapenum potum.
Rubiæ radix hausta.
Colocynthis clistere perfusa.
Vitis nigræ viticulæ primæ recentes, coctæ, comesteq́.
Vinum Scillinum haustum.

Ad tremorem.

Cerebrum leporinum tostum comestum.

Casto

Castoreum potum, & inunctum.
Braßica in cibo sumpta.
Althaeae decoctum potum.

Ad fluxiones.

Farina tritici cum Apollinaris herbae succo apposita.
Farina hordei ex aceto adhibita.

Ad aegritudines & dolores.

Oleum Sicyonium inunctum.
Oleum laurinum illitum.
Elaomeli illitum.
Vnguentum cyprinum inunctum.
Vnguentum Gleucinum inunctum.
Vnguentum Metopium inunctum.
Vnguentum Amaracinum inunctum.
Bdellium malagmati insertum.
Lixiuium ex cinere ficus ex oleo illitum.
Castoreum potum, & illitum.
Erinacei terrestris caro deuorata in cibis.
Viperinae carnes decoctae, & esui datae.
Poterij radicis decoctum potum.
Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.
Laser oboli pondere deuoratum.
Centaurium minus ebibitum.
Lilij radix maßata, melléque excepta imposita.
Satyrij radix ex vino nigro austero pota.
Althaeae radix per se, vel decocta in vino, aut aqua mulsa emplastri modo imposita.

Coccum infectorium cum aceto illitum præcisos iuuat neruos.
Senecij folia ad eadem præstant illita.
Narcissi radix illita, ad eadem vtiliter imponitur.
Hippophæsti succus trium obolorum pondere potus.
Aqua marina perfusa.
Acetum Scyllinum potum.
Vinum de stœchade haustum.
Vinum de thymo potum.
Sesamum illitum crassitiem iuuat.

Ad Neruorum vulnera.

Cochleæ terrestres tusæ, & impositæ.
Terreni vermes tusi, & illiti.
Butyrum illitum.
Senecionis folia emplastri modo imposita cum thuris manna.
Dracunculi minoris folia illita.
Poterij radix tusa, & imposita.
Lilij radix ex melle subacta, & illita.
Coccum infectorium cum aceto illitum.
Narcissi radix illita.

Ad Neruorum crassitiem.

Sesamum emplastri modo impositum.
Sarmentitius cinis cum axungia, vel oleo illitus.

OCVLORVM.

Ad Palpebrarum pilorum defluuium.

Nardi Indicæ decoctum fotu adhibitum.
Cochleæ terrestres acu traijciuntur vt effluat humor, quo postea palpebræ illiniuntur.
Oesipus illitus.
Condrillæ gummi, ac pariter lac impositum.
Lapis armenius illitus.

Ad Palpebrarum oculorúmque scabritiem.

Thuris cortex tostus, & appositus.
Picis fuligo illita.
Licium appositum.
Sepiæ os leuigatum & illitum.
Fel Marini Scorpionis illitum.
Fel Marinæ Testudinis illitum.
Fel Perdicis illitum.
Fel Aquilæ illitum.
Fel Gallinæ albæ illitum.
Fel Syluestris Capræ illitum.
Sinapi tritum ex melle inunctum.
Omphacium impositum.
Squama æris illita.
Rubigo ferri illita.
Chalcitis inuncta.
Hæmatites lapis melle exceptus adhibitus.

Ad Palpebrarum inflammationes.

Amaraci folia cum polenta illita.
Alsine cum polenta imposita.
Ricini folia cum polenta trita & emplastri modo adhibita.

Ad Minuendam palpebrarum crassitiem.

Mitulorum cinis plumbi modo lotus & illitus.
Conchulæ Indicæ cinis inunctus.

Ad Palpebrarum scabiem.

Cæpæ succus cum paris Spodio impositus.
Aloë illita.
Fici lac inunctum.

Ad Oculorum albugines.

Opobalsamum illitum, instillatúmque.
Cancamum vino maceratum, & impositum.
Myrrha illita.
Bitumen naphtha impositum.
Mitulorũ cinis plumbi modo lotus & illitus.
Conchulæ Indicæ cinis oculis inditus.
Cochlearum putaminum cinis melle exceptus linitus.
Marini Scorpionis fel instillatum.
Idémq; præstat fel testudinis, perdicis, aquilæ gallinæ albæ, & syluestris capræ.
Vrina humana æreo vase decocta illita.
Lactucæ syluestris lacteus succus instillatus.

Dracunculi succus immissus.
Caparum succus perfusus.
Gingiber illitus.
Chamæsyces succus cum melle inunctus.
Argemones folia imposita.
Ammoniacum impositum.
Horminum ex melle impositum.
Loti domestici succus ex melle illitus.
Sal impositum.
Salis flos eodem modo adhibitus.
Sapphyrus lapis appositus.
Aeris Squama imposita.

Ad Oculorum cicatrices delendas.

Cancamum vino maceratum & infusum.
Myrrha illita.
Bitumen naphtha instillatum.
Cedria illita.
Cochlearum terrestrium cinis cum melle impositus.
Vrina humana æreo vase decocta, infusa.
Fœni græci oleum cum myrteo impositum.
Sagapenum inditum.
Chamæsyces succus cum melle illitus.
Aerugo immissa.
Vini fæx adusta imposita.
Corallium tritum inditum.
Hæmatites lapis immissus.
Sapphyrus lapis adhibitus.

Cochlea

Cochleæ terrestres cum suo putamine vstæ, & ex melle impositæ.

Ad oculorum nubeculas.

Acori succus instillatus.

Casia alijs medicamentis ocularibus excepta, & iniecta.

Cinnamomum impositum.

Cerasi gummi inditum.

Acacalis dilutum ad collyria additur, quæ oculis claritatem faciunt.

Acaciæ succus elotus, & infusus.

Punicorum malorum cytini tres quantumuis minimi deuorati integro anno, ab omni lippitudine præseruant.

Thus immissum.

Crocomagma illitum.

Ebeni tenuißima ramenta vino optimo macerata, & in collyria addita.

Lycium inditum.

Cedria inuncta.

Pruni arboris gummi illitum.

Viperæ caro decocta, & in cibis desumpta.

Hirundines ficedularum modo in cibis deuoratæ.

Cinis hirundinum collyrijs adhibitus.

Adeps piscium inunctus.

Fœniculi succus infusus.

Fel Marini Scorpionis infusum.

Fel Marinæ Testudinis infusum.

Fel Perdicis infusum.
Fel Aquilæ infusum.
Fel Gallinæ albæ infusum.
Fel Syluestris Capræ infusum.
Vrina humana æreo vase decocta instillata.
Lactucæ syluestris lacteus succus illitus.
Dracunculi ma. rad. succus inunctus.
Cæparum succus inditus.
Loti domestici succus infusus.
Hirundinariæ ma. succus æreo vase cum melle decoctus inunctus.
Othonnæ succus instillatus.
Centaurij minoris succus impositus.
Ruta in cibis sumpta.
Omphacium instillatum.
Panaces Herac. inunctum.
Libanotis foliorum, & radicis succus infusus cum melle.
Laser ex melle inunctus.
Apiastri succus cum melle inditus.
Marrubij succus ex melle illitus.
Pumex indita.
Salis flos immissus.
Vini fæx cremata imposita.
Pyrites lapis inditus.
Thyites lapis impositus.
Geodes lapis impositus.
Sapphyrus lapis impositus.

Ad

Ad oculorum vngulas.

Sepiæ piſcis os tritum & impoſitum.
Glycyrrhizæ radicis puluis inſperſus.

Ad oculorum ictus, & recentia vulnera.

Lac humanum cum thure iniectum.
Sanguis Palumbi illitus:
Sanguis Columbæ illitus.
Sanguis Turturis illitus.
Sanguis Perdicis illitus.
Stœbis folia emplaſtri modo impoſita.
Hæmatites lapis cum lacte iniectus.

Ad oculorum vlcera.

Fuligo Thuris illita.
Fuligo Terebinthinæ illita.
Fuligo Butyri illita.
Thuris cortex impoſitus.
Myrrha iniecta.
Cornu ceruinum vſtum impoſitum lotum.
Amylum linitum, & peculiariter cauis vlceribus.
Stimmi iniectum.
Lapis Galactites cum lacte infuſus.
Lapis Sapphyrus cum lacte infuſus.
Lapis Samius cum lacte infuſus.

Ad eroſos oculorum angulor.

Oeſypum inunctum.

Omphacium illitum.

Ad oculorum sinus & ægilopas.

Iuglandium veterum nuclei triti, & illiti.
Myrti decoctum infusum.
Malua cruda commanducata cum exiguo sale adhibita.
Plantago emplastri modo imposita.
Auricula muris altera illita.
Baccharis folia emplastri modo in principio indita.
Anthemis illita.
Solani hortulani concisa folia imposita.
Eiusdem succus cum rubenti gallinarum fimo illitus.
Aegilops adhibita.
Oenanthes. v. labruscæ flos impositus.
Cadmia illita.
Aeris squama indita.
Stimmi inditum.

Ad procidentes oculos, & vuas.

Fabarum farina cum rosis, ouorum albo, & thure emplastri modo imposita.
Rubi folia trita, & imposita.
Sapphyrus lapis adhibitus.

Ad oculorum inflammationes.

Amomum ex vua passa illitum.

Fuligo

Fuligo Thuris illita.
Fuligo Picis illita.
Cupressi pilulæ cum polenta illitæ.
Myrti baccæ cum polline polentæ im ... itæ.
Cotoneorum malorum flores emplastri modo.
Caseus illitus.
Saccharum infusum.
Sesamæ herba ex vino decocta, & imposita.
Portulaca cum polenta illita.
Intybus per se, & cum polenta adhibita.
Cucurbitæ ramenta imposita.
Anemones radix illita.
Auricula muris cum polenta emplastri modo adhibita.
Gentianæ succus inunctus.
Abrotanum cum cydonio malo decoctum, aut pane, & emplastri modo adhibitum.
Melilotus cataplasmatis addita.
Baccharis folia illita.
Sedi maioris folia imposita.
Apium cum pane, aut polenta impositum.
Rubi Idei flos ex melle inunctus.
Elatinæ folia cum polenta imposita.
Papaueris liquor cum tosto oui vitello, & croco impositus.
Hyosciami semen, & folia cum farina, polentáve imposita.
Mandragoræ folia recentia cum polenta adhibita.

Verbaſci aureum florẽ ferentis folia impoſita.
Aſter Atticus illitus.
Violæ purpureæ folia illita.
Ricini folia cum polenta impoſita.

Ad oculorum dolores.

Oui vitellus toſtus addito roſaceo, & croco illitus.
Seſamæ herba in vino decocta illita.
Ocimi ſuccus infuſus.
Abſinthium ex paſſo decoctum adhibitum.
Ruta cum polenta emplaſtri modo impoſita.
Aconiti pardalianches radix permiſcetur ocularijs medicamentis, quæ doloribus oculorum auxiliantur.

Ad luſcioſos.

Iecoris Caprini emanans ſuccus dum aſſatur iniectus.
Iecoris Hyrcini emanans ſuccus dum aſſatur iniectus.
Caprinum iecur toſtum in cibis ſumptum.
Syluеſtrium caprarum fel inunctum.
Sanguis Palumbi illitus.
Sanguis Columbæ illitus.
Sanguis Turturis illitus.
Sanguis Perdicis illitus.

Ad oculorum ſuffuſiones.

Fel marini Scorpionis inditum.

Viperæ

Viperæ adeps admixto cedrino liquore, Attico melle, & vetere oleo. Gal. verò non probat.
Fel testudinis marinæ illitum.
Fel Perdicis illitum.
Fel Aquilæ illitum.
Fel Gallinæ albæ illitum.
Fel Capræ syluestris illitum.
Fabarum farina vino macerata, & illita.
Cæparum succus instillatus.
Cyclamini succus infusus.
Segapenum impositum.
Euphorbium impositum, cum cautela tamen.

Ad oculorum hebetudinem.

Cancamum ex vino maceratum infusum.
Populi albæ pilulæ, quæ primo foliorum exortu exiliunt ex melle illitæ.
Marini Scorpionis fel inunctum.
Braßica in cibo sumpta.
Sinapi cum melle inunctum.
Anagallidis succus naribus exceptus.
Absinthium cum melle impositum.
Thymus in cibo sumptus.
Thymbra obsonijs addita.
Rutæ succus in malicorio feruefactus, addito fœniculi succo & melle infusus.
Rutæ syluestris succus cum vino melle, gallinaceorum felle, & fœniculi succo iniectus.

Solani somnifici succus inunctus.
Flos salis inditus.

Ad oculorum fluxiones cohibendas.

Crocum illitum cum humano lacte.
Thus ex oui vitello impositũ, vel eiusdem albo.
Thuris fuligo imposita.
Picis fuligo illita.
Platani tenerrima folia in vino decocta & illita.
Ebeni ramenta tenuißimè trita indita.
Oleæ syluestris foliorum succus iniectus.
Cornu ceruinum vstum, lotum, & iniectum.
Butyri fuligo illita.
Amylum impositum.
Pompholis elota iniecta.
Fabæ sine cortice commanducatæ, & fronti impositæ.
Ocimi aquatici semen duarum drachmarum pondere ex quatuor mellis cyathis temperatum, inunctum.
Elatinæ folia cum polenta imposita.
Squama æris elota iniecta.
Plumbum elotum iniectum.
Galactites Lapis cum lacte iniectus.
Morocththus Lapis cum lacte iniectus.
Samius Lapis cum lacte iniectus.
Hyoscyami sem. cremor expressus infusus.
Sarcocolla infusa.

Alumen

Alumen impositum.
Corallium iniectum.
Pumex impositus.
Hæmatites lapis iniectus.

Ad oculorum lippitudines.

Portulaca, & eius succus impositus.
Plantaginis succus infusus.
Sedi maioris folia illita.
Chalcitis inditus, cum cautela tamen.
Spongiarum crematarum cinis illitus, & præsertim in arida lippitudine.
Hæmatites lapis tritus, cum lacte iniectus.

Ad oculorum caligines.

Chamædrys trita inspersa, aut ex oleo inũcta.
Loti domestici succus cum melle impositus.
Veratrũ nigrũ in ocularibus collyrijs additũ.
Flos æris inditus.

AVRIVM.

Ad aurium dolores.

Lauri baccarum succus vino vetere, & rosaceo exceptus instillatus.
Populneorum foliorum succus infusus.
Ladanum ex vino illitum.
Rosarum aridarũ decoctũ ex vino infusum.
Salicis foliorum, & corticis succus cum rosaceo in malicorio feruefactus illitus.

Malo

Malorum acidorum punicorum ſuccus cum melle coctus infuſus.

Opium cum amygdalino oleo, croco myrrhaq́; iniectum.

Anguium ſenecta in vino decocta inſtillata,

Millepedæ, ſiue oniſci conciſi, & cum roſaceo in malicorio calefacti infuſi.

Vulpini pulmonis adeps inſtillatus.

Vermes terreni cū anſerino adipe elici inditi.

Anſerinus adeps inſtillatus.

Gallinaceus adeps inſtillatus.

Vulpinus adeps inſtillatus.

Vrina Tauri cum myrrha cocta inſtillata.

Vrina Apri cum myrrha cocta inſtillata.

Mel cum trito foſsili ſale infuſum.

Seſami ſemen ex roſaceo iniectum.

Betæ ſuccus inditus.

Plantaginis ſuccus immiſſus in calida materia.

Cucurbitæ ramentorum ſuccus cum roſaceo infuſus.

Dracunculi vtriuſq; ſuccus inſtillatus.

Porri ſuccus cū aceto, thure, & lacte iniectus.

Sinapis ſuccus, vel eius decoctum inſtillatū.

Hederæ, & eius corymborum ſuccus cum oleo inditus.

Abſinthium ſuffitum, & cum melle impoſitum.

Origani virentis ſuccus cum lacte infuſus.

Mentæ ſuccus inditus.
Meliloti ſuccus cum paſſo iniectus.
Rutæ ſuccus in malicorio feruefactus infuſus.
Peucedani ſuccus cum roſaceo inditus.
Aparinæ ſuccus iniectus.
Marrubij ſuccus in roſaceo inſtillatus.
Cannabis domeſticæ ſuccus impoſitus.
Polygoni mari ſuccus infuſus.
Helxinæ ſuccus inditus.
Ocimi aquatici ſuccus cum ſulphure, & nitro iniectus.
Hyoſcyami ſeminis cremor inſtillatus.
Solani hortenſis ſuccus impoſitus.
Alſinæ ſuccus infuſus.
Cucumeris aſinini foliorum ſuccus inditus.
Sal cum aceto iniectum.

Ad aurium internas inflammationes.

Crocum iniectum.
Seſamum cum roſaceo impoſitum.

Ad aurium parotidas

Oeſypum impoſitum.
Caprarum montanarum fimus, vino vel aceto decoctus illitus.
Lini ſemen tritum, & emplaſtri modo impoſitum.
Fabarum farina cum melle, & fœno græco illita.

Rumex

Rumex decoctus adhibitus.
Plantago emplastri modo illita.
Irionis semen tusum decoctumq; appositum.
Hyssopum suffitu incensum, & impositum.
Viscum cum pari resinæ, ac ceræ commistum adhibitum.
Althea decocta illita.
Psyllium ex rosaceo, acetoq;, aut aqua impositum.
Solani hortulani folia cum sale illita.
Galiopsis ex aceto adhibita.
Cimolia terra imposita.

Ad purulentas aures.

Myrrha cum meconio, castoreo & glaucio iniecta.
Thus ex vino dulci infusum.
Resina Terebinthina ex melle: & oleo indita.
Resina Larigna ex melle; & oleo indita.
Resina Abiegna ex melle, & oleo indita.
Resina Picea ex melle, & oleo indita.
Lycium infusum.
Rhois decoctum iniectum.
Myrti baccarum succus instillatus.
Oleæ syluestris foliorũ succus ex vino infusus.
Taurinum fel cum caprillo, humanóve lacte instillatum.
Vrina infusa.
Vmbilicus Veneris cum medulla ceruina iniectus.

Aspho

Aſphodeli radicum ſuccus per ſe, & additis thure, melle, vino, & myrrha inſtillatus.
Cæpæ ſuccus impoſitus.
Abſinthium cum melle inditum.
Aniſum cum roſaceo inſtillatum.
Sphondilij florum ſuccus inſtillatus.
Polygoni ſuccus infuſus.
Stœbis decoctum iniectum.
Pſyllij ſuccus inditus.
Omphacium cum melle impoſitum.
Alumen ſanguinalis herbæ ſucco exceptum infuſum.
Flos ſalis iniectus.

Ad contuſas aures.

Bulbi cum polenta impoſiti.
Sulphur cum vino & melle illitum.

Ad exulceratas aures.

Oeſypum impoſitum,
Suillum fel inſtillatum.

Ad aurium ſurditatem.

Haſtulæ regiæ radicum ex oleo decoctum iniectum.
Cæpæ ſuccus inſtillatus.
Veratrum nigrum immiſſum, & relictum vſque in diem tertium.
Bryoniæ ſuccus cum melle inſtillatus.
Flos æris candidus per fiſtulā flatu impulſus.

Sulphur raptim per fistulam suffitum.

Ad aurium tinnitum, & incertos sonos.

Cedria infusa.
Lauri baccarum succus cum vino vetere, & rosaceo instillatus.
Ficus siccæ tritæ cum sinapi, & liquore aliquo exceptæ iniectæ.
Taurinum fel infusum.
Mel cum trito fossili sale inditum,
Porri succus cum thure, aceto, lacteq; instillatus.
Cæpæ succus impositus.
Sinapi tritum, & cum fico iniectum.
Acetum calidum suffitum per traiectorium instrumentum.

Ad vermiculosas aures.

Cedria cum aceto instillata.
Vrina humana in malicorio decocta instillata,
Capparis radicis succus iniectus.
Calaminthæ succus instillatus.
Psyllij succus inditus.
Acetum infusum.

NARIVM.

Ad sanguinis narium fluxiones.

Thus in puluerem tritum iniectum.

Cochleæ terrestres cum suo putamine tritæ, & impositæ.
Porri seminis succus cum thuris polline instillatus.
Ruta trita indita.
Vrticæ vtriusque folia cum succo imposita.
Cuminum ex aceto impositum.
Ferulæ medulla intromissa.
Lysimachia imposita.
Clymeni succus inditus.
Galiopsis flos impositus.
Equiseti succus infusus.
Acetum tum potum, tum iniectum.
Stratiotes adhibita.
Chalcitis succo porri instillata.

Ad sanguinem è Naribus eliciendum.

Crocodilij radicis decoctum bibitum.

Ad Narium Polypum.

Cupreßi pilulæ cum fico tusæ, & impositæ.
Dracunculi maioris radix imposita.
Laserpitij liquor cum chalcantho, aut rasili ærugine illitus forcipe prius exciso polypo.
Flos æris inditus.
Sandaracha cum rosaceo immissa.

Ad Narium vlcera & carcinomata.

Dracunculi maioris radix imposita.
Hederæ succus infusus.
Sandaracha cum rosaceo iniecta.

Ad Narium tedia.

Hederæ ſuccus infuſus.

Ad narium deſtillationes.

Melanthij ſemen tritum, & in linteolo colligatum, ſæpe ac ſæpius olfactum.

Ad trahendum per nares.

Capæ ſuccus infuſus.
Origani vtriuſque ſuccus iniectus cum Irino vnguento.
Cyclamini maioris ſuccus inſtillatus.

Ad cienda ſternutamenta.

Fibrorum teſticuli iniecti.
Ocymi ſemen, aut ſuccus naribus infuſa.
Sinapi tritum inditum.
Ranunculi radix ſicca, tritáque iniecta.
Ptarmicæ flores olfacti.
Struthij radix impoſita.
Veratrum album tritum iniectum.

ORIS ET LINGVAE.

Ad erodentia vlcera.

Cyperi radicis farina in os indita, etiam ſi vlcera depaſcantur, vorentque.
Aſpalathi ex vino decoctum ore collutum, ad tetra oris vlcera.
Acacia indita.
Plantaginis ſuccus in ore detentus.

Capparis in aceto decocta in collutione.
Glycyrrhizæ ſuccus in ore detentus.
Origani ſuccus in ore contentus.
Leucoij flores ex melle impoſiti.
Teſticulus ſerapias impoſitus.
Anthemis manſa.
Britannicæ ſuccus infuſus.
Tribuli ſuccus ex melle delinctus.
Rubi decoctum in ore detentum.
Quinquefolij radicis decoctum ore collutum.
Verbenaca altera ex vino affuſa.
Staphis agria cum melle indita.
Labruſcæ flos ori inſperſus.
Alumen cum melle impoſitum.
Sal cum polenta toſtum, & iniectum.

Ad oris halitum commendandum.

Reſina lentiſcina manducata.
Myrrha manſa.
Mala medica manducata.
Aniſum manſum.
Bromus cum ſiccis roſis decocta, in ore retenta

Ad linguæ ſcabritiem.

Menta confricata.
Rhois ſemen cum melle fricatum.

DENTIVM.

Ad dentes purgandos.

Cinis Purpuræ dentibus affricatus.

Cinis Buccinæ dentibus affricatus.
Cinis Mitulorum dentibus affricatus.
Cinis Conchulæ Indicæ dentibus affricatus.
Cinis cochlearum terrestrium dentibus affricatus.
Cinis Sepiæ piscis dentibus affricatus.
Cinis Ceruini cornu dentibus affricatus.
Plantaginis radicis decoctum in collutionibus.
Aristolochia rotunda confricata
Alcyonium quintum dentibus affricatum.
Pumex dentibus affricata.
Arabicus lapis dentibus affricatus.
Samius lapis dentibus affricatus.

Ad dentium dolorem.

Piceæ, & pini folia trita ex aceto decocta frequenti collutione.
Cedria dentium cauis indita.
Platani corticis ex aceto decoctum ore collutum.
Tamaricis foliorum ex vino decoctum in ore detentum.
Olei amurca in cupreo vase ad mellis crassitiem decocta ex aceto, aut vino, aut mulso colluta.
Mori corticis decoctum, aut pariter foliorum in collutionibus adhibitum.

Ficul

Ficulneum lac lana exceptum, & cauis dentibus inditum.

Anguium senecta ex aceto decocta in collutionibus.

Pastinacæ piscis aculeus in eius cauda prominens, dentibus adhibitus.

Ranarum ex aqua & aceto decoctum in collutionibus.

Lacertæ iecur cauis dentium impositum.

Vermes terreni oleo elixi, & in contrariam aurem instillati.

Rumicis decoctum in collutionibus.

Asparagi radicum decoctum in ore contentum.

Asphodeli radicum succus in contrariam aurem infusus.

Allij, tedæ, thurisque simul decoctum in ore contentum.

Ononis radicis ex posca decoctum in collutionibus.

Capparis seminis decoctum in collutionibus.

Idem præstat Capparis cortex. Quin & radix commanducata.

Lepidij (vt aiunt) radix collo suspensa.

Ranunculi radix imposita.

Anagallidis succus in contrariam narium partem infusus.

Hederæ corymborum acini quinque cum rosaceo in malicorio feruefacti in contrariam

aurem instillati.
Chamæleonis nigri decoctum in ore contentum.
Spinæ albæ decoctum in collutionibus.
Leucacanthæ radix commanducata.
Absinthij decoctum suffitum.
Hyssopi ex aceto decoctum in ore retentum.
Panaces Heracleum dentium cauis inditum.
Pyrethri decoctum ex aceto in ore acceptum.
Peucedani succus cauis dentium inditus.
Nigellæ decoctum, vnà cum teda ex aceto in ore detentum.
Laserpitij liquor cauis dentium impositus.
Galbanum illitum, & eorum cauis inditum.
Apiastri decoctum in collutionibus.
Althææ decoctum ex aceto in ore detentum.
Betonicæ decoctum ex vino, vel aceto.
Clematis prima commanducata.
Polemonij radix commanducata.
Quinquefolij radicis decoctum in ore retentũ.
Hyoscyami radicis ex aceto decoctum in collutionibus.
Solani somnifici ex vino decoctum in ore retentum.
Ephemeri radicis decoctum in collutionibus.
Verbasci decoctum collutum.
Arction ex vino decocta, & in ore detenta.
Cucumeris syluestris decoctũ in os sumptum.
Colocynthidis decoctum in collutionibus.

Staphis agriæ decoctum ex aceto in ore contentum.

Tithymali caraciæ lac dentium cauernis inditum, dente prius cera munito, ne lac in fauces incidat.

Acetum calefactum in collutionibus.

Sory dentium cauis inditum.

Ad dentes cariosos frangendos.

Cedria eorum cauitatibus indita.

Amurca olei cum omphacio recocta ad mellis crassitudinem, & imposita.

Pastinacæ piscis aculeus impositus.

Ranunculi radix iniecta eorum cauitatibus.

Chamæleonis nigri radix cauernis dentium indita.

Ad firmandos commotos dentes.

Lentisci decoctum in ore retentum.

Colymbadum muria in collutionibus adhibita.

Syluestris oleæ oleum in ore contentum.

Sory in collutionibus.

Alumen cum aceto, & melle solutum, & adhibitum.

Ad dentium torporem.

Portulaca manducata.

Ad fluidas gingiuas.

Cyperi farina imposita.

Rosarum aridarum ex vino decoctarum expressus liquor, in collutionibus impositus.
Colymbadum muria in ore contenta.
Oleum syluestris oleæ in ore detentum.
Gallæ quoquo modo adhibitæ.
Mali punici florentes cytini in decoctis macerati, & in collutionibus additi.
Prunorum foliorum decoctum in ore retentum.
Lac asininum in collutionibus.
Pulegium siccatum, crematúmque & in puluerem tritum appositum.
Rubi decoctum in ore detentum.
Staphis agriæ decoctum in collutionibus.
Omphacium cum melle impositum.
Acetum in collutionibus adhibitum.
Rubigo ferri illita.
Alumen quocunque modo adhibitum.
Sal tostum cum polenta impositum.
Alabastrites Lapis tritus impositus.
Smyris Lapis tritus impositus.

Ad Erosas putridásque gingiuas.

Cancamum impositum, nihilque eo efficacius.
Lycium attritum impositum.
Plantaginis succus in ore detentus.
Aloë ex vino, & melle illita.
Tribuli vtriusque fructus ex melle impositus.
Labruscæ florum combustorum cinis cum melle illitus.

Ace

Acetum in collutionibus.
Chalcitis trita, & imposita.
Alumen tritum, & impositum.
Pumex trita, & imposita.
Aerugo trita, & imposita.

GVTTVRIS ET GVLAE.

Ad Anginam.

Pix liquida peruncta.
Mori fructus succus in æreo vase decoctus, insolatúsque cum mellis exiguo illitus.
Multipedæ siue Oroscij ex melle inuncti.
Cinis crematarum hyrundinum ex melle more emplastri adhibitus.
Hyrundines sale inueteratæ drach. i. pondere cum aqua potæ.
Fel taurinum cum melle inunctum.
Fel testudinis illitum.
Acetum gargarizatum.
Mel gargarizatum.
Cæpæ succus inunctus.
Piper cum melle inunctum.
Absinthium cum melle, & nitro illitum.
Raphani semē ex aceto mulso gargarizatū.
Hyssopi cum fico decoctum gargarizatum.
Laserpitij liquor cum mulsa aqua gargarizatus.
Violæ purpureæ ex aqua coctæ, & potæ,

Elaterium efficacissimè illinitur cum melle, vetere oleo, aut felle taurino

Sal ex melle, oleo. & aceto illitum.

Spartij succus è ramis in aqua maceratis, & mox tusis, extractus, & illitus.

Ad Gutturis inflammationes.

Cinis crematarum hyrundinum ex melle more emplastri applicitus.

Lac gargarizatum.

Ranæ oleo elixæ ceruicis & colli abscessibus illita.

Mel illitum.

Origani virentis succus gargarizatus.

Helxine succus gargarizatus, forisque inunctus.

Vrticæ vtriusque succus gargarizatus.

Chalcitis imposita.

Alumen illitum.

Sal tostum cum melle inunctum.

Acetum gargarizatum

Aloë cum vino aut melle apposita.

Britannicæ succus illitus.

Tribuli fructus ex melle impositus.

Rubi mororum succus gargarizatus.

Ficuum siccarum decoctum gargarizatum.

Ad columellam reprimendam.

Laserpitij liquor cum melle inunctus.

Pruni foliorum ex vino decoctum gargarizatum.

Omphacium impositum.
Acetum gargarizatum.
Flos æris in puluerem subtilissimũ impositus.

Ad Gulæ destillationes.

Papaueris vasculorum decoctum ex melle in eclegmatis forma redactum, sæpiúsque linctum.
Bdellium cum ieiuna saliua dilutum, & illitum.
Verbenaca altera ex vino gargarizata.
Omphacium impositum.
Flos æris pulуerizatus, & impositus.
Alumen impositum.
Acetum gargarizatum.

Ad Faucium & Tracheæ arteriæ asperitates.

Myrrha linguæ subdita, ibique liquata.
Ptisana hordeacea gargarizata.
Amylum delinctum.
Sinapis succus gargarizatus.
Glycyrrhizæ succus linguæ subditus.
Tragacantha in eclegmate cũ melle sumpta.
Laserpitij liquor aqua dilutus in delinctu.
Symphytum petræum commanducatum.
Quinquefolij radicis decoctum gargarizatũ.
Aethiopis cum melle in eclegmate.
Lac gargarizatum.
Licium attritum, & delinctum.

PECTORIS ET PVLMONIS.

Ad cruenta ſputa & ſanguinis reiectiones.

Ouum tepidum bibitum.
Cornu ceruini cinis lotus, & ebibitus cum tragacantha.
Climenum potum.
Serpilli ſuccus drachmarum duarum pondere cum aceto potus.
Fimum caprinum tritum, in vino, aquáve potum.
Triticea farina glutinis modo elixa, in delinctu data.
Amylum potum.
Ferulæ viridis medulla pota.
Portulaca ad ſummum cocta deuorata.
Plantago quoquo modo exhibita, præſertim ſuccus.
Eiuſdem ſemen potum.
Porri ſemen drachmarum duarum pondere cum paribus myrti baccis.
Agaricus trium obolorum pondere cum aqua mulſa potus.
Rhaponticum hauſtum.
Lyſimachiæ ſuccus hauſtus, & perfuſus.
Centaurij maioris radix pota.
Spinæ albæ radix hauſta.

Arabica

Arabicæ spinæ radix pota.
Aloë cochlearium duorum pondere cum frigida aqua vel sero pota.
Polygoni maris succus potus.
Saluiæ succus in orbiculos concretus cum melle sumptus.
Symphytum petræum cum aqua potum.
Menthæ succus cum aceto potus.
Althææ decoctum potum.
Betonicæ folia trium obolorum pondere in diluta vini potione hausta.
Symphyti alterius radix pota.
Achillea hausta:
Tragi cacumina decem in vino bibita.
Personatæ radix cum pineis nucibus pota.
Isopyri semen potum.
Adiantum potum.
Tricomanes pota.
Vitis viniferæ foliorum, & capreolorum succus haustus.
Labruscæ flores poti.
Omphacium parcè potum.
Corallium haustum.
Hæmatites lapis cum mali punici succo pota.
Morochthus lapis cum mali punici succo pota.
Samia terra cum mali punici succo pota.

Ad Phtisim, seu Tabem.

Pistacia per se, aut ex melle sumpta.
Pineæ nuces per se, aut ex melle sumptæ.
Terebinthina, resina per se, vel ex melle more eclegmatis deuorata.
Pix liquida in eclegmate ex melle cyathi mensura deuorata.
Iuniperi baccæ haustæ.
Lauri baccæ tritæ cum melle vel passo, deuoratæ.
Ficus siccæ cum hyssopo feruefactæ, & potæ.
Cancri fluuiatiles elixi cum suo iure sumpti.
Lac humanum ex vbere suctum.
Ius esculentum omnium adipum datum.
Plantago in potu exhibita.
Porrum cum melle decoctum.
Agaricus drachmæ pondere sumptus cum passo.
Acanthi radices potæ.
Marrubij folia siue expressus succus potus.
Betonicæ folia cum melle data.
Myrrhis in sorbitione pota.
Asii lapidis flos ex melle delinctus.

Ad pulmonis abscessus.

Semen cyclaminis secundæ speciei quadraginta diebus potum.
Tragoriganum cum melle in eclegmate exhibitum.

Tussila

Tuſsilaginis ſiccæ, incenſæq́; fumus ore hauſtus, apoſtemata interna pectoris rumpit.

Ad ſuſpirioſos.

Lauri baccæ tritæ cum melle, vel paſſo, & exhibitæ.

Ficus ſiccæ cum hyſſopo decoctæ, & potæ.

Vulpinus pulmo exiccatus bibitus.

Ius ſenum gallorum potum.

Vinum hyſſopites bibitum.

Plantago cum lenticula decocta comeſta.

Rhaponticum bibitum.

Aqua mulſa pota.

Ariſtolochia rotunda bibita.

Centaurij maioris radix pota.

Hyſſopum decoctum cum fico, aqua, melle, rutáque potum.

Stœchas ex aqua decocta pota.

Pulegium cum melle, & aloë potum.

Scylla ex melle trium obolorum pondere delincta.

Thymi cum melle decoctum potum.

Satureia eodem modo pota.

Baccharis radicis decoctum potum.

Ruta pota.

Peucedani ſuccus in ouo ſumptus.

Nigella in vino pota.

Galbanum deglutitum.

Marrubij decoctum, ſiue expreſſus ſuccus potus.

Parth

Parthenium ex oxymelite ſumptum.
Anagyris folia cum paſſo bibita.
Periclymeni ſemen potum cum vino.
Adianti decoctum potum.
Fidicula ſiue Trichomanes hauſta.
Elaterium optima ſuſpirioſis eſt purgatio.
Thapſiæ ſuccus exhibitus.
Bryonia cum melle in eclegmate ſumpta.
Sandaracha non reſina in catapotiis data.
Sulphur in ouo ſumptum, vel ſuffitum.
Agaricum drachmæ vnius pondere datum.
Cancamum hauſtum ex aqua vel mulſo.

Ad Tuſſim.

Iris Illyrica aſſumpta.
Cardamomum ex aqua potum.
Cinnamomum deuoratum, vel potum.
Calamus odoratus ſuffitus per ſe, vel ex reſina terebinthina.
Helenij eclegma ex melle deglutitum.
Myrrha ad quantitatem fabæ deuorata.
Styrax data in eclegmate.
Bdellium datum in eclegmate.
Terebinthinæ reſinæ ex ſe, vel ex melle eclegma delinctum.
Maſtix pota.
Iuniperi baccæ bibitæ.
Cedri fructus deuorati.
Paliuri ſemen potum.

Lada

Ladanum in medicamentis, & malagmatibus insertum.

Cerasi gummi cum vino diluto exhaustum.

Amygdalæ amaræ cum melle, & lacte in illinctu datæ.

Gummi amygdalarum amararum cum vino diluto potum.

Nuces auellanæ cum aqua mulsa potæ.

Ficus siccæ deuoratæ.

Camedryi decoctum potum.

Scordium potum.

Tussilago sicca sumpta, siue incensa, accepto fumo per os.

Propolis suffita.

Mel deglutitum.

Farina tritici glutinis modo elixa, & ad lingendum cum mentha, & butyro data.

Farinæ auenæ cremor in sorbitione receptus.

Semen lini cum melle, & pipere sumptum.

Fabæ in cibis acceptæ.

Raphanus elixus manducatus, præsertim in vetere tussi.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa deuorata.

Asphodeli radix trium drachmarum pondere pota.

Allium crudum, & coctum assumptum in vetere tussi.

Irionis semen cum melle linctum.

Piper delinctu acceptum.
Scilla cum melle in eclegmate in diutinis tussibus.
Centaurij maioris radix hausta, in antiqua.
Tragacantha in eclegmate cum melle.
Hyssopum cum melle, fico, rutáque ex aqua decoctum.
Stœchas eodem modo parata.
Origanum in eclegmate cum melle linctum.
Tragoriganum eodem modo paratum.
Baccharis radicum decoctum potum, in diutina.
Panaces cum vino dulci potum.
Seselis Maßiliensis radix, & semen haustũ.
Smyrnij radix comesta.
Dauci semen potum, in diutina.
Peucedani succus in ouo sumptus.
Laserpitij liquor in sorbili ouo datus.
Marrubij decoctum, siue expressus succus bibitus.
Galbanum deglutitum, in vetere.
Sagapenum deuoratum, in diutina.
Helsinæ succus cyathi pondere bibitus in diutina.
Equiseti radix, & herba pota.
Iunci decoctum bibitum.
Papaueris vascula in aqua ad dimidium decocta, decoctóque addito melle, vt eclegma fiat ad lingendum.

Hyosciani semen potum.
Verbasci decoctum potum, in antiqua.
Cacaliæ radix vino madefacta comesta.
Bryonia cum melle in eclegmate delincta.
Vuæ passæ albæ caro exiccata deuorata.
Aqua mulsa pota.
Taphsia illita.
Vinum hyssopites bibitum.
Sandaracha suffita cum resina, accepto vapore per fistulam vel traiectorium.
Sulfur in ovo sumptum, vel suffitum.

Ad pectoris asperitates.

Glycirrhizæ succus in ore retentus quousque colliquescat.
Radix cacaliæ in vino madefacta, & delincta.

Ad vocem expediendam.

Myrrha linguæ subdita, quousque tota liquescat.
Tragacantha ex melle in delinctu adhibita.
Laser aqua dilutum, & in sorbitione sumptum.
Styrax delinctus.
Braßica commanducata.
Vinum hyssopites.

Ad Pleuretim.

Suillus adeps ex vino lotus, & cum cinere, & calce coactus impositus.

Pastinacæ erraticæ ſemen potum.
Sagapenum emplaſtri modo illitum.

Ad Lateris dolores vbi febris abſit.

Fimum caprillum cum cera, & oleo ſubactum, impoſitum.
Hordeacea farina vna cum meliloto, & papauerum vaſculis ex mulſo elixa, illita.
Braßicæ caules virides cremati, & ſuillo adipe excepti, & impoſiti.
Leucacanthæ radicis ex vino decoctum hauſtum.
Aſphodeli radix drachmæ pondere ex vino pota.
Gentianæ radicum ſuccus drachmæ pondere ſumptus.
Ariſtolochia rotunda ex aqua bibita.
Centaurij maioris radix pota.
Laſer in ſorbitionibus datum.
Galbanum illitum.
Marrubij folia ex melle adhibita.
Trifolij bituminoſi folia, ſeménve potum.
Aethiopis pota.
Acori decoctum potum.
Coſtus cum abſinthio, & vino potus.
Agallochum ex aqua potum.
Myrrha fabæ pondere deuorata.
Bdellium hauſtum.
Reſina terebinthinæ illita, appoſitáve.

Bryonia ex melleo eclegmate delincta.

Ad Pulmonis inflammationes.

Ocimum cum polenta illitum.
Vrticæ vtriusque semen cum melle delinctum.
Tragoriganum ex melle in eclegmate sumptum.
Chrysocome pota.
Aqua mulsa hausta.

Ad purulentas excreationes.

Irionis semen cum melle delinctum.
Betonicæ folia drachmarum duarum pondere in aquæ mulsæ cyathis quatuor pota.
Personatæ radix cum pineis nucibus sumpta.
Aethiopis hausta.
Vinum hyssopites.
Sandaracha ex mulso data. (Hoc medicamentum ego nunquàm probauerim.)
Sulfur in ouo potum, vel suffitum.
Vinum hyssopites bibitum.

Ad asthmaticos.

Lauri baccæ ex melle, vel passo acceptæ.
Ficus siccæ cum hyssopo feruefactæ, & potæ.
Vrina impubis pota.
Ruta epota.
Cyclamini alterius semen potum.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cum melle in eclegmate sumpta.

Aqua mulsa pota.

Spondilij semen, & herba ipsa in sorbitione.

Equiseti radix, & folia hausta.

Abrotani vtriusque semen tritum, & cum aqua potum.

Hyssopum cum fico, melle, rutáque ex aqua decoctum, potum.

Calamynthæ decoctum potum.

Vinum hyssopites haustum.

Thymi cum melle decoctum potum.

Satureia cum melle hausta.

Seselis Massiliense potum.

Fidiculæ siue Trichomanis decoctum bibitum.

Cuminum cum posca sumptum.

Smyrnij radix comesta.

Tapsia illita.

Ammoniacum bibitum.

Melisophylli folia in eclegmate delincta.

Tussilago sicca & suffita, adeò vt fumus in os ingrediatur.

Hippophæsti succus trium obolorum pondere haustus.

Botrys pota, vel in eclegmate data.

Periclymeni semen potum.

Adianti decoctum bibitum.

Ad renitentes excreationes.

Iris illyrica pota.

Coagu

Coagulum ferè omne potum.
Rhaphanus elixus deuoratus.
Porrum cum ptiſana coctum eſui datum.
Naſturtium coctum, in ſorbitione datum.
Bulbi breui coctura elixi, & in cibum ſumpti.
Ammoniacum in eclegmate datum.
Scordium potum.
Tapſia linita.
Lini ſemen in eclegmate delinctum.
Scillæ ſiccæ oboli tres ex melle in eclegmate exhibiti.
Marrubium ſiccum potum cum iridis farina.
Vinum hyſſopites hauſtum.

Ad pectoris deſtillationes.

Irionis ſemen cum melle delinctum.

Ad omnia pectoris incommoda.

Porrum cum melle decoctum comeſtum.
Glycyrrhizæ ſuccus bibitus.
Thymus melli miſtus in delinctu ſumptus.
Thymbra eodem modo parata.
Tordilij radix in eclegmate cũ melle ſumpta.
Libanotis radices potæ.
Symphytum petræum in mulſo decoctum bibitum.
Quinquefolij radicis ſuccus potus.

CORDIS.

Ad Defectum animi.

Cucumis olfactus.
Pulegium ex aceto naribus admotum.
Buglossum potum.

Ad Cardiacam.

Intybus per se & cum polenta illita.
Absinthium in passo decoctum, & appositum.
Rubi folia illita.

Ad Præcordiorum duritiem.

Rhaponticum potum.
Vinum absinthites potum.

Ad Vetustas præcordiorum Inflammationes.

Scordium cum cera coactum impositum.

MAMMARVM.

Ad Mammarum inflammationes.

Thus cum cimolia, & rosaceo inunctum.
Cydonia mala cataplasmatis adiecta, & illita.
Nuces iuglandes cum ruta, & exiguo melle imposita.
Fabarum lomentum per se, & cum polenta illitum.

Aspho

Asphodeli radices, & folia ex vino adhibita.
Irionis semen illitum.
Hemerocallis radix emplastri modo imposita.
Althaea decocta, & superposita.
Vuarum vinacei cum sale illiti.
Ostracites lapis cum melle impositus.
Geodes lapis cum aqua illitus.
Terra Samia ex rosaceo, & aqua imposita.

Ad Rigentes à partu mammas.

Tritici furfures ex rutae decocto elixi, & appositi.
Baccharis folia emplastri modo adhibita.
Epimedij folia concisa ex oleo cataplasmatis addita.
Hyoscyami semen tritum ex vino illitum.
Ricini folia imposita.
Vuarum vinacei cum sale illiti.

Ad Mammarum duritiam.

Erui farina emplastri modo imposita.
Chamaepitys prima ex melle illita.
Vuarum vinacei cum sale triti & impositi.

Ad Mammas exulceratas.

Conchulae Indicae cinis illitus.
Asclepiadis herbae radices impositae.

Ad Lac in mammis concretum.

Cerae grumi decem granorum millij magnitudine sumpti.

Fabarum lomentum per ſe, & cum polenta impoſitum.
Lentium farina illita.
Apium, & eius ſuccus illitus.

Ad Extinguendum Lac.

Cicuta impoſita mammis.

Ad Lactis Vbertatem præſtandam,

Halimi folia in cibis ſumpta.
Viticis ſemen potum.
Ptiſana hordeacea cum fœniculi ſemine cocta, & in cibum ſumpta.
Maluæ decoctum potum.
Sonchi ſuccus hauſtus.
Lactuca in cibis recepta.
Ocimum deucratum.
Eruca comeſta.
Anemone & eius caules cum ptiſana hordeacea deuorati.
Aniſum potum.
Aneti aridi ſeminis, & comæ decoctum hauſtum.
Fœniculum in cibo ſumptum.
Nigella pluribus diebus pota.
Circææ ſemen in ſorbitione potum.
Clematis prima in cibis accepta.
Echij radix in ſorbitione, vel cum vino hauſta.

Glaux

Glaux cum hordeacea farina sale, & oleo cocta, & deuorata in sorbitione.
Polygala pota.
Bryoniæ succus cum tritico coctus, in cibum sumptus (sed hic prudentia opus est.)

Ne Lac in mammis concrescat.

Menta cum polenta imposita.
Fæx vini cum aceto peruncta.

Ad Mammas cohibendas, ne nimis augeantur.

Cicuta contrita, & imposita.
Cotes naxia illita.

VENTRICVLI.

Ad Vomitiones & nauseam.

Cotoneorum malorum maceratorum liquor haustus.
Nardus Indica ex aqua pota.
Nardus Celtica ex aqua pota.
Palmulæ in cibo sumptæ.
Palmularum inuolucrum cataplasmatis conferentibus adiectum.
Gallinaceorum ventriculi interior folliculus siccus, tritusq; cum vino potus.
Succinum haustum.
Faba in posca decocta, & in cibum sumpta.
Lentis xx. grana sine cortice deuorata.

Phas

Phaselus in cibo acceptus.
Sisymbrium haustum.
Rubi folia exterius illita.
Lactuca illota deuorata.
Lens syluestris esui data.
Scilla sicca epota.
Agaricus trium drachmarum pondere per se absque liquore sumptus.
Gentianæ radicis succus cum aqua potus.
Albæ spinæ radix hausta.
Mentæ duo, trésve rami cum acidæ punicæ succo poti.
Pæoniæ semen ex vino nigro potum.
Betonica commanducata, moxq; vino aqua misto superbibito.
Vitis viniferæ foliorum, capreolorumq; succus potus.
Myrtites vinum potum.
Vini fæx illita.
Scillinum vinum potum.

Ad cœliacos.

Lycium potum, & inditum.
Cotoneæ mala cruda comesta.
Mora immatura siccata, tusaq; obsonijs immista.
Ficulnei cineris lixiuium pondere cyathi exhibitum.
Myricæ in potu data.

Galla

Gallæ cum aqua aut vino tritæ, & illitæ.
Rhois semen obsonijs inspersum.
Myrti folia trita, & ex aqua illita.
Oleæ syluestris folia cum polenta illita.
Coagulum leporinum, & equinũ trium obolorum pondere ex vino potum.
Faba in posca decocta, & deuorata.
Aegyptiæ fabæ farina, & corticis ipsius decoctum, ex mulso datum.
Oxylapathi, aut oxalidis semen in aqua, aut vino potum.
Plantago elixa in aceto, & cum sale sumpta.
Hyacinthi semen potum.
Coronopus decoctus in cibo sumptus.
Rhaponticum potum.
Spinæ albæ radix pota.
Ferulæ viridis medulla bibita.
Laserpitij liquor in vuæ acino sumptus.
Nymphææ radix siccata, & in vino bibita:
Clymeni succus potus.
Limonij herbæ semen acetabuli pondere ex vino sumptum.
Tragi herbæ acini decem ex vino bibiti.
Papaueris vasculorum decoctum ex melle in eclegmate redactum in delinctu. Si verò efficacius reddere velis, adiungito hypocistidis, & acaciæ succum.
Vuarum vinaceorum decoctum potum.

Vina

Vinaceorum nuclei in farinam polentæ modo inspersi.

Aqua vel vinum, in quibus ferrũ extinctum fuerit pota.

Morochthus lapis potus.

Vinum myrtites potum.

Adiantum ex vino bibitum.

Trichomanes ex vino pota.

Ad vomitiones ciendas.

Lauri folia pota.

Cochleæ vepribus inhærentes deuoratæ.

Peponis radix sicca drachmæ pondere ex hydromelite pota.

Bulbus vomitorius deuoratus.

Origanum cum Rhois semine, & capis in cupreo vase diebus quadraginta, dum caniculæ sydus flagrat insolatum potum.

Lemnia terra pota.

Ad ventriculi dolores.

Iuncus odoratus potus.

Bulbi comesti.

Rhaponticum bibitum.

Absinthium in passo decoctum potum.

Melilotum ex vino decoctum haustum.

Arthemisiæ tenuia folia ex oleo contusa emplastri modo imposita.

Nymp

Nymphææ radix illita.
Senecioni; caulis in passo decoctus, deuoratus vel potus.
Alabastrites lapis cum cerato impositus.

Ad ventriculi erosiones.

Nardus Indica ex aqua pota.
Nardus Celtica ex aqua pota.
Iuncus odoratus potus.
Sycomori succus potus.
Pineæ nuces deuoratæ.
Lac humanum potum.
Sonchi succus bibitus.
Pulegium cum posca sumptum.
Hieracij vtriusq; succus haustus.
Scordium duarum drachmarũ pondere cum mulsa potum.
Pæoniæ semen ex vino nigro potum.

Ad ventriculi ardores.

Portulaca cum polenta illita.
Sonchus emplastri modo impositus.
Vmbilici Veneris succus illitus.
Intybus vtraque ex aceto deuorata.
Glycyrrhizæ succus potus.
Apium ebibitum.
Fœniculum cum frigida aqua potum.
Polygonum illitum.
Solani hortulani folia apposita.

Chamædaphnes folia hausta.
Vitis viniferæ folia, & capreoli emplastri modo adhibita.
Labruscæ flos illitus.

Ad ventriculi flatus.

Mei radices ex aqua feruefactæ, vel citra coctionem tritæ potæ.
Nardi Indicæ, & Celticæ ex aqua potæ.
Castoreum bibitum.
Gallinaceorum senescentium ius potum.
Absinthium cum seseli, aut gallica nardo potum.
Ligustici semen, & radix pota.
Smyrnij semen haustum.

Ad singultum.

Sisimbrij semen in vino potum.
Rhaponticum haustum.
Aristolochia rotunda bibita.
Menthæ duo, trésve rami cum acidæ punicæ succo poti.
Anethi comæ, & seminis decoctum potum.
Cuminum erraticum cum aceto potum.
Alysson potum, siue manibus gestatum, vel naribus infusum.
Aspleni decoctum potum.
Periclimeni semen potum.
Saxifraga bibita.

Ad acid

Ad acidos ructus.

Agaricus drachmæ pondere sumptus.
Tragoriganum potum.
Betonicæ folia fabæ pondere ex despumato melle sumpta.

Ad sanguinem & lac in ventriculo concreta.

Ficulnei cineris lixiuium potum.
Coagulum Equinum trium obolorum pondere ex vino potum.
Coagulum Leporinum trium obolorum pondere ex vino potum.
Coagulum Agninum trium obolorum pondere ex vino potum.
Coagulum Hædinum trium obolorum pondere ex vino potum.
Coagulum Hinnulinum trium obolorum pondere ex vino potum.
Coagulum Vitulinum trium obolorum pondere ex vino potum.
Coagulum Bubalinum trium obolorum pondere ex vino potum.
Helichrysi coma cum mulso pota.
Laser potum.

Ad inflammationes ventriculi.

Hieracium maius & minus emplastri modo impositum.
Vitis viniferæ folia & capreoli cum polenta impositi.

Viola purpurea ex polenta illita.

Ad cibi appetentiam ciendam.

Piper comestum.
Acetum in obsonijs additum.
Absinthium potum.

Ad concoctionem adiuuandam.

Eruca in cibo comesta.
Piper omne comestum.
Gingiberis vsus.
Scylla cum melle cocta, & deuorata.
Absinthium haustum, vel ventriculo adhibitum.
Tragoriganum potum.
Pulegium potum.
Ligustici semen & radix pota.
Seselis Maßiliensis semen cum vino potum.
Carum potum.
Betonicæ folia post cœnam sumpta addito melle despumato fabæ magnitudine.
Vinum absinthites.

Ad stomachi fluxiones.

Adiantum potum cum vino.
Persici mali sicci decoctum, & bibitum.
Cotonei mali macerati liquor potus.

IECINORIS.

Ad iecinoris obstructiones.

Nardus Indica ex aqua frigida hausta.
Nardus Celtica ex aqua frigida hausta.

Lauri

Lauri cortex tribus obolis in vino odorato potus.

Piceæ folia drachmæ pondere in aqua, aut mulsa pota.

Amygdalæ amaræ cum melle, & lacte in illinctu datæ nucis auellanæ magnitudine.

Gentianæ radicis succus cum aqua potus.

Agaricum potum.

Rhaponticum exhaustum.

Eryngium ex vino assumptum.

Anthemidis decoctum potum.

Chamæpityos folia septē diebus in vino pota.

Betonica in aceto mulso drachmæ pondere bibita.

Eupatorij herba aut semen in vino potum.

Papaueris corniculati radix pota.

Rubrica Sinopica hausta.

Glycyrrhizæ succus delinctus.

Ad regium morbum.

Nardus Indica hausta.

Nardus Celtica hausta.

Ceruinum cornu vstum, ac lotum potúmque.

Millepedæ siue onisci ex vino poti.

Cicer cum roremarino decoctum comesum.

Rumicis radices in vino decoctæ & bibitæ.

Atriplicis semen bibitum cum mulsa aqua.

Asparagi radicum decoctum potum, cum ficis & ciceribus.

Crithmi, & eius radicum seminum decoctum potum.
Irio cum melle lincta.
Scilla cum melle in eclegmate pondere trium obolorum pota.
Hyrũdinariæ radix cum aniso, & vino pota.
Sphondylij semen potum.
Agaricus drachmæ pondere sumptus.
Rhaponticum haustum.
Absinthij decoctum, dilutúmve trium cyathorum pondere quotidie haustum.
Aloë drachmæ pondere pota.
Origani decoctum corpori perfusum.
Calamintha cum vino pota.
Fœniculum erraticum potum.
Libanotis radices potæ cum vino, & pipere.
Rorismarini decoctum potum.
Nigella trita cum Irino vnguento, naribus apposita.
Chelidonij radix cum aniso, & vino albo pota.
Laser cum caricis datum.
Marrubij succus naribus infusus.
Polij vtriusque decoctum bibitum.
Conyzæ folia, & flores poti.
Aspleni decoctum potum.
Lichen ex melle inunctus.
Adianti decoctum potum.
Trichomanes decoctum haustum.

Anthemides decoctum potum.
Buphthalmum potum statim à balneo.
Paeoniae radix bibita.
Hyacinthi semen cum vino potum.
Rubiae radix cum mulsa aqua bibita.
Chamepityos folia septem diebus in vino pota.
Betonicae folia cum dulci aqua pota.
Elaterium potum.
Anchusae radicis decoctum potum.
Quinquefolij succus trium cyathorum pondere aliquot diebus potus.
Osyris decoctum potum.
Chrysanthemi decoctũ balnei more adhibitũ.
Vinum Scillinum potum.
Verbenacae supinae folia drachmae pondere cum thuris obolis tribus, & vini veteris hemina vna ieiunis 40. diebus pota.
Lycij herba in aceto decocta, & bibita.
Myricae decoctum potum.
Halycacabi fructus poti.
Chamaecisi folia trium obolorum pondere senis diebus in aqua pota.
Rusci folia, & baccae in vino pota.
Vinum Scillinum haustum.
Ceruini cornu cinis potus binis ligulis.
Sulfur sorbili ouo sumptum.

Ad hydropem.

Asarum potum.

Cinnamomum ebibitum.

Calami odorati decoctum cum semine apij potum.

Erinacei terrestris caro.

Cochlearum terrestrium operimentum, & caro simul contrita tumoribus hydropicorum imposita.

Amurca in villosa pelle peruncta, & imposita.

Vrina humana suiipsius bibita.

Vrina capræ quotidie cum spica pota.

Cicer cum rore marino decoctum.

Raphanus emplastri modo impositus.

Plantago cum lenticula decocta.

Ebuli radix in vino decocta, & pota.

Allium decoctum manducatum.

Bulbi cum melle, & trito pipere emplastri modo impositi.

Scilla præparata sumpta.

Anagallidis succus vino potus.

Chamæleonis albæ radix cum vino pota.

Absinthium bibitum cum ficubus, nitro, & loliacea farina.

Adianti decoctum potum.

Trichomanes decoctum potum.

Hyssopum cum fico, nitróque emplastri modo impositum.

Fidiculæ decoctum potum.

Origanum cum fico decoctum.

Sampsuchi decoctum potum.

Ruta cum fico emplastrata & eius decoctum ex vino tum potum, tum corpori perfusum.
Pastinacæ erraticæ semen potum.
Anisum potum.
Smyrnij semen potum.
Laserpitij liquor cum caricis datus.
Chamedrij decoctum potum.
Polij vtriusque decoctum bibitum.
Androsaces in vino pota duarum drachmarum pondere.
Betonicæ folia cum aqua dulci pota.
Cucumeris asinini radicis succus sesquioboli pondere, & cortex eius acetabuli quarta parte.
Aquæ marinæ balneum.
Vitis syluestris radix in aqua feruefacta, & in vini cyathis duobus marina aqua diluti pota.
Vinum Scillinum potum.
Viticis semen potum.
Ficus siccæ in vino cum polēta, & absinthio decoctæ, & illita.
Sal.
Alcyonium tertium.
Arena è litoribus sole feruefacta capite tenus hydropicis obruta.

Ad refrigeratum iecur.

Nardus Indica ebibita.
Nardus Celtica ebibita.
Amomi decoctum potum.

Pinorum, & piceæ folia ex aqua, vel mulso pota.

Ad iecinoris dolores.

Acori decoctum potum.
Absinthij decoctum ex passo appositum.
Periclymeni semen potum cum vino.

Ad iecinoris duritiem.

Ammoniacum illitum, & ebibitum.

LIENIS.

Ad induratos lienes.

Cotonea mala cruda cataplasmatis addita & imposita.
Sycomori liquor haustus, & illitus.
Raphanus emplastri modo impositus.
Braßicæ folia cum aceto deuorata.
Chamædrij decoctum potum.
Lupinorum farina illita.

Ad lienis obstructiones.

Nardus Celtica ex vino pota.
Adiantum bibitum.
Trichomanes hausta.

Ad lienis inflammationes.

Iris Illyrica ex aceto pota.
Acorum potum.
Nardus Celtica ex vino pota.
Nardus montana ex vino hausta.

Sarmenticius cinis ex aceto rosaceo, & ruta illitus.
Myrica ex vino decoctum potum.
Viticis semen potum.

Ad lienis dolores.

Dictamnum potum, & illitum.

Ad minuendos lienes.

Iris Illyrica ex aceto pota.
Acorum potum.
Nardus Celtica ex vino bibita.
Nardus Montana ex vino bibita.
Myrica ex vino decoctum haustum.
Viticis semen potum.
Cyclamini secundæ semen quadraginta diebus haustum.
Sagapenum ebibitum.
Ammoniacum drachmæ pondere ex aceto sumptum.
Chamædrys ex aceto pota.
Nasturtium haustum.
Piperis radix illita.
Polij vtriusque decoctum cum aceto potum.
Cyclamini succus inunctus.
Capparis semen drachmarum duarum pondere quadraginta diebus ex vino bibitum.
Eiusdem radix ex vino bibita eodem pondere.
Lepidium cum belenij radice impositum.
Hederæ tenella folia ex vino decocta, vel arida ex pane coacta imposita.

Isatis Syluestris tum pota, tum illita.
Agaricum drachmæ pondere cum aceto mulso datum.
Rhaponticum potum.
Smyrnij radix comesta.
Gentianæ radix duarum drachmarum pondere pota.
Aristolochia rotunda pota.
Crocodilij radicis decoctum potum præsentaneo remedio prodest.
Hyssopum cum ficis, nitróque illitum.
Tragoriganum cum aceto potum.
Pulegium cum sale illitum.
Sison potum.
Peucedani succus haustus.
Viscum cum calce, gagatéve lapide decoctum illitum.
Teucrium cum posca potum, vel cum ficis appositum.
Leucoij radices cum aceto illita.
Nymphææ radix ex vino bibita.
Asplenii folia pota, vel eius decoctum cum aceto quadraginta diebus haustum, vel folia ipsa ex aceto illita.
Bunij semen potum.
Hæmonitis cum aceto pota.
Rubiæ semen ex aceto mulso potum.
Lonchitis alterius folia cum aceto hausta.
Betonicæ folia ex oxymelite ebibita.

Polemo

Polemonij radix ex aqua ſumpta.
Periclymeni ſemen quadraginta diebus in vino potum.
Xyridis ſemen ex aceto ſumptum.
Anchuſæ radix cum mulſa aqua pota.
Vrtica vtraque cum cerato impoſita.
Trichomanes pota.
Vini ſcillini vſus.
Glans vnguentaria cum erui farina pota ex mulſa aqua.
Bryonia trium obolorum pondere triginta diebus ex aceto hauſta, aut cum ficis illita.
Vitis nigræ viticulæ primæ recentes coctæ, ac comeſæ,
Filicis maris radix hauſta.
Aqua, vel vinum, in quibus chalybs, aut ferrum reſtinctum fuerit in potu.
Alcyonium tertium bibitum.
Corallium ex aqua bibitum.
Aſius lapis ex aceto, & viua calce illitus.
Cotis naxiæ delimata à ferro ſcobes ex aceto bibita.

INTESTINORVM.

Ad colicos affectus.

Amygdalæ amaræ illinctu adhibitæ.
Cochleæ terreſtres cum ſuo putamine tuſæ, addita pauca myrrha, ex vino bibitæ.
Alauda auis toſta in cibo ſumpta.

Suillus talus crematus ad albedinem vsque potus, vbi flatus excruciet.

Butyrum infusum, vbi colon exulceratum fuerit.

Gallinæ fimum cum aceto vel vino haustum.

Rutæ decoctum ex oleo infusum.

Petroselinum potum.

Colocynthis infusa clismatibus.

Gnici decoctum infusum.

Ad intestinorum dolores.

Iris illyrica pota.

Acori decoctum bibitum.

Mei radices tritæ cum melle in eclegmate sumptæ.

Cardamomum ex aqua potum.

Agallochum ex aqua haustum.

Nuces iuglandes cum suo putamine perustæ, & vmbilico admotæ.

Ficuum cum ruta decoctũ clysmate infusum.

Halimi folia drachmæ pondere in aqua mulsa pota.

Crocum in potionibus bibitum.

Dauci semen potum.

Libanotidis radices haustæ.

Ferulæ semen in potu sumptum.

Peucedani succus in ouo haustus.

Melissophylli decoctum clystere infusum.

Castoreum potum.

Butyrum clysmatibus infusum.

Ser

Serpyllum ebibitum.
Calaminthæ decoctum haustum.
Eryngium ad potandum datum.
Cera in sorbitionibus data.
Ammi ex vino sumptum.
Triticei furfures ex decocto rutæ elixi, & illiti.
Milium calefactum, in sacculis adhibitum.
Orobi farina aceto macerata imposita.
Sisymbrij semen in vino potum.
Piper cum lauri tenellis folijs haustum.
Scilla in eclegmate cum melle.
Rhaponticum potum.
Sampsuchi decoctum ebibitum.
Centaurij maioris radix pota.
Ruta vnà cum siccato anetho elixa in potu sumpta.
Panaces cum vino haustum.
Anethi comæ, & seminis decoctum potum.
Ligustici semen & radix pota.
Cumini decoctum cum oleo clystere infusum.
Phalangij folia, flores, ac semen haustum.
Centunculum austero vino potum.
Conyzæ folia, & flores poti.
Pæoniæ radix in vino pota.
Pseudobunium ebibitum.
Aqua marina fotu adhibita.
Chamæpitys hausta.
Graminis decoctum ebibitum.

Chamædaphnes folia in potu data.
Sal calefactum in sacculis adhibitum.
Nitrum cum cumino ex hydromelite haustū.
Seselis Maßiliensis semen ex vino potum.
Asclepiadis radices ex vino potæ.
Alisma per se, aut cum pari pondere seminis dauci haustum.
Suillus talus combustus ad albedinem vsque ebibitus.
Lini semi is decoctum per sedem infusum.
Agaricum duorum obolorum pondere sumptum.

Ad dysentericos.

Aspalathi decoctum clystere infusum.
Myrrha fabæ magnitudine deuorata.
Lentiscus ebibita.
Piceæ cortex potus.
Maceris cortex in potu sumptus.
Paliuri folia, & radix hausta.
Acutæ spinæ fructus deuorati vel epoti.
Rubi canini fructus deuoratus.
Cisti folia, & cytini in potu data.
Hypocistis hausta.
Ladanum cum vino vetere potum.
Rosarum fructus in potu sumptus.
Lycium potui datum.
Acaciæ succus haustus.
Glandium interior tenuiórque tunica decocta pota.

Casta

Castanearum interior pariter tunica ebibita.

Galla omphacitis ex vino, aut aqua trita illita, aut hausta.

Rhois foliorum decoctum clystere infusum, vel in potu acceptum.

Eiusdem semina pro sale cibis, obsonijsq́ue aspersa.

Palmæ inuolucri decoctum, tum infusum, tum bibitum.

Punicorum acidorum nuclei siccati, & ebibiti, vel in desessionibus additi.

Myrthi semen, & folia pota.

Cotonea mala comesa cruda, vel cocta, vel eorum succus potus.

Pyra tam domestica, quàm syluestria deuorata.

Mespila in cibum accepta.

Loti arboris baccæ comestæ, vel haustæ.

Corni arboris baccæ siue in edulijs, siue in defruto assumptæ.

Sorba sicca quoquo modo sumpta.

Prunorum syluestrium baccæ deuoratæ.

Siliquæ siccatæ deuoratæ.

Cochleæ terrestres suis cum putaminibus vstæ (vt Gal. inquit) esui datæ.

Siluri piscis salsamentum fomento adhibitū.

Leporinus sanguis frixus deuoratus.

Garum piscium clysmate infusum.

Ceruinum cornu potum duorum cochlearium mensura.
Cera in sorbitionibus data.
Lac ignitis iniectis calculis decoctum clystere infusum.
Leporinum coagulum trium obolorum pondere ex vino potum.
Equinum coagulum trium obolorum pondere ex vino potum.
Asparagus altilis elixus, vel assus in cibo sumptus mitigat.
Idææ radix bibita.
Althææ decoctæ succus ex vino haustus.
Alceæ radices cum vino, aut aqua pota.
Phyllitis pota.
Portulaca ad summum cocta in cibis sumpta.
Plantago per sedem infusa.
Equiseti succus potus.
Caprillus adeps cum polenta, & Rhoe datus, vel clystere infusus.
Melissophyllum bibitum.
Tragium scolopendræ similis elixum, & sumptum in cibo.
Faba in posca decocta, & comesa.
Alismatis radix cum pari pondere seminis syluestris pastinacæ bibita.
Oxylapathi aut oxalidis semen, in aqua aut vino bibitum.
Lysimachia potui data.

Tragi

Tragi cacumina x. in vino pota.
Clematis folia cum vino hausta.
Stœbis decoctum clystere infusum.
Limonij semen in vino potum.
Elatine elixa pota.
Polemonij radix ex vino sumpta.
Eupatorij semen, & folia in vino hausta.
Nymphææ siccata radix ex vino ebibita.
Sedum maius cum vino potum.
Sanguis hyrci, capræ, leporis, ceruique in sartagine frixus, in cibo sumptus.
Vitis viniferæ foliorum & capreolorum succus potus.
Vinaceorum decoctum ebibitum.
Vinaceorum nuclei in farinam polentæ modo illiti.
Vua passa alba comesa per se cũ suis nucleis.
Omphacium clystere infusum.
Vinum œnantinum potum.
Vinum Cydonites potum.
Vinum rhoites potum.
Terra lemnia ebibita.
Murta clysmatibus infusa, vbi diutina dysenteria intestina exulcerata extiterint.
Scordium duarum drachmarum pondere cũ aqua dulci potum.
Hederæ flores trium digitorum carptæ bis in die ex vino hausti.

Ad cohibendum aluum.

Coagulum leporinum potum.
Lac omne, in quo igniti calculi marini extincti fuerint.
Caseus elixus, & ab elixatione statim sepositus, móxque inassatus in cibo sumptus.
Fimus caninus ardente Syrio acceptus, & in aqua bibitus.
Panis triticeus siccus inueteratus comestus.
Hordeacea farina cum myrti baccis, aut syluestribus pyris, aut malicorio ex vino illita.
Puls ex Zea in cibum sumpta.
Puls ex Auena in cibum sumpta.
Puls ex milio in cibum sumpta.
Oryza in cibum accepta.
Lentes cum suo cortice decoctæ deuoratæ, præsertim si decoquantur ex aceto cum adstringentibus aliis.
Oxylapathi, aut oxalidis semen in vino, aut aqua potum.
Braßicæ percoctæ cibus.
Beta nigra cum sua radice, & lente decocta esui data.
Plantago ex aceto elixa, cum sale comesa, quin & eius semen ex vino potum. Præterea clysteribus infusa.
Intybus tam hortensis, quàm erratica in cibum accepta.
Condryllæ succus coctus potus.
Lens syluestris quoquo modo sumpta.

Acinos

Acinos pota.
Anisum ebibitum.
Anethum, quin etiam eius coma, & semen haustum.
Apium in cibo sumptum.
Phyllitis potui data.
Acanthi radices bibitæ.
Fœniculum erraticum potum.
Ruta in cibo vel potu sumpta.
Orchis Serapias ex vino potus.
Pæoniæ radix ex vino decocta hausta.
Althææ decoctum bibitum.
Alismatis radix pota.
Polygoni succus potus.
Clematis prima in vino bibita.
Lagopus ex vino, vel ex aqua sumpta vbi febris sit.
Xyridis radix in mulso pota.
Anchusæ folia ex vino sumpta.
Rubi ramorum decoctum potui datum.
Quinquefolij radicis decoctum bibitum.
Phœnix in vino austero hausta.
Idæa radix bibita.
Iunci, præsertim marini semen frixum, & in diluto vino potum.
Astragali radix ex vino hausta.
Hyacinthi radix ebibita.
Papaueris nigri semen ex vino haustum.
Verbasci radix, & flores potui dati.

Labruscæ flores poti.
Punicorum acidorum vinum potui datum.
Rubrica Sinopica in ouo hausta, aut clystere infusa.
Vini fæx illita.
Sedum maius ex vino haustum.
Adianti decoctum potum.
Trichomanes decoctum bibitum.
Acetum cibis incoctum.

Ad diuturnas alui fluxiones.

Sanguis Hyrcinus in sartagine frixus & comesus.
Sanguis Caprillus in sartagine frixus & comesus.
Sanguis Leporinus in sartagine frixus & comesus.
Sanguis Ceruinus in sartagine frixus & comesus.

Ad ciendam, & emolliendam aluum.

Cerusia comesa.
Melimela esui data.
Persica in cibum sumpta.
Mora matura comesta.
Ficus maturæ deuoratæ.
Marinus echinus in cibis.
Tellinarum, chamarúmque ius cum sale haustum.

Sepia

Sepia in cibo ſumpta.
Silurus piſcis in cibis.
Gobij ius bibitum.
Piſcium in vniuerſum ius per ſe, aut ex vino bibitum.
Gallinaceorum veterum ius epotum.
Lac hauſtum.
Serum lactis potum.
Caſeus recens in cibo ſumptus.
Butyrum comeſtum vel bibitum.
Medulla oßium deuorata.
Cicer in cibo ſumptum.
Rumex decoctus & in cibis ſumptus.
Blitum decoctum & in cibis ſumptum.
Malua decocta & in cibis ſumpta.
Atriplex decocta & in cibis ſumpta.
Beta candida decocta & in cibis ſumpta.
Aſparagus decocta & in cibis ſumpta.
Lactuca decocta & in cibis ſumpta.
Braßica leuiter feruefacta, eſui data.
Tragorinum potum.

Ad inteſtinorum inflationes.

Farina tritici cum hyoſcyami ſucco illita.
Farina hordei cum lini, & fœni græci ſemine impoſita.
Ocimi ſemen potum.
Rhaponticum bibitum.

Anethi comæ, & seminis decoctum potum.
Cumini decoctum cum oleo clystere infusum, vel eius semen cum polenta & hydrelæo maceratum & illitum.
Peucedani liquor in ouo ebibitus.
Anthemidis decoctum potum.

Ad latas intestinorum tineas.

Cardamomum potum.
Mali punicæ radicum decoctum bibitum.
Nuces iuglandes largius esitatæ.
Mori radicis corticum decoctum haustum.
Allium potui datum, vel comestum.
Chamæleonis albi radix acetabuli pondere, ex castorei, & origani decocto pota.
Filicis fœminæ radix trium drachmarum pondere ex melle hausta.
Melanthij semen potum, vel ex aqua vmbilico illitum.
Attramentum sutorium drachmæ pondere sumptum, vel cum melle delinctum.
Heliotropij ma.tum folia, tum semina cum hyssopo, nitro, & nasturtio pota.

Ad teretes intestinorum tineas.

Lupinorum farina cum melle lincta, vel cum aceto, pipere, & ruta pota.
Brassicæ semen potum.
Portulacæ succus potui datus. Præstat idem

& sem

& semen.

Nasturtium bibitum.

Absinthium marinum per se, vel cum oriza decoctum, cum melle sumptum.

Absinthium santonicum, vt marinum, haustum.

Hyssopum cum melle linctum.

Menta bibita.

Calaminthæ decoctum cum sale, & melle sumptum.

Thymum haustum.

Thymbra potui data.

Rutæ decoctum ex oleo bibitum.

Coriandrum cum passo sumptum.

Anchusa tertia cum hyssopo, & nasturtio pota.

Vinum absinthites potui datum.

Sedum maius ex vino haustum.

Filicis fœminæ radix drachmarum trium pondere cum vino pota. Sed qui sumunt prægustare allia debent.

Ad aluum fluentem ab expurgante medicamento.

Gallorum gallinaceorum senum ventriculus sale inueteratus, & in vmbra siccatus potus.

Ad intestinorum vulnera.

Equiseti radix, & folia cum aqua, pota.

Ad intestinorum vlcera.

Lac omne ignitis calculis calefactum, infusum.
Sapphyrus lapis bibitus.

SEDIS.

Ad sedis rimas.

Pix liquida illita.
Amurca in cupreo vase ad mellis spissitudinem decocta illita.
Viticis semen cum aqua illitum.
Cancri fluuiatiles combusti cum melle cocto illiti.
Labri Veneris radix in vino decocta, & subinde tusa imposita.
Leucoij flores cera excepti, & emplastri modo adhibiti.
Labruscæ flores illiti.
Plumbum elotum impositum.

Ad sedis vlcera.

Thus tritum cum lacte, & linamento exceptum impositum.
Punicorum acidorum succus cum melle decoctus illitus.
Oesypus impositus explet & emollit.
Plumbum elotum illitum.

Ad condylomata.

Cotonea mala cruda cataplasmatis adiecta.
Oui vitellus assatus, & ex rosaceo, & croco illitus.

Aloe

Aloe cum passo adhibita.
Anethi cremati seminis cinis illitus.
Libanotis emplastri modo imposita.
Ballotes folia in feruenti cinere cocta imposita.
Rubi folia adhibita.
Helsine imposita.
Quinquefolij radix illita.
Sermentitius cinis, quin & vinaceorum ex aceto illitus.
Rubigo ferri illita.
Plumbum elotum impositum.
Sandaracha cum rosaceo inuncta.
Suillus adeps illitus.
Crocum cataplasmatis inditum.

Ad sedis inflammationes.

Lens cum sertula campana, siccis rosis, cydonio malo, malicorio & rosaceo illita.
Sonchi succus illitus.
Melilotus cum fœni græci farina, & lini semine ex passo impositus.
Libanotis adhibita.
Althææ radix decocta illita.
Symphyti maioris radix cum folijs Senecionis cataplasmatis modo.
Senecionis flores, & folia, ex modico vino illita.

Ad induratos sedis tumores.

Pix liquida illita.

Ad procidentem ſedem.

Lentiſci ſuccus, & folia illita.
Malorum cydoniorum decoctum in deſeßionibus.
Torpedo marina appoſita.
Cyclamini ſuccus ad mellis ſpißitudinem decoctus, illitus.
Cærulei anagallidis flores appoſiti.
Aſter Atticus illitus.
Acetum illitum, & fotu adhibitum.
Acida muria in deſeßionibus.

Ad tenaſmos.

Lac ouillum, caprillum, bubulúmque ignitis calculis caleſactum, & clyſtere infuſum.
Fœni græci ſeminis decoctum infuſum.
Lini ſemen quoquo modo appoſitum.
Erui farina vino macerata illita.

Ad penſiles ſedis thymos.

Capræ ſylueſtris fel illitum.
Fimum ouillum ex aceto inunctum.
Laſer in malicorio cum aceto ferueſactum.
Acetum illitum.

Ad hæmorrhoidas ciendas.

Cæpa confricata.

Ad hæmorrhoidum defluxiones.

Aloë cum paſſo illita.

Libanotis

Libanotis emplastri modo imposita.
Rubi folia adhibita.
Palmulæ illitæ.

Ad hæmorrhoidas ſanandas.

Rhois ſemen illitum.
Palmulæ illitæ.
Ononis decoctum, vt quidam aiunt, potum.
Plumbum elotum impoſitum.
Arabicus lapis illitus.
Portulaca ad ſummum cocta impoſita.

RENVM.

Ad renum dolorem.

Cardamomum ex vino potum.
Nardum Celticum ac linitum.
Amomi decoctum bibitum.
Harundinis radix lumborum doloribus proficit cum aceto illita.
Tragacantha drachmæ pondere in paſſo diſſoluta cum aduſto, elatoq; cerui cornu, & ſciſsilis aluminis tantillo potum.
Peucedani ſuccus potus.
Vua paſſa alba in cibum ſumpta.
Alcyonium tertium potum.
Fœniculi comæ decoctum ſubditum.
Anagallis pota.
Agarici drachma pota.
Glycyrrhizæ ſuccus cum paſſo potus.

Tordilium bibitum.
Athyllis pota.
Pæoniæ radix ex vino pota.
Symphytum petræum ex aqua potum.
Anchusæ decoctum ex aqua haustum.
Vinum melitites ebibitum.

Ad renum calculos & arenulas.

Nardus Indica potui data.
Nardus Cetica potui data.
Nardus Montana potui data.
Verùm Celtica cæteris præstat.
Lauri folia pota, quin & radicis cortex qui longe potentior est, potus.
Cerasi gummi ex vino haustum.
Amygdalæ amaræ gummi ex passo sumptum.
Ononis radicis cortex cum vino potui datus.
Anisum potum.
Cumini alterius syluestris semen potum.
Artemisiæ decoctum in desessionibus adhibitum.
Chamæmeli decoctum potum, vel fotu adhibitum.
Parthenij folia hausta.
Althææ decoctum bibitum.
Alismatis decoctum potui datum.
Tribuli vtriusque fructuum succus haustus.
Rubi radix pota.

Papaueris

Papaueris corniculati radicis decoctum haustum.
Vmbilici Veneris folia cum radice pota.
Vinum absinthites bibitum.
Adiantum potui datum.
Trichomanes potui data.
Vua passa alba comesa.
Melitites Vinum aßiduè potum.
Alcyonium tertium potum.

Ad renum vlcera.

Lac omne potum.
Plantaginis radices, & folia ex passo sumpta.
Vua passa alba comesa.
Melitites Vinum aßiduè potum.

Ad renum obstructiones.

Rhaponticum haustum.
Vinum absinthites potum.
Vinum Melitites potum.

VESICAE.

Ad ciendam remorantem vrinam.

Acori decoctum potum.
Mei radices ex aqua decoctæ, vel tritæ citra coctionem, & potæ.
Nardus Indica potui data.
Nardus Celtica potui data.
Nardus Montana potui data.

Cardamomum ex vino haustum.
Asarum bibitum.
Rhus sicca pota.
Malabathrum potum.
Casia in potu hausta.
Cinnamomum potum.
Costus ebibitus.
Iuncus odoratus in potu sumptus.
Calamus odoratus cum graminis, aut apij semine sumptus.
Aspalathi decoctum haustum.
Crocum ebibitum.
Helenij radicum decoctum potui datum.
Crocomagma potum.
Pineæ nuces repurgatæ comesæ, aut cum passo, vel cucumeris semine potæ.
Lentisci decoctum haustum.
Terebinthi fructus comestus.
Resina omnis, præsertimque terebinthina hausta.
Cupressi folia ex passo, & exiguo myrrhæ pota.
Cedrides deuoratæ, vel potæ.
Lauri foliorum decoctum in desessionibus.
Albæ populi cortex vnciæ pondere haustus.
Paliuri foliorum, & radicum decoctum in potu sumptum.
Phillyreæ folia pota.
Ladanum ex vetere vino haustum.

Oleæ Aethiopicæ, ac nostratis lachryma potui data.
Glandes in potu sumptæ.
Palmæ inuolucri decoctum bibitum.
Punicæ acidæ succus potus.
Cerasi gummi haustum.
Amygdalæ amaræ lachryma bibita.
Erinaceus marinus in cibum sumptus.
Erinacei terrestris caro inueterata ex ace. mulso pota.
Vermes terreni triti, & cum passo poti.
Mel haustum.
Ptisana hordeacea deuorata.
Zythum ex hordeo paratum potum.
Cicerum decoctum potui datum.
Erui decoctum haustum.
Lupinorum radicum decoctum bibitum.
Raporum cauliculus elixus, & in cibum sumptus.
Raphanus comestus, quin & eiusdem semen potum.
Siseris radix in cibum accepta.
Asparagi breui coctura elixi, & in cibum propinati.
Sion quoquo modo sumptum.
Cucumeris semen potum.
Erucæ vtriusque semen bibitum.
Dracunculus minor haustus.

Hortensis

Hortensis smilacis siliqua cum semine elixa, & in cibum data.
Asphodeli radix pota.
Bulbus vomitorius in cibum sumptus, vel eius decoctum potum.
Porrum domesticum, & syluestre comestum.
Cepa decocta in cibum sumpta.
Allium in cibum sumptum,
Capparis fructus quadraginta diebus potus.
Anagallidis succus bibitus.
Calaminthæ decoctum potum.
Saluiæ decoctum haustum.
Crocodilij semen bibitum.
Thymi decoctum potui datum.
Thymbræ decoctum bibitum.
Serpyllum in potu sumptum.
Ruta quoquo modo sumpta.
Spinæ albæ radix pota.
Acanthi radices potæ.
Ononis radicis cortex ex vino haustus.
Eryngij radix pota.
Absinthium potui datum, vel eiusdem decoctum bibitum.
Hyssopi decoctum in potu assumptum.
Origanum haustum.
Tragorigani decoctum ebibitum.
Ruta syluestris pubi illita.
Ligustici semen, & radix pota.
Pastinacæ erraticæ semen haustum.

Cari

Cari semen potum.
Anethi coma, & seminis decoctum bibitum.
Apium crudum, coctúmve in cibum sumptum.
Petroselinum in potu haustum.
Fœniculi decoctum potum.
Nigella pluribus diebus bibita.
Polij montani decoctum potui datum.
Artemisiæ decoctum in desessionibus adhibitum.
Anthemidis decoctum haustum, vel in desessionibus additum.
Lithospermi semen ex vino albo sumptum.
Rubiæ radix pota.
Lonchitis radix ex vino sumpta.
Hypericum bibitum.
Betonicæ folia pota.
Periclymeni semen haustum, Est enim valentissimum medicamentum.
Saxifraga potui data.
Xyridis radix trium obolorum pondere bibita. Sed semini vis longè maior.
Iunci marini semen frixum, & ex diluto vino haustum.
Ageratum suffitum.
Vesicariæ siue halicacabi rubentes acini folliculis inclusi deuorati.
Solani somnifici semen potum.
Rusci folia, bacca asparagi, radicésve in vino pota.

Spartij semen deuoratum.
Vitis albæ cauliculi teneri decocti, et deuorati.
Cytisi decoctum potum.
Dauci semen haustum.
Coris semen in potu sumptum.
Equiseti succus potus.
Vmbilici Veneris folia cum radicibus manducata.
Bunij, & pseudobunij semen potui datum.
Astragali radix ex vino sumpta.
Hyacinthi radix bibita.
Vitis nigræ viticulæ primæ coctæ, comestaq́.
Chamædaphnes foliorum succus ex vino sumptus.
Vinum Cydonites potum.
Vinum Hyssopites potum.
Vinum Scillinum potum.
Vinum Absinthites potum.
Aqua mulsa in potum accepta.

Ad vrinæ angustias.

Cimices lectularij triti, & vrinariæ fistulæ impositi.
Millepedæ ex vino potæ.
Cicadæ inassatæ mansæ.
Locustæ suffitæ præsertim in fœminis.
Ceruini cornu cinis elotus binis ligulis epotus.
Maluæ decoctum in sessione adhibitum.
Portulaca in cibum sumpta.

Asper

Asparagi radicum decoctum haustum.
Crithami radix, semen, & folia ex vino decocta pota.
Sandycis decoctum potui datum.
Caucalis olerum modo in cibum sumpta.
Amaraci decoctum potum
Baccharis radicum decoctum haustum.
Ocimi semen bibitum.
Smyrnij radix pota.
Agaricum drachmæ pondere datum.
Peucedani succus potus.
Rhaponticum potum.
Phalaridis succus ex aqua, aut vino haustus.
Lotus sylvestris trita per se, aut cum malua semine ex vino, aut ex passo pota.
Chamæpitys potui data.
Chamæleonis albi radicis decoctum bibitum.
Abrotani semen tritum, & ex aqua calefactum potum.
Pastinacæ sylvestris semen potum, vel pubi illitum.
Tordilij semen in potu sumptum.
Polemonij radix ex aqua pota.
Sisonis semen haustum.
Ammi cum vino sumptum.
Petroselini semen potum.
Galbanum bibitum.
Chamædryos decoctum potui datum.

Trifolij bituminosi semen, & folia in aqua hausta.
Scordij decoctum ex vino, vel ex aqua paratum potum.
Anthyllis altera drachmarum duarum pondere bibita.
Paonia potui data.
Althaea decoctae succus ex vino potus.
Graminis radicum decoctum potui datum.
Arctij radix cum semine decocta, in potu sumpta.
Adiantum potum.
Trichomanes hausta.
Alcyonium tertium potum.
Lapis Haematites ex vino bibitus.
Lapis Morochthus ex aqua bibitus.
Lapis Iudaicus ciceris magnitudine ex aqua calida potus.
Lapis Spongiae ex vino haustus.

Ad vrinae stillicidium.

Acori decoctum potum.
Sisymbrij semen in vino bibitum.
Panaces heraclium ex vino haustum.
Seseli massiliense potui datum.
Cumini syluestris alterius semen in potu sumptum.
Olusatri radix cum semine ex mulso pota.
Polycnemum ex vino bibitum.
Clinopodium haustum.

Oenan

Oenanthes radix cum vino epota.
Conyzæ folia, & flores in potu.
Asplenι decoctum potui datum.
Cæpa cum asparagi radicibus decoctum, in potu sumptum.
Onobrychis bibita.
Polygoni succus haustus.
Saxifraga in vino decocta potui data.
Xyridis radix ex mulso pota.
Tragij liquor semen, & folia in potu sumpta.
Rusci folia, radices, baccæ bibitæ.
Lauri Alexandrinæ radix sex drachmarum pondere potui data.
Elichrysi coma ex vino hausta.

Ad vesicæ vlcera.

Myrti folia, & semen pota.
Lac omne bibitum.
Cucumeris semen ex lacte, & passo haustum.
Glycyrrhizæ succus ex passo sumptus.
Vua passa alba comesa.

Ad vesicæ vulnera.

Butyrum infusum.
Equiseti folia ex aqua pota.

Ad eiiciendos vesicæ calculos.

Oßifragi auis ventriculus paulatim in potu haustus.

Muris fimus, qui Muscerda dicitur, cum mulso, & thure potus.
Vrina apri potui data.
Rumicis radicum ex vino decoctum bibitum.
Sion crudum, coctúmve haustũ, vel comestum.
Sisymbrij semen potum.
Baccharis decoctum haustum.
Apij semen, vel radix vino bibita.
Fœniculum erraticum potum.
Sagapenum potui datum.
Adianti decoctum bibitum.
Trichemanes decoctum in potu sumptum.
Vitis vinifera lachryma in caudice concreta ex vino pota.

Ad vesicæ calculos frangendos.

Cardamomum, cum corticis radicis lauri drachma, potum.
Bdellium potum.
Cerasi arboris gummi bibitum.
Aspleni decoctum haustum.
Lithospermum ex vino albo potui datum.
Saxifraga ebibita.
Graminis decoctum haustum.
Tragij semina pota.
Rusci radices, ac bacca in potu sumpta.
Iudaicus lapis coti delimatus, ex aqua calida potus.

Lapis

Lapis ſpongiæ potui datus.

Ad vrinæ incontinentiam.

Rutæ ſyluestris ſemen frixum, & in cibis ſumptum.

Phœnix in vino auſtero bibita.

Ad veſicæ ſcabiem.

Panaces herculeum cum mulſa aqua aut vino potum.

Cepæa herba bibita.

Ad mictum grumorum ſanguinis.

Cumini ſylueſtris alterius ſemen potum.

Elichryſi coma in mulſo pota.

Ad cruentos mictus, ex fractis calculis prouenientes.

Acida muria illico clyſmate infuſa per vrinæ fiſtulam.

VIRILIVM ET PVDENDORVM.

Ad Venerem ciendam, ſtimulandámque.

Coſtus ex mulſo bibitus.

Crocum potum.

Semen lini cum melle, & pipere deuoratum.

Rapum decoctum in cibum ſumptum.

Eruca largius in cibis comeſa.

Erucæ ſemen hauſtum.

Dracunculi maioris radix toſta, vel elixa ex vino bibita.

Asphodeli radix assumpta.
Nasturtium potum, vel comestum.
Porri semen potui datum.
Bulbus decoctus manducatus.
Allium cum coriandro tritum in cibis.
Vrticæ semen ex passo potum.
Galij radix assumpta.
Mentæ succus potus.
Pastinacæ erraticæ radix comesta.
Anisum potum.
Testiculi canis radix quæ vegetior est bibita, vel comesa.
Satyrij radix esitata.
Horminum in vino potum.
Gladioli superior radix ex vino sumpta.
Scincorum renes drachmæ pondere ex vino hausti.
Lac omne haustum.

Ad augendam genituram.

Coriandrum bitum.
Omnia medicamenta quæ venerem excitant, præter ea, quæ in calore & siccitate excellunt.

Ad Venerem inhibendam.

Viticis semen potum, & folia testibus illita.
Portulaca manducata, pudendisque inuncta.
Lactucæ semen potum nocturnas veneris imaginationes arcet.

Anethi

Anethi seminis, & comæ decoctum assiduè potum.

Ruta in cibo, potúque sumpta.

Canini testiculi herbæ languida, flaccidáque radix potui data.

Cannabis satiuæ semen in cibum largius sumptum.

Gladioli inferior radix pota.

Cicuta cum sua coma trita, & genitalibus illita, & est potentissimum medicamentum.

Ad seminis profluuium.

Nymphææ radix bibita.

Iridis Illyricæ radix ex aceto pota.

Ad pudendorum vlcera.

Oesypus illitus.

Aloë illita, & in puluerem imposita.

Polygoni succus in vino decoctus cum melle adhibitus.

Alumen quocunque modo adhibitum.

Flos salis inspersus.

Ad testium inflammationes.

Cicer cum eruo decoctum appositum.

Faba in vino decocta cataplasmatis adhibita.

Senecionis folia cum floribus emplastri modo imposita.

Asphodeli radix, & folia illita.

Cimolia illita.

Melilotum emplastri modo adhibitum.

Geodes lapis illitus.

Ruta illita cum lauri folijs.
Sal cum origano & fermento illitum.
Cuminum cum passa vua, fabaq; lomento, aut cera impositum.
Coriandrum cum passa vua, & melle illitum.
Lilij concisa radix cum apollinari herba, & triticea farina cataplasmatis modo.
Samia terra ex rosaceo & aqua illita.
Hyoscyami semen tritum ex vino impositum.

Ad genitalium pruritum.

Salsua decoctum ex vino illitum.
Resina omnes, praesertimque terebinthina illita.

Ad induratos testes.

Irionis semen impositum.

Ad eos qui natura præputio carent.

Thapsiae succus circumlinitus. Tumorem enim excitat, qui deinde pinguium fotu emollitus, praeputij iacturam resarcit.
Mel triginta diebus à balneo illitum.

Ad genitalium phagedenas exulcerationes.

Taurinum fel ex melle illitum.
Labruscae flos tritus cum melle, croco, myrrha, & rosaceo impositus.

Ad genitalium thymos.

Smaridis salsae crematum caput illitum.
Fel syluestris caprae inunctum.

Fimum ouillum ex aceto impositum.
Thymus emplastri modo adhibitus.
Thymbra apposita.
Ruta cum pipere, nitróque confricata.
Tithymali characiæ lac inunctum.
Chamæsices rami triti, & impositi.
Mercurialis succus illitus.
Heliotropij semen illitum.

VTERI.

Ad vteri strangulatus.

Mei radices tritæ, & cum melle in eclegmate deuoratæ.
Iuniperi baccæ potæ.
Vngues odorati suffiti.
Cimices lectularij naribus illiti.
Bitumen olfactum, suffitum, & admotum.
Phocæ coagulum potum.
Vrina cum ligustrino oleo feruefacta infusa.
Plantaginis succus potus.
Sinapi tritum naribus illitum.
Agaricum drachmæ pondere sumptum.
Ruta trita excepta melle, pudendis & sedi illita.
Panacis herculei semen cum vino bibitum.
Seselis Maßiliensis radix, & semen potum.
Peucedanum olfactum.
Sagapenum naribus ad olfaciendum illitum.
Trifolij bituminosi semen, & folia pota.

Pæoniæ nigri ſeminis grana XV. bibita.
Aliſmatis radix pota.
Betonicæ folia drachmæ pondere in aqua dulci hauſta.
Gagates lapis ſuffitus.

Ad menſes ducendos.

Iris Illyrica ex vino ſumpa, & fotu adhibita.
Mei radicum decoctum deſeßionibus adhibitum.
Acori decoctum in ſeßionibus.
Cyperi radicum decoctum fotu adhibitum.
Aſari radices ſenis drachmis ex aqua bibitæ.
Phu decoctum potui datum.
Caſia odorata in potu ſumpta.
Cinnamomum hauſtum, vel ex myrrha ſuppoſitum.
Amomum peßis, aut ſeßionibus additum.
Coſtus ebibitus.
Odoratus iuncus potui datus.
Calamus odoratus hauſtus, & ſuppoſitꝰ fotu.
Cancamum ex aqua mulſa potum.
Helenij radicum decoctum potum.
Myrrha cum abſinthio, lupinorum cremore, vel rutæ ſucco admota.
Styrax pota, & appoſita.
Bitumen ex vino, & caſtoreo bibitum.
Cedrides ex polline piperis hauſtæ.
Lauri foliorum decoctum fotu admotum.
Phillyreæ folia potui data.

Viticis

Viticis semen drachmæ pondere ex vino haustum.
Oleæ Aethiopicæ, ac nostratis lachryma pota.
Amygdalæ amaræ admotæ.
Ficulneum lac cum detrita nuce Græca ebibitum.
Cochleæ terrestres cum suo operimento tusæ, & fœmineis locis admotæ.
Castoreum drachmarum duarum pondere haustum.
Cepæ succus pudendis illitus.
Oesypum in lana suppositum.
Anserinus, & gallinaceus adeps illitus.
Caprarum montanarum fimum ex odoramento aliquo potum.
Scandulaceum bibitum.
Seminis lini decoctum fotu admotum.
Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle suppositum.
Rhaphanus in cibum sumptus, vel eius succus haustus.
Asphodeli radix potui data.
Eryngij decoctum haustum.
Brassicæ succus ex loliacea farina suppositus, vel eiusdem decoctum bibitum.
Sium pro olere sumptum.
Crithmum, vel eius decoctum in potu sumptũ.
Centaurij maioris radix bibita, vel eiusdem succus suppositus.

Con

Condrylla gummi ex myrrha ſubditus.
Lactuca ſylueſtris lacteus ſuccus bibitus.
Porrum domeſticum, & ſylueſtre comeſtum.
Allij comarum decoctum in deſeſſionibus additum.
Cyclaminus tum pota, tum ſuppoſita.
Abrotani ſemen ex aqua hauſtum.
Capparis cortex, & ſemen potui datum.
Anemones radix ex vellere appoſita.
Hederæ Corymbi triti ſubditi.
Pulegium bibitum.
Agaricum cum oxymelite drachmæ pondere hauſtum.
Origanum potum.
Abſinthium hauſtum, vel ex melle ſubditum.
Tragoriganum potui datum.
Saluiæ decoctum potum.
Ammi ex vino hauſtum.
Thymi, thymbræq; decoctum in potu ſumptū.
Serpyllum potui datum.
Smyrnij ſemen ebibitum.
Amaraci decoctum hauſtum, vel pudendis illitum.
Baccharis radicis decoctum potum.
Ruta vtraque tum pota, tum ſubdita.
Panaces Herculeum ex vino hauſtum.
Liguſtici radix & ſemen potum, & illitum.
Paſtinacæ erraticæ ſemen potum.
Seſelis Maßilienſis radix, & ſemen hauſtum.

Tor

Tordilium potui datum.
Fœniculum ex vino sumptum.
Sison bibitum.
Libanotis radices potæ,
Peucedani succus potus.
Petroselinum potui datum.
Daucum haustum.
Hammoniacum in potu sumptum.
Nigella pluribus diebus hausta.
Sagapenum potum.
Laserpitij liquor cũ pipere, & myrrha bibit⁹.
Galbanum suppositum, & suffitum.
Clinopodium haustum.
Chamædryos decoctum potui datum.
Lilij cremata radix ex rosaceo subdita.
Melissophylli decoctum in desessionibus.
Trifolij semen, & folia pota.
Polij vtriusque decoctum haustum.
Scordij succus bibitus, vel herba ipsa subdita.
Artemisiæ decoctum sessionibus additum.
Myrrhis bibita.
Conyzæ folia, & flores poti.
Hemerocallis radix cum vellere subdita.
Rusci folia, & baccæ ex vino sumpta.
Leucoij decoctum fotũ, & sessionibus admotũ.
Eiusdem semen duarum drachmarum pondere ex vino sumptum.
Anthemidis decoctum tum potum, tum fotu adhibitum.

Pæonia

Pæoniæ radix amygdalæ quantitate hausta.
Rubiæ radix supposita.
Adianti decoctum bibitum.
Trichomanes potui data.
Anagyris trita folia ex passo sumpta.
Hypericum tam bibitum, quàm suppositum.
Coris semen potui datum.
Vrticæ vtriusque folia trita, & cum myrrha subdita.
Betonicæ folia drachmæ pondere cum vino sumpta.
Medij semen haustum.
Chamædaphnes foliorũ succus ex vino bibit⁹.
Gladioli superior radix supposita.
Tragij liquor bibitus, quin etiam semen, & folia pota drachmæ pondere.
Chrysocome ex mellicrato sumpta.
Elaterium in pesso subditum.
Helichrysi coma ex mulso potui data.
Mãdragoræ liquor semioboli põdere subditus.
Eiusdem semen bibitum.
Daphnoides hausta.
Veratrum Nigrum suppositum.
Veratrum Album suppositum.
Vitis nigræ tenellæ viticulæ in cibum sumptæ, decoctæ olerum, vel asparagorum more.
Heliotropij folia supposita.
Vinum scillinum bibitum.
Vinum absinthites haustum.

Vinum

Vinum hyſſopites potum.

Ad menſes cohihendos.

Nardus Indica.

Muſcus arboribus innaſcens in ſeßionibus additum.

Thuris cortex in peſſo ſubditus.

Oxyacanthæ baccæ in potu, vel in cibo ſumptæ.

Hypociſtis tum pota, tum indita.

Oleæ ſyluestris ſuccus pudendis admotus.

Rhois ſemen potum alba profluuia ſiſtit.

Palmulæ immaturæ manducatæ.

Palmularum inuolucrum potui datum.

Punicorum acinorum nuclei ſiccati in ſole, & obſoniis inſperſi, concoctiue ſumpti.

Gallæ in decoctis additæ ad īſeßiones paratis.

Glandium tenuior cortex tum bibitus, tum in paſſo ſuppoſitus.

Myrti ſemen fotu ſubditum, vel deſeßionibus additum.

Cotoneorum malorum decoctum fotu adhibitum.

Acacia tum pota, tum indita.

Lycium ſubditum.

Loti ligni decoctum hauſtū, aut fotu admotū.

Lentiſci folia tam pota, quàm ſubdita.

Coagulum Leporinum potum, ac etiam ſubditum.

Coagulum Hædinum potum, ac etiam ſubditum.

Coagulum Agninum potum, ac etiam subditum.
Coagulum Ceruinum potum, ac etiam subditum.
Coagulum Hinnulinum potum, ac etiam subditum.
Coagulum Vitulinum potum, ac etiam subditum.
Ceruinum cornu vstum, lotum ex adstringenti liquore aliquo haustum.
Caprarum montanarum fimum siccatum tritúmve cum thure in lana suppositum.
Rumicis radices subditæ.
Plantago tum bibita, tum fotu adhibita.
Barbæ hyrcinæ succus ex vino sumptus, vel suppositus.
Porri comæ decoctum ex aqua marina, & aceto in desessionibus.
Rubi ramorum decoctum potum.
Arabicæ spinæ radix manducata.
Phœnix ex vino austero bibita.
Papaueris nigri semen potum.
Achilleæ subdita.
Idæa radix hausta.
Rubi decoctum potui datum.
Equiseti folia bibita.
Menta fotu subdita.
Iunci marini semen frixum, & ex vino dilu to potum.

Ocimastrum potum ex vino.
Anisum haustū, præsertim ad alba profluuia.
Cuminum ex aceto impositum.
Nymphææ, flore luteo, radix, & semen ex vino nigro pota.
Pæoniæ seminis grana xij. ex vino austero sumpta.
Lysimachiæ succus subditus.
Moly herba cum loliacea farina indita.
Polygoni succus suppositus.
Symphyti petræi ex vino decoctum haustum.
Clymeni succus bibitus.
Limonij semen acetabuli pondere ex vino bibitum.
Medij radix elixa, & ex melle in eclegmate sumpta.
Tragi acini numero x. ex vino hausti.
Hyoscyami semen oboli pōdere in mulsa aqua potum.
Solani hortensis succus in lana inditus.
Mandragoræ semen cum sulphure, & vino suppositum.
Semperuiuum maius in vellere subditum.
Vuarum vinaceorum decoctum haustum, & fotu appositum.
Labruscæ flos pessulo inditus.
Omphacium inditum.
Rubigo ferri subdita.
Chalcitis cum succo porri indita.

Vini fax imo ventris, ac pudendis illita.
Hæmatites lapis ex vino haustus.
Morochthus lapis in vellere inditus.
Ostracites lapis drachmæ pondere ex vino sumptus.
Samia terra cum sylvestris punicæ floribus hausta.

Ad secundas pellendas.

Castoreum drachmarum duarum pōdere cum pulegio bibitum.
Cyclaminis alterius semen haustum.
Allij comæ decoctum fotu impositum.
Aristolochia longa cum myrrha, & pipere sumpta, vel pessulo indita.
Pulegium bibitum.
Thymi decoctum potui datum.
Thymbræ decoctum haustum.
Apij semen in potu sumptum.
Marrubij decoctum bibitum,
Stæchyos decoctum potui datum.
Artemisiæ decoctū in desessionibus adhibitū.
Circeæ radix quatuor librarum pondere cōtusa, & in septem dulcis vini heminis macerata per noctem, diémq; tribus diebus pota.
Oenanthes semen, caulis, & folia ex mulso bibita.
Leucoij semen drachmarum duarum pondere ex vino haustum.
Rubiæ radix supposita.

Anagyris trita folia ex passo bibita.
Chamæpityos ex melle subdita.
Chrysocome ex aqua mulsa pota.
Thrychomanes hausta.
Bryonia supposita.
Myrrha pota.
Peucedani succus potus.
Bunij semen potum.
Smyrnij semen potui datum.
Adianti decoctum bibitum.

Ad expellendum fœtum.

Castoreum duarum drachmarum pondere cum pulegio sumptum.
Caniculæ lac primæ featuræ haustum mortuum pellit.
Oesypus, in lana suppositus.
Caprarum montanarum fimum cum aliquo odoramento potum.
Vulturis fimum suffitum.
Ciceris decoctum bibitum.
Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle fotu adhibitum.
Sium pro olere in cibo sumptum.
Dracunculi maioris decoctum infusum.
Piper haustum.
Cyclaminis radix fœmori adalligata.
Hederæ foliorum pediculi melle illiti subditi.
Gentianæ radix subdita.

Centaurij maioris radix indita.
Centaurij minoris succus infusus.
Pulegium potum.
Dictamum bibitum, inditum, incensumq́;.
Thymi decoctum haustum.
Thymbræ decoctum potui datum. Savoriette
Baccharis recentissima radix supposita.
Panacis Herculei acuminata radix indita.
Pastinacæ erraticæ radix subdita.
Seselis Massiliensis radix pota, quin etiam & semen.
Galbanum cum myrrha, & vino potum. suffitumquè.
Clinopodium potum.
Chamædryos decoctum haustum.
Scordij succus drachmæ pondere sumptus.
Artemisiæ decoctum in sessionibus adhibitũ.
Conyzæ folia, & flores bibita.
Leucoij semen duarum drachmarum pondere ex vino potum.
Onosmatis folia ex vino hausta.
Rubiæ radix supposita. garance
Anagyris trita folia cum passo pota, quin & adalligata, sed statim post partum auferantur.
Anchusæ radix apposita.
Mandragoræ liquor infusus.
Myrrhis pota.
Heliotropij folia indita.

Sulphuris fumus in Vterum permeans.
Dauci ſemen bibitum.
Ammoniacum hauſtum.
Periclymeni ſemen drachmæ pondere in Vino potum.
Lauri Alexandrinæ radix ſex drachmarum pondere ex dulci Vino ſumpta.
Alumen ſubditum.
Iaſpis lapis fœmori adalligatus.
Aëtites lapis pro amuleto fœmori ſuſpenſus,
Samius lapis adalligatus.

Ad conceptionem inhibendam.

Salicis folia per ſe, & cum aqua ſumpta.
Leporinum coagulum poſt triduum à purgatione menſtrua ſumptum.
Sanguis menſtruus illitus.
Braßicæ flores à puerperio in peſſulo ſubditi.
Aſparagi radix ſuſpenſa.
Piper a coitu illico ſubditum.
Hederæ corymbi drachmæ pondere à purgatione hauſti.
Hedyſarum ante coitum fœminis ſubditum.
Cedria Virili membro illita.
Oſtracites lapis ſicilici pondere quatuor diebus à purgatione potus,
Aſplenum (Vt quidam credunt) ſilente luna nocturno tempore decerptum cum muli liene Ventre adalligatum.

Periclymeni semen, & folia diebus triginta sex pota.

Epimedij folia trita illico à purgatione quinque diebus continuis bibita.

Gladioli inferior radix hausta.

Filicis fœminæ radix potui data.

Heliotropium adalligatum.

Rubigo ferri pota.

Menta ante coitum vuluæ admota.

Ad conceptionem iuuandam.

Leporinum coagulum cum butyro subditum statim à mensium purgatione.

Loliacea farina cum myrrha, thure, bitumine, & croco suffita.

Pastinacæ erraticæ semen potum.

Ad fœtum mortuum educendum.

Dictamnum tum potum, tum subditum.

Saluiæ decoctum bibitum.

Galbanum cum myrrha ex vino potum.

Marrubij decoctum haustum.

Tussilaginis decoctum potui datum.

Ad prohibendum abortum.

Aëtites lapis sinistro brachio adalligatus.

Samius lapis pro amuleto suspensus.

Ad puerperia iuuanda.

Dictamni radix bibita.

Baccharis radicis decoctum fotu adhibitum.

Fœnicul

Fœniculum erraticum potum.
Peucedani succus haustus.
Pæoniæ siccata radix potui data.
Altheæ decoctum infusum.

Ad prægnantium malacias.

Vitis vinifera foliorum capreolorumq́ue succus potus.

Ad vteri inflammationes.

Nardi Indicæ decoctum fotu adhibitum.
Iunci odorati decoctum in desessionibus adhibitum.
Viticis foliorum & seminis decoctum fotu appositum.
Butyrum recens illitum.
Sonchi succus inunctus.
Agaricum drachmæ pondere cum oxymelite potum.
Pulegij decoctum fotu subditum.
Melilotus cum passo emplastri modo impositus.
Panacis Herculei lachryma ex melle indita.
Artemisiæ decoctum in desessionibus adhibitum.
Leucoij decoctum fotu appositum.
Anthyllidis radix ex rosaceo, lacteq́ue indita.
Parthenij decoctũ in desessionibus additum.
Althæa decocta, ac subinde anserino, suillóve adipe, aut resina terebinthina subacta, subdita.

Ad exulceratos locos.

Aſpalathi ex vino decoctum infuſum.
Lac in quo igniti calculi extincti fuerint infuſum.
Oeſypum inditum. Explet enim & emollit.
Fœni græci folia ex aceto illita.
Aſclepiadis folia adhibita.

Ad induratos locos.

Myrrha cum abſinthio, lupinorum cremore, vel ruta admota
Styrax illita.
Anſerinus & Gallinaceus adeps illitus.
Bdellium inunctum.
Maluæ decoctum inditum.
Ladanum peßis immiſſum.
Panaces Herculeum ex melle inditum.
Ebuli, ſambuciq́; decoctum fotu admotum.
Partheniȷ decoctum in deſeßionibus,
Fœni græci ex aqua expreſſus ſuccus cum anſerino adipe in peſſulo ſubditus.
Liliȷ radix admota.
Ageratum ſuffitum.

Ad vteri inflationes.

Ruta ex oleo decoctum clyſtere perfuſum.
Geranium, & eius radix drachmæ pondere pota.

Ad procidentem vterum.

Caſia fotu vel ſuffitu adhibita.

Myrti baccarum succus in desessionibus.
Cotoneorum malorũ decoctum fotu adhibitũ.
Gallarum decoctum in sessionibus additum.
Acacia subdita.
Hypocistis subdita.
Vrticæ vtriusque folia imposita.
Acetum fotu adhibitum.

Ad vteri dolores & erosiones.

Adeps Anserinus illitus.
Adeps Gallinaceus illitus.
Vrina cũ ligustrino oleo feruefacta imposita.
Lini seminis decoctum infusum.
Maluæ decoctum fotu adhibitũ, vel infusum.
Portulacæ decoctum clysmate inditum, propriè facit ad erosiones.
Rhaponticum potum.
Centaurij maioris radix bibita.
Anethi decoctum in desessionibus.
Verbenacæ rectæ folia ex recenti suillo adipe, vel ex rosaceo subdita.
Hyoscyami seminis cremor inditus.
Mandragoræ liquor pessulis impositus.

EXTREMORVM MEMBRORVM.

Ad podagram.

Amomum illitum.
Mei radices imposita.
Populi nigræ folia ex aceto illita.

Amurca cruda, ac recens fotu adhibita.
Salicis foliorum, & corticis decoctum fotu impositum.
Ficulneum lac cum farina fœnigræci, & aceto cataplasmatis additum.
Cochleæ terrestres, suo cum operimento tusæ, impositæ.
Mustelæ crematæ cinis ex aceto inunctus.
Marinus recens pulmo concisus impositus.
Lac humanum cum opio, & cera illitum.
Adeps ouillus, caprillus, hircinusve ex eiusdem animalis fimo coactus inunctus.
Sanguis menstruus inunctus.
Caprarum montanarum fimum ex earum adipe illitum.
Hordei farina cum cotoneis malis imposita.
Lens cum polenta decocta, & emplastri modo adhibita.
Raporum decoctum fomentis additum.
Braßica cum fæno græco, & aceto in cataplasmate.
Intybus per se & cum polenta illitus.
Cucurbitæ ramenta imposita.
Ari radix fimo bubulo emplastri modo excepta.
Aßphodeli radix drachmæ pōdere ex vino pota.
Cyclaminis decoctum fotu adhibitum.
Bulbi per se, & cum melle impositi.
Panaces Herculeum cum passa vua illitum.

Liba

Libanotis cum loliacea farina, & aceto cataplasmatis addita.
Scordium ex aceto, aut aqua impositum.
Leucoium ex aceto illitum.
Androsaces imposita.
Helxines succus cera, & hircino adipe exceptus illitus.
Hyoscyami semen, & folia cum polenta cataplasmatis adhibita.
Semperuiuum inunctum, vbi calor exuperat.
Vrtica emplastri modo illita.
Muscus marinus impositus.
Cucumeris asinini radix ex aceto inuncta.
Thapsiæ succus illitus.
Glans vnguentaria illita.
Sambuci & Ebuli folia cum seuo taurino, aut hircino imposita.
Bryonia cum caprino stercore cataplasmatis addita.
Heliotropÿ folia illita.
Vua passa à nucleis repurgata, & cum panacis succo inuncta.
Acetum calido fotu cum sulphure adhibitum.
Rubigo ferri illita.
Sulphur cum aqua, & nitro inunctum.
Sal cum aceto impositum.
Asius lapis cum fabarum lomento illitus.
Gagates lapis inunctus.
Fornaceæ testæ exustæ imposita.

Ad coxendicos affectus.

Mei radices imposita.
Helenij folia ex vino cocta imposita.
Iridis Illyricæ decoctum clysmate infusum.
Cardamomum ex aqua potum.
Asarum potum, vel clystere infusum.
Populi albæ cortex vnciæ pondere haustus.
Iberis contusa, & emplastri modo imposita.
Siluri piscis salsamētum clysteribus infusum,
Piscium Garum clysteribus iniectum.
Smyrnij semen potum.
Bubulum fimum ex bubus in pascuis degentibus illitum.
Lolij farina ex aqua mulsa decocta imposita.
Lupinorum farina ex aceto illita.
Ammoniacum bibitum.
Ascyri semen ex aqua potum.
Asparagi radicum decoctum bibitum.
Althææ decoctum potui datum.
Sinapi tritum cum fico impositum donec ruborem excitet.
Nasturcium clysmate infusum.
Irionis semen clystere iniectum.
Bulbi per se, & cum melle impositi.
Capparis semen potum.
Lepidij folia, & radices, cum helenij radice trita, & imposita.
Agaricum trium obolorum pondere in aceto mulso potum.

Rhaponticum potum.

Androſami ſemen bibitum. Sed à purgatione aquam exorbere oportet.

Centaurij maioris decoctum clyſtere infuſum.

Leucacantha radicis ex vino decoctum bibitũ.

Abrotani ſemen cum aqua potum.

Rubia radix pota.

Pulegium illitum, quouſque rubeſcat cutis.

Calamintha impoſita recẽs tritaq́; donec exuratur locus.

Thymus ex fimo cum polenta impoſitus. Idem præſtat & Thymbra.

Rutæ ſylueſtris ſemen quadraginta diebus potum.

Panaces Herculeum ex melle inunctum.

Laſer cera, liguſtino, & Irino oleo ſubactum illitum.

Euphorbium in odorata potione ſumptum.

Leontopetalum clyſteribus infuſum.

Hyperici ſemen quadraginta diebus potum.

Chamæpityos folia quadraginta diebus ex dulci aqua bibita.

Betonicæ folia ex aqua bibita.

Polemoniæ radix ex aqua ſumpta.

Xyridis radix ex mulſo pota.

Ocimaſtri ſemen cum vino, myrrha, & pipere ſumptum.

Quinquefolij radicis decoctum potum.

Heliochryſi coma ex vino hauſta.

Papa

Papaueris corniculati radicis decoctū potum.
Aethiopis decoctum bibitum.
Arction ex vino haustum, & illitum.
Chamacißi folia trium obolorum pondere in aquæ cyathis tribus tricenis quadragenisve diebus pota.
Colocynthis clystere infusa, & recens loco confricata.
Cucumeris syluestris radix clysmate infusa.
Spartij ramorum ex aqua marina dilutum infusum.
Scammonia ex aceto decocta, & cum hordeacea farina imposita.
Acetum mulsum haustum.
Sory ex vino clystere infusum.
Muria clystere indita.
Adarces illitus.

Ad articulorum dolores.

Gallorum senescentium ius potum.
Braßica cum fœno græco, & aceto illita.
Ruta tum hausta, tum cataplasmatis adhibita.
Agaricum drachmæ pondere ex aceto mulso sumptum.
Melissophyllum ex sale impositum.
Quinquefolij radicis decoctum bibitum.
Psyllium ex rosaceo, & aceto, aut aqua illitum.
Mandragoræ radix cum polenta imposita.

Vrtica cataplasmatis modo adhibita.
Veratrum nigrum potum.
Fucus marinus recens impositus.
Thapsiæ succus inunctus.
Narcißi radix trita, & ex melle imposita.
Acetum mulsum potum.
Vinum melitites frequentius potum.

Ad articulorum collisiones.

Sarmentitius cinis cum axungia vel oleo illitus.

Ad articulorum tophos.

Cannabis syluestris radix decocta, & illita.
Ochra inuncta.

Ad perniones.

Thus cum suillo adipe aut anserino impositum.
Pix liquida inuncta.
Acacia illita.
Myrti seminis decoctum fotu adhibitum.
Ficus cremata cum cerato imposita.
Cancrorum fluuiatilium cinis cum decocto melle illitus.
Pulmo marinus recēs concisus, & impositus.
Asinina vngula cinis oleo maceratus illitus.
Vrsinus adeps inunctus.
Vmbilici veneris succus impositus.
Lentes cum meliloto, siccis rosis, malicorio, cydonio malo, & rosaceo adhibita.
Orobi decoctum fotu impositum.

Raporum decoctum fomenti modo.
Betæ decoctum impositum.
Dracunculi maioris folia ex vino decocta, & imposita.
Oleum in excauata asphodeli radice decoctum illitum.
Cyclamini decoctum fotu adhibitum, quinetiam oleum cum pauca cera in eius excauata radice feruefactum, illitum.
Scilla cremata imposita.
Ranunculi decoctum inunctum.
Arction ex vino illitum.
Alumen aqua aspersum.

Ad pedum inflammationes ex calceorum attritu.

Pulmo Agninus impositus.
Pulmo Vrsinus impositus.
Pulmo Suillus impositus.
Calceamentorum veterum soleæ combusta, & illita.
Capæ succus cum adipe gallinaceo impositus.

Ad pedum rimas.

Cancrorum fluuiatilium cinis cum decocto melle illitus.
Scilla oleo feruefacta, & cum resina imposita.

Ad digitorum reduuias.

Punicorum malorum succus illitus.
Myrti folia trita, & inspersa.

Oleæ

Oleæ ſylueſtris folia trita, & impoſita.
Eboris ramenta in puluerem adhibita.
Alcë cum paſſo impoſita.
Paronychia conciſa & illita.
Bryonia oleo decocta, quouſque liqueſcat, inuncta.
Labruſcæ cremati flores ex melle impoſiti.
Rubigo ferri illita.
Acacia illita.
Rhois folia ex aceto, aut melle illita.
Marrubij folia ex melle impoſita.
Quinquefolij radix illita.
Tithymali characiæ lac illitum.
Acetum illitum.
Alumen aqua inſperſum.
Sal impoſitum.

Ad Paronychia.

apostume a la racine des ongles

Thus cum melle illitum.
Eboris ſcobes inſperſus.
Paronychiæ folia illita.

Ad ſcabros vngues auferendos.

Pix liquida illita.
Lini ſemen cum pari naſturtio & melle.
Cupreſſi pilulæ impoſitæ.
Lapathi cuiuſq; radix in aceto decocta illita.
Ranunculi folia, & radices admota.
Chelidonium minus illitum.
Viſcum cum trito auripigmento appoſitum.
Alumen cum aqua aſperſum.

Sulphur cum resina terebinthina inunctum.
Sandaracha cum pice imposita.
Fax vini cremata ex resina.

Ad mobiles vngues extrahendos.

Vua passa illita.

Ad contusos vngues.

Bulbi cum polenta impositi.

SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM FACVLTATES

secundum genera ex Dioscoride.

FEBRIVM.

Ad tertianas.

ARANEVS *plagella confricatus, linteolóue illitus, mox fronti, aut temporibus impositus.*

Vermes terreni cum anserino adipe decocti, & illiti.

Plantaginis radices integræ tres cum vini cyathis tribus, & pari aqua potæ.

Trifolij bituminosi tria folia trita, totidemq́ semina epota.

Hypericum ex vino bibitum.

Verbenacæ supinæ tertius à terra geniculus cum adiacentibus folijs bibitus.

Heliotropij seminis grana quatuor pota ante febris accessionem.

Portulacæ succus haustus.

Ad quartanas.

Cimices lectularij septem cauis fabarum inclusi, & poti.

Plantaginis radices integræ quatuor, cum vini cyathis quatuor, & pari aqua bibitæ.

Vermiculi qui in Dipsaci echino internis partibus conclusi repertuntur, in aluta collo, brachiòve adalligati.

Ruta syluestris cum vino pota.

Hypericum ex vino haustum.

Quinquefolij rami quatuor sumpti.

Verbenacæ supinæ quartus à terra geniculus vnà cum adiacentibus folijs haustus.

Heliotropij seminis grana quatuor hora vna ante accessionem pota.

Ad diuturnas febres.

Galli senis ius Dioscoridis modo paratum potum.

Agaricum haustum.

Vinum melitites haustum, vbi vētriculus magna imbecillitate laboret.

Ad hepielas.

Hyosciami tria, vel quatuor folia pota.

Ad febrium circuitus.

Sinapi cibis inspersum.

Smirnij semen potum.

Piper bibitum.

Ruta pota.

Sagapenum haustum.

Anthemis elysmate infusa.
Polygoni succus hora ante accessionem sumptus.
Quinquefolij folia ex dulci aqua, aut diluto vino cum exiguo pipere bibita.

Ad eticam.

Portulaca tum ventriculi osculo, tum hypocundrijs illita.

Ad febrium algores.

Piper haustum.
Agaricum drachmæ pondere sumptum.
Aristolochia rotũda ante accessionem bibita.
Abrotanum ex oleo inunctum.
Calaminthæ decoctum potum.
Panaces Herculeum illitum.
Smyrnij semen & radix ex mulso pota.
Pyrethrum inunctum.
Laser cum pipere, & thure ex vino haustum.
Conyza ex oleo inuncta.
Coris semen cum pipere haustum.
Buglossi radix cum semine bibita.
Periclymeni semen ex oleo inunctum.

Ad pestilentes febres.

Myrrhis bis, vel ter qualibet die ex vino pota.

TVMORVM PRAETER NATVRAM.

Ad inflammationes.

Harundinum virentia folia tusa illita.

Glandes intritæ, & illitu appositæ.
Rhois semen ex aqua illitum.
Lupinorum farina, cum polenta, & aqua imposita.
Vmbilici Veneris succus circumlitus.
Plantago emplastri modo imposita.
Asphodeli radix cum polenta adhibita.
Acetum in succidis lanis, aut spongijs impositum.
Rhaponticum cum aceto illitum, vbi diutius perseuerauerit inflammatio.
Pulegium cum polenta illitum.
Tussilaginis folia contrita, & ex melle imposita.
Parthenium emplastri modo impositum.
Lonchitis altera imposita.
Cannabis syluestris radix emplastri modo adhibita.
Polygonon illitum.
Tribuli fructus cataplasmatis additus.
Xyridis radix ex aceto imposita.
Achillea illita.
Helxine cataplasmatis addita.
Lichen herba adhibita.
Verbenacæ supinæ folia illita, vbi inflammatio diutius perseuerat.
Papaueris folia, vnà cum calycibus illita, vel calyces tantum cum polenta adhibiti.
Hyoscyami semen, & folia imposita.

Man

Mandragoræ recentia folia cum polenta illita.

Bryoniæ radix ex vino decocta adhibita.

Sambuci, ebulíque prætenera folia cum polenta illita.

Indicum illitum rumpit.

Triticei furfures acerrimo aceto elixi impositi.

Tritici pollen ex hydrelæo, vel aqua mulsa illitus.

Triticeus panis ex aqua mulsa decoctus, & herbis ad idem conferentibus additus, & impositus.

Sesamum illitum.

Ad carbunculos.

Ligustri folia imposita.

Pix liquida ex melle, & vua passa illita emarginat, disrumpitque.

Cupressi folia trita, & imposita.

Sabinæ folia ex vino illita carbunculos circumscribunt.

Oliuæ maturæ arefactæ illitæ emarginant.

Nucum iuglandium veterum nuclei peruncti.

Columbinum fimum cum melle, & lini semine subactum.

Erui farina emplastri modo imposita.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Brassica cum sale illita rumpit.

Nasturtium impositum.
Porrum cum sale appositum.
Panaces Herculeum illitum.
Coriandrum cum passa vua ex melle impositum.
Laserpitij liquor inunctus.
Tithymali caraciæ lac illitum.
Vua passa à nucleis repurgata, & cum ruta imposita.

Ad furunculos & tubercula.

Fermentum triticeum impositum.
Helxine illita.
Sal cum vua passa, aut suillo adipe, aut melle impositum.
Hastulæ regiæ radix in fæce vini decocta, illita.
Ephemeri folia ex vino cocta, & imposita.
Vtriusque vrticæ folia illita.
Leontopodij radix suspensa.
Cucumeris sylvestris radix cum resina terebinthina imposita.
Scammoniæ succus cum melle, aut oleo illitus.
Mori radicis liquor illitus.
Thapsiæ succus ex melle illitus.
Pycnocomi folia inuncta.
Sandaracha cum adipe imposita.
Asius lapis liquida pice, aut resina terebinthina exceptus, illitus.
Cimolia terra ex aceto illita.

Ad

Ad gangrænas.

Rhois folia ex aceto, & melle illita.
Punicorum ſuccus inunctus.
Nucum iuglãdium veterum nuclei peruncti.
Ficulnei cineris lixiuium ſpongijs exceptum & impoſitum.
Loliacea farina cum ſale, & raphano cataplaſmatis addita.
Cicerum farina cum hordeo, & melle adhibita.
Lentes cum ſertula campana, roſaceo, ſiccis roſis, malicorio, & ſalſa aqua illitæ.
Erui farina illita.
Braßica elixa cum melle, cataplaſmatis addita.
Bulbi per ſe, & cum melle impoſiti.
Laſerpitij liquor illitus, loco prius ſcalpello exciſo.
Galiopſis folia, ſemen ſuccus, & caulis, ex aceto impoſita.
Verbaſci florem aureũ ferentis folia adhibita.
Tithymali caraciæ lac impoſitum.
Bryoniæ radix, fructus, & folia cũ ſale illita.
Vua paſſa à nucleis repurgata, & cum ſale impoſita.

Ad eryſipelas, & ſacros ignes.

Crocum illitum cum refrigerantibus.
Cupreßi folia per ſe, & cum polenta impoſita.
Rhamni folia illita.

Ligu

Ligustri folia adhibita.
Rosæ illitæ.
Acaciæ succus inunctus.
Oleæ syluestris folia contrita, & imposita.
Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo, & vino illita.
Menstruus mulierum sanguis circumlitus.
Caprarum montanarum fimum ex vino, vel aceto decoctum impositum.
Vrinæ humanæ sedimen inunctum.
Lentes cum meliloto, siccis rosis, rosaceo, & malicorio adhibitæ.
Malua ex oleo deoocta, & illita.
Braßica vtraque incisa, & cum polenta emplastri modo imposita.
Portulaca cũ polenta cataplasmatis addita.
Plantago illita cum cimolia, & cerussa.
Intybi radix, & folia cum polenta imposita.
Isatidis folia illita.
Acinos cataplasmatis addita.
Rutæ succus cum aceto, cerusa, & rosaceo inunctus.
Coriandrum cum pane, polentáve illitum.
Lilij folia ex aceto illita.
pas d'asne *Tußilaginis folia trita, ex melle imposita.*
Espargoutte *Parthenium cum floribus emplastri modo impositum.*
Polygonum illitum. · renouees. bo. qt fen bolay
orcanette *Anchusæ radix cum polenta adhibita.*

Lycopsis

Lycopsis radix cum polenta imposita.
Rubi Idæi flos illitus.
Helxine imposita.
Quinquefolij radix decocta cataplasmatis indita.
Verbanaca recta ex aceto inuncta.
Papaueris vascula concisa cum polenta imposita.
Solani hortensis folia cum polline polentæ illita. Quin & eiusdem succus inunctus.
Mandragoræ radix ex aceto illita.
Cicutæ succus inunctus.
Vmbilici Veneris succus circumlitus.
Psyllium, & eius spissamentum inunctum.
Lens palustris illita.
Ricini folia ex aceto illita.
Semperuiuum maius inunctum.
Stratiotes imposita.
Acetum circumlitum.
Rubigo ferri illita.
Chalcitis inuncta.
Sal cum aceto, aut hyssopo illitum.

Ad herpetas.

Acaciæ succus inunctus.
Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo ex vino imposita.
Oleæ syluestris folia contrita, & imposita.
Caprarum montanarum fimum ex vino, vel aceto decoctum illitum.

Lentes

Lentes cum ſertula campana, roſaceo, ſiccis roſis, & malicorio cataplaſmatis indita.
Helxines ſuccus cum ceruſſa inunctus.
Plantago impoſita.
Chelidonium maius ex vino illitum.
Rubi folia illita.
Solani hortulani ſuccus cum ceruſſa, roſaceo, & argenti ſpuma illitus.

Ad epinictydas.

Ouillum, caprillúmve fimum ex aceto illitum.
Braßica conciſa cum polenta impoſita.
Plantago quoquo modo adhibita.
Cucumeris folia cum melle inuncta.
Porrì folia cum Rhoe obſoniorum cataplaſmatis indita.
Abſinthium cum aqua illitum.
Coriandrum cum paſſa vua, & melle impoſitum.
Viſcum in ſplenio adhibitum.
Heliotropij ſemen illitum.
Vua paſſa à nucleis repurgata, cum ruta impoſita.

Ad ſtrumas.

Iridis Illyricæ radix cocta, & illita.
Pix liquida cum farina hordeacea, & pueri impubis vrina decocta, illita.
Ficus ſiccæ coctæ, & impoſitæ.
Großi coctæ & illitæ.

Viperina

Viperinæ carnes coctæ, & in cibum sumptæ.
Mustellæ sanguis inunctus.
Asinini vnguis cinis ex oleo maceratus illitus.
Bubulum fimum è bubus herbas pascentibus sumptum illitum.
Hordei farina cum pice, & impubis pueri vrina excepta imposita.
Loliacea farina cum fimo columbino ex vino decocta, adhibita.
Fabarũ farina cũ melle, & fœno græco illita.
Lens in aceto cum meliloto decocta, illita,
Lupinorum farina ex aceto inuncta.
Rumex decoctus circumlitus.
Plantago cum sale imposita, vel radix collo suspensa.
Sinapi cum sulphure illitum.
Nasturtium ex muria inunctum.
Piper cum pice impositum.
Coriandrum cum fabæ lomento adhibitum.
Galbanum illitum.
Aparine cum axungia inuncta.
Melissophylli folia cum sale cataplasmatis addita.
Althæa ex vino, vel aqua mulsa decocta, imposita.
Quinquefolij radix decocta, ac concisa adhibita.
Laserpitij liquor ex cera illitus.
Vmbilici veneris succus circumlitus.

Mandra

Mandragoræ recentia folia cum polenta imposita.
Semperuiuum tertium impositum.
Galiopsis folia, caulis, semen, & succus cataplasmatis indita.
Pseudobunij rami quaterni ex aqua poti illitique.
Adiantum impositum.
Fornaceæ testæ tostæ ex cerato illitæ.
Capparis radix, & folia trita & imposita.

Ad panos.

Oleæ syluestris folia cum melle inuncta.
Ficus siccæ coctæ. & illitæ.
Bubulum fimum ex pascuis sumptum impositum.
Lupinorum farina ex aceto adhibita.
Atriplex tam crudum, quàm coctum illitum.
Plantago cum sale imposita.
Bulbi elixi cum polenta, & suillo adipe illiti.
Isatidis folia imposita.
Eryngium adalligatum.
Abrotanum cum farina hordeacea, & hydrelæo subacta illitum.
Acinos herba imposita.
Panacis Asclepij flores, & semen cataplasmatis indita.
Coriandrum cum fabæ lomento appositum.
Ammoniacum inunctum.
Onobrychis cõcisa, et emplastri modo imposita.

Gladioli

Gladioli ſuperior radix, cum loliacea farina, & dulci aqua illita.

Pſyllium ex roſaceo, acetóve, aut aqua impoſitum.

Mandragoræ folia recentia adhibita.

Galiopſis folia, caulis, ſuccus, & ſemen illita.

Perſonatæ radix cum axungia ſuo ſuper folio impoſita.

Pycnocomum adhibitum.

Conyza emplaſtri modo impoſita.

Vini fæx illita.

Ad tumores diſcutiendos.

Cancri fluuiatiles impoſiti.

Lini ſemen illitum.

Fœni græci farina cataplaſmatis addita.

Capparis radix, & contuſa folia impoſita.

Smyrnij radix illita.

Ammoniacum inunctum.

Buphthalmi folia, & flores cera excepta, & impoſita.

Mandragoræ recentia folia cum polẽta illita.

Galiopſis folia, caulis, ſuccus, & ſemen adhibita.

Aegilops impoſita.

Diphryges cum reſina terebinthina, aut cerato.

Pyrites lapis illitus.

Alabaſtrites lapis crematus, reſina, aut pice exceptus.

Cimolia terra illita.

Tumor induratus sine dolore aut modico

Ad scirrhum.

Taurinus sanguis cum polenta illitus.

Bubulum fimum ex pascuis assumptum ex aceto illitum.

Loliacea farina cum fimo columbino in vino decocta.

Lini semen cum nitro, & lixiuio ficulnei cineris decoctum.

Hydropiper illitum.

Cannabis syluestris radix imposita.

Cancer.

Ad carcinomata.

Cancrorum fluuiatilium cinis cum melle decoctus, & illitus.

Irionis semen tritum, & impositum.

Vtraque vrtica adhibita.

Galiopsis folia, caulis, succus & semen imposita.

Ad tumores in vniuersum.

Suillus adeps illitus.

Brassica vtraq; concisa, cum polenta imposita.

Cucurbita imposita.

Xanthij semen illitum.

Bulbi elixi cum polenta, & adipe suillo illiti.

Lini semen cataplasmatis inditum.

Fœni græci semen illitum.

Cæpa decocta, & cum passa vua, & ficu adhibita.

Narcißi radix illita.

Bryoniæ

Bryoniæ radix ex vino decocta, & imposita.
Isatidis folia applicata.
Smyrnij radix illita.
Tragoriganum cum polenta impositum.
Mentha cum polenta cataplasmatis addita.
Amaraci folia cum cera coacta, & illita.
Daucum illitum.
Libanotis radices emplastri modo impositæ.
Nigella ex aceto inuncta.
Horminum ex aqua illitum.
Buphthalmi flores cera subacti.
Althæa decocta imposita.
Cannabis syluestris radix emplastri modo adhibita.
Anagyris folia illita.
Polygonon cataplasmatis inditum.
Xyridis radix ex aceto inuncta.
Helxine imposita.
Quinquefolij radix decocta emplastri modo.
Verbenacæ supinæ folia imposita.
Psyllium ex rosaceo, acetóve, aut aqua illitũ.
Ephemeri folia ex vino decocta, illita.
Cytisi folia cum pane inter initia imposita.
Cucumeris agrestis radix cum polenta imposita.
Chamæsyces rami triti, & impositi.
Pycnocomi semen cum polenta illitum.
Indicum inunctum.
Vini fæx cruda per se, vel cum myrto illita.

Ad steatomata.

Chrysanthemi flores cum cerato triti, & impositi.

Ad meliceridas.

Rumex cum rosaceo, & croco illitus.
Melilotus ex aqua inuncta.
Vua passa à nucleis expurgata trita, cum ruta imposita.

Ad tumores ex ictu.

Braßica concisa cum polenta imposita.
Cucurbita emplastri modo illita.
Hydropiper impositum.
Thymus, Thymbráque illita.

Ad sugillata.

Caseus recens illitus.
Succida lana oleo, acetóve perfusa.
Fabarum farina ex melle, & fœno græco.
Lupinorum farina imposita.
Raphanus ex melle.
Allij cinis ex melle.
Sinapi illitum.
Hydropiper impositum.
Ptarmica cum floribus illita.
Bulbi per se, aut ex oui vitello.
Rhaponticum ex aceto.
Aloë ex melle.
Laserpitij liquor illitus.
Absinthium ex melle.
Aqua maris calida fotu adhibita.

Hysso

Hyssopum ex feruenti aqua.
Calamintha ex vino.
Amaraci siccata folia ex melle.
Cuminum erraticum commansum ex melle, & passa vua illitum.
Ammi ex melle.
Acetum ex melle.
Thapsiæ succus, & radix cum thuris, & cera æquali portione duabus tantum horis imposita, & subinde marina aqua fotu adhibita.
Bryonia ex oleo decocta quousque liquescat.
Sal ex melle inunctum.

VVLNERVM.

Ad vulnera conglutinanda.

Cupreßi folia trita.
Vlmi folia, sed multò magis corticis tilia, si fasciæ loco intorqueatur.
Sycomori liquor illitus.
Amurca in cupreo vase decocta illita.
Palmulæ immaturæ illita.
Viticis folia, & semen imposita.
Punicorum cytini impositi.
Thus inspersum.
Lanæ cinis impositus.
Syluestris braßicæ folia imposita.
Argemone illita.
Glycyrrhizæ succus illitus.

Centaurij maioris recens radix imposita.
Centaurij minoris folia tusa, & illita.
Achillea imposita.
Poterij radix concisa illita.
Smyrnij radix imposita.
Aloë in puluerem inspersa.
Sarcocolla imposita.
Polycnemon ex aqua impositum.
Polium emplastri modo impositum.
Scordium impositum.
Equiseti folia inspersa.
Lonchitis folia imposita.
Althæa in vino, aut mulsa aqua decocta imposita.
Sideritis folia imposita.
Chamæpitys, ex melle adhibita.
Sideritis altera imposita.
Polygonum emplastri modo adhibitum.
Polygonatum emplastri modo admotum.
Symphytum petræum inditum.
Symphytum emplastri modo impositum.
Clymeni succus impositus.
Sideritis qualibet illita.
Lycopsis radix cataplasmatis indita.
Ocimi semen illitum.
Graminis radix concisa, & adhibita.
Conyza illita.
Quinquefolium adhibitum.
Coccum infectorium tritum, & inspersum.

Verb

Verbenaca illita.
Erigeri folia, & flores cum thuris manna adhibita.
Verbasci folia ex aceto.
Spongiæ recentes sine pinguedine ex aqua vel posca.
Succida lana vino, aceto, oleóve infusa.
Dracunculi folia ex vino decocta.
Isatidis folia illita.
Stratiotes millefolium impositum.
Morochthus lapis inspersus.

Ad fluxum sanguinis vulnerum.

Syluestris oleæ foliorum succus admotus.
Gallæ crematæ vino, aceto, aut muria extinctæ, inspersæ.
Punicorum cytini impositi.
Perseæ arida folia illita.
Cupressus pilulæ cum arboris coma tritæ & admotæ.
Thus inspersum.
Ranarum crematarum cinis illitus.
Araneorum tela adhibita.
Caprarum montanarum fimum ex aceto.
Asininum fimum tum crudum, tum crematum ex aceto.
Stœbis folia imposita.
Portulaca illita.
Plantago admota.

Idæa radix admota.
Isatidis folia inuncta.
Saluia adhibita.
Galij flos inditus.
Androsæmi folia illita.
Quinquefolium admotum.
Phœnix herba cum punicea lana corpori alligata.
Lichen herba adhibita.
Astragali radix indita.
Hyoscyami semē oboli pondere in mulsa aqua potum.
Stratotes millefolium admotum.
Cinnabaris, & Sanguis draconis inditus.
Alumen admotum.
Sulphur impositum.
Gypsum inspersum.
Spongiæ siccæ recentes, & vacuæ imposita.
Spongiarum crematarum cinis ex pice.
Eretria terra inspersa.
Stibium inspersum.

Ad sanguinem ex cerebro erumpentem.

Gallinaceorum cerebrum ex vino potum.
Stibium tritum inspersum.

Ad sanguinis grumos.

Thymus impositus.
Thymbra illita.

Ad vulnera telis venenatis illata.

Dict.im

Dictamni succus tum potus, tum instillatus.

Ad ossa carne vestienda.

Iris Illyrica illita.
Panacis Herculei radix imposita.
Myrrha cum cochleæ carnibus peruncta.

Ad vulnera membranarum cerebri.

Butyrum admotum.

Ad vulnerum inflammationes.

Bubulum recens fimum ex pascuis sumptum, ac subinde foliis inuolutum, & in ferventi cinere calefactum impositum.
Pinorum, & piscearum folia trita, & illita.
Fabarum farina cataplasmatis indita.
Lupinorum farina admota.
Stratiotes imposita.
Millefolium ex aceto illitum.
Labruscæ flores cataplasmatis inditi.
Aerugo illita.

Ad infixa vulneribus extrahenda.

Cochleæ terrestres cum suo operimento tusa, & apposita.
Siluri salsi caro admota.
Lacertæ concisum caput impositum.
Bulbi cataplasmatis inditi.
Horminum ex aqua illitum.
Anagallis adhibita.

Narcißi radix cum lolij farina impoſita.
Ariſtolochia rotunda impoſita.
Dictamnum admotum.
Gladioli radix ſuperior ex vino, & thure illita.
Xyridis radix admota.
Tragij folia, ſemen, & liquor illita.
Pycnocomi ſemen cum polenta impoſitum.
Acutæ ſpinæ radix illita.
Harundinis radix admota.
Sinapi impoſitum.

Ad carnis excreſcentias.

Gallæ tritæ, & inſperſæ.
Palmarum nuclei exuſti, lotiq; illiti.
Erinacci marini operimenti cinis admotus.
Crematæ purpuræ cinis inditus.
Conchulæ Indicæ cinis illitus.
Smaridis piſcis exuſtum caput impoſitum.
Lanæ crematæ cinis inunctus.
Scordium ſiccatum inſperſum.
Aes vſtum impoſitum. Quin etiam æris flos admotus.
Plumbum elotum tritũ, inſperſum, illitũ, vel quoquo modo admotum.
Stibium tritũ, inſperſum, illitum, vel quoquo modo admotum.
Argenti ſpuma trita, inſperſa, illita, vel quoquo modo admota.

Cerussa trita, inspersa, illita, vel quoquo modo admota,

Chrysocolla trita, inspersa, illita, vel quoquo modo admota.

Ochra trita, inspersa, illita, vel quoquo modo admota.

Diphryges tritũ, inspersum, illitũ, vel quoquo modo admotum.

Auripigmentum tritũ, inspersum, illitum, vel quoquo modo admota.

Pumex tritus, inspersus, illitus, vel quoquo modo admotus.

Corallium tritũ, inspersum, illitũ, vel quoquo modo admotum.

Asij lapidis flos siccatus tritus, inspersus, illitus, vel quoquo modo admotus.

Pyrites lapis cum resina impositus.

Ad vulnera cicatrice obducenda.

Cadmia elota inspersa, vel illita.

Plumbum elotum impositum.

VLCERVM.

Ad depascentia vlcera, quæ Græcis φαγέδαινα vocantur.

Pini, piceæq; cortex cum chalcantho tritus illitus.

Lentisci decoctum fotu adhibitum.

Cupressi folia trita inuncta.

Sabina

Sabinæ vtriusque folia trita, & admota.
Rhamni cuiusque folia imposita.
Cisti flores per se illiti.
Oleæ syluestris folia trita & adhibita.
Lignorum marcor illitus.
Oliuæ maturæ exustæ, tritæ, & inspersæ.
Palmæ cortex siue inuolucrum admotum.
Myrti folia trita, cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo ex vino imposita.
Amygdalæ amaræ ex vino inunctæ.
Smaridis piscis crematum caput, tritum, & illitum.
Garum piscium admotum.
Testudinis fel inunctum.
Loliacea farina cum sale, & raphano illita.
Lini semen ex vino decoctum.
Erui farina admota.
Raphanus tritus inunctus.
Betæ folia imposita.
Plantago quoquo modo indita.
Dracunculi maioris radix concisa, ex melle, bryonia addita.
Asphodeli radix, & folia ex vino.
Anagallis trita adhita.
Hederæ decocta folia ex vino.
Chelidonij maioris radix ex vino.
Isatidis folia superposita.
Aristolochia rotunda adhibita.

Chamaleonis

Chamæleonis nigri radix cataplaſmatis addita.
Pulegium virens appoſitum.
Marum admotum.
Panacis Aſclepij flores, & ſemen illitum.
Paſtinacæ erraticæ folia contuſa ex melle.
Coriandrum cum pane polentáve illitum.
Marrubij folia ex melle.
Tithymali characiæ lac illitum.
Omphacium ex aceto inunctum.
Cicutæ ſuccus illitus.
Sedum maius impoſitum.
Sphondilium cum ruta admotum.
Polygonum ſuperpoſitum.
Verbenaca ex aceto.
Solani hortulani folia cum polentæ polline illita.
Acetum fotu adhibitum.
Acida muria fotu impoſita.
Petaſites admota.
Aeris ſquamma inſperſa.
Aerugo illita.
Sal toſtum cum polenta adhibitum.
Salis flos inſperſus.
Chalcitis illita.
Diphryges inunctum.
Aſius lapis tritus ex aceto.
Alumen cum gallæ crematæ pari pondere ex aceti fæce,

Ad vlcera diuturna.

Cisti flores per se illiti.
Centaurium minus admotum,
Panacis Herculei acuminata radix imposita.
Viscum cum thure inunctum.
Chamædrys ex melle.
Liliј foliorum succus in æreo vase decoctus ex aceto, & melle.
Scordium tritum ex melle.
Anchusæ radix oleo incocta ex cera.
Verbenaca trita ex melle.
Astragali radix illita.
Thalictri radix inuncta.
Personatæ folia imposita.
Omphacium ex aceto.
Spongiæ recentes siccæ, & vacuæ impositæ.
Asiј lapidis flos siccatus illitus.

Ad malefica dolosáque vlcera.

Plantago quoquo modo imposita.
Dracunculi concisa radix cum bryonia ex melle.
Petasites illita.
Psyllium tritum ex melle.
Bryoniæ folia, fructus, radix cũ sale imposita.
Filicis fœminæ radix trita, & illita.
Cadmiæ puluis inspersus,
Salis flos illitus,
Asiј lapidis flos ex melle.
Ostracites lapis ex melle.

Ad ſinus & fiſtulas.

Iridis Illyricæ radicum decoctum infuſum.
Suillus adeps infuſus.
Mel infuſum.
Plantaginis ſuccus inditus.
Dracunculi maioris radicis ſuccus ex melle.
Ariſtolochia rotunda cum iride ex melle.
Sphondilij ramenta circunligata ſinuum callos erodunt.
Quinquefolium cum ſale ex melle.
Stratiotes millefolium infuſum.
Tithymali charatiæ lacteus ſuccus inditus.
Omphacium cum aceto.
Chalcitis collyrij modo infuſa.
Cadmia illita.
Spongiæ recens ſine pinguitudine ex decocto melle impoſita.
Gentiana quoquo modo adhibita.

Ad vlcera in callum indurata.

Capparis radix exiccata impoſita.
Aerugo cum ammoniaco collyrij modo impoſita.
Spongiæ aridæ lino ligatæ, & in pænicilli modo impoſitæ.

Ad vlcera ab erodentibus prouenientia.

Lac omne, & præſertim bubulum illitum.

Ad

Ad phthiriasim.

Staphis agria trita, & ex oleo illita.

Ad sordida vlcera.

Oleæ syluestris folia tusa ex melle.
Iris Illyrica ex melle.
Colymbades tritæ & impositæ.
Resina terebinthina illita.
Pix liquida cum melle indita.
Erinacei marini operimentum exustum impositum.
Purpuræ crematæ cinis illitus.
Conchulæ Indicæ cinis inspersus.
Orobi farina admota.
Braßica cum fœno græco, & aceto illita.
Aßphodeli folia, & radices imposita.
Capparis cortex siccatus, & adhibitus.
Anemones radix illita.
Hederæ decocta folia ex vino.
Chelidonium maius cum axungia admotum.
Aristolochia rotunda imposita.
Libanotidis radices siccatæ ex melle.
Ballote ex melle.
Marrubij folia ex melle.
Verbenacæ supinæ folia illita.
Narcißi radix cum erui farina ex melle.
Bryoniæ radix, fructúsque cum sale admota.
Aerugo ex melle cocta, & imposita.
Aes vstum inspersum.

Vrtica

Vrtica vtraque trita, & illita.
Peucedani radix trita inspersa.
Cadmia indita.
Mel illitum.
Pompholyx admota.
Muria indita.
Alumen quoquo modo adhibitum.
Asij lapidis flos exiccatus, & illitus.

Ad ambusta.

Platani pilulæ adipe exceptæ illitæ.
Ligustri foliorum decoctum fotu adhibitum.
Cisti flores cum cerato impositi.
Acaciæ gummi ex ouo illitũ pustulas prohibet.
Myrti folia cruda seu cremata cerato excepta.
Mori folia trita ex aceto illita.
Thus ex suillo vel anserino adipe exceptum.
Buccinæ cinis illitus.
Mitulorum combustorum cinis admotus.
Conchulæ Indicæ cinis inunctus.
Calciamentorum veterum cinis impositus.
Suillus adeps inunctus.
Fimum Ouillum cera & rosaceo subactum.
Fimum Columbinum cum lini semine ex oleo.
Fimum Gallinaceum cum lini semine ex oleo.
Sesamum ex rosaceo.

Malua decocta ex oleo.
Betæ virentia folia illita.
Braſsicæ cinis ex oui albo.
Lactucæ ſyluestris lacteus ſuccus ex humano lacte.
Hederæ flores ex cera. Quin & decocta folia ex vino.
Acanthi radix illita.
Rutæ ſyluestris ſemen, & folia admota.
Glutinum calida aqua maceratum illitum puſtulas prohibet.
Typhæ flos vetere ſuillo adipe eloto exceptus.
Hemerocallis radix illita.
Althææ folia ex exiguo oleo admota.
Hyperici ſemen, & folia impoſita.
Aſcyri ſemen, & folia adhibita.
Androſæmi folia impoſita.
Anchuſæ radix in oleo decocta ex cera.
Helxine admota.
Papaueris corniculati folia ex oleo.
Verbaſci ſyluestris folia cataplaſmatis addita.
Stimmi ex recenti adipe illitum puſtulas prohibet.
Alumen ex aqua.
Sal ex oleo puſtulas prohibet.
Cimolia terra illita puſtulas prohibet.
Phrygius lapis cerato exceptus.
Atramentum ſcriptorium ex aqua.

Cinn

Cinnabaris, & sanguis draconis illitus.
Galij flos inunctus.
Lilij radix cremata ex rosaceo. Quin & folia illita.
Cynoglossa folia ex veteri suillo adipe.
Sambuci prætenera folia inuncta.
Narcissi radix ex exiguo melle.
Oleum ex cauatis asphodeli radicibus decoctum illitum.

Ad fauos.

Peponis radix ex melle.
Nasturtium illitum.

Ad ficos.

Bulbi in cinere tosti, & cum capitum manarum cinere impositi.

Ad intertrigines.

Calciamentorum crematorum soleæ illitæ.

Ad vlcerum inflammationem.

Aranei tela imposita.

Ad vlcera caua explenda.

Thus inditum.
Pix liquida cum melle.
Pix arida imposita.
Medulla ossium quadrupedum qualibet inuncta.

Mel infusum.
Cadmia inspersa.
Corallium inditum.
Aßij lapis flos ex melle.
Eretria terra illita.
Pumex inspersus.

Ad vlcera cicatrice obducenda.

Purpurarum crematarum cinis illitus.
Mitulorum cinis illitus.
Conchulæ Indicæ cinis illitus.
Aloë inuncta.
Eupatorij folia concisa ex suillo adipe.
Filicis fœminæ radix sicca in puluerē aspersa.
Cadmia admota.
Aes vstum impositum.
Squamma æris inspersa.
Aerugo ex oleo & cera.
Stimmi quoquo modo adhibitum.
Molybdæna quoquo modo adhibita.
Argenti spuma quoquo modo adhibita.
Cerusa quoquo modo adhibita.
Chalcitis quoquo modo adhibita.
Pumex quoquo modo adhibita.
Fæx vini cremata quoquo modo adhibita.
Calx lota quoquo modo adhibita.
Corallium quoquo modo adhibitum.
Asij lapidis flos quoquo modo adhibitus.

For

Fornaceæ testæ tostæ quoquo modo adhibitæ.

LVXATIONVM ET FRACTVRARVM.

Ad artuum luxationes.

Harundinis radix cum aceto adhibita.
Personatæ radix trita illita dolores artuum à contorsionibus sedat.
Acaciæ decoctum fotu adhibitum.
Viticis semen cum folijs cataplasmatis additum.
Stercus caprillum cum cera, & rosaceo inunctum.
Asparagi radix ex aceto, vel vino adhibita.
Cyclamini decoctum fomenti modo.
Bulbi cataplasmatis more adhibiti.
Acanthi radices impositæ.
Sampsuchi folia cum cera coacta imposita.
Anchusæ folia cum melle, & farina adhibita.
Vrtica vtraque imposita.
Narcissi radix cum melle trita.
Vitis nigræ folia cmm vino imposita.
Filicula imposita.
Heliotropij folia linita.
Sarmentorum vitis, & vinaceorum cinis ex

aceto linitus.
Sal cum farina, & melle.

Ad ossa fracta.

Myrthi foliorum decoctum fotu adhibitum.
Succida lana oleo, vino, acetóque perfusa.
Verbasci decoctum potum.
Fuligo pictoria cum rosaceo cerato imposita.
Vlmi foliorum, aut corticis radicum decoctum perfusum.

Ad ossa fracta euellenda.

Aristolochia rotunda cataplasmatis more imposita.
Peucedani radix in puluerem imposita.
Euphorbium impositum.
Xyridis radix addito flore æris.
Bryonia trita, & imposita.
Vitis nigræ radix.

Ad eos qui ab alto deuoluuntur.

Gentianæ radicis succus drachmæ pondere haustus.
Baccharis radicis decoctum potum.
Millefolium cum aqua, & sale potum.
Lixiuium ex cinere sarmentitio factum cum aceto, sale, & melle.

Ad ruptos.

Acori decoctum potum.

Cardamomum ex aqua potum.
Calami odorati decoctum cum graminis, aut apij ſemine potum.
Helenij radices in eclegmate cum melle deuoratæ.
Bdellium hauſtum.
Iuniperi baccæ bibitæ.
Cedrides deuoratæ.
Halimi radix drachmæ pondere in aqua mulſa pota.
Dracunculi maioris radix toſta, & elixa cum melle ſumpta.
Aſphodeli radix drachmæ pōdere in vino pota.
Bulbi elixi in aceto, & in cibo ſumpti.
Agaricum trium obolorum pondere deuoratum cum mulſo.
Gentianæ radicis ſuccus drachmæ pondere hauſtus.
Ariſtolochia rotunda bibita.
Serpyllum potum.
Centaurij maioris radix hauſta cum vino.
Acanthi radices potæ.
Smyrnij radix comeſta, vel pota.
Leucacanthæ radicis ex vino decoctū potum.
Abrotani ſemen ex aqua potum.
Origanum cum ficu deuoratum.
Equiſeti radix & folia pota.
Calaminthæ decoctum hauſtum.
Baccharis radicis decoctum bibitum.

Libanotis radices pota.
Sagapenum bibitum.
Laserpitij liquor cum lixiuio potus.
Galbanum deglutitum.
Polycnemon bibitum cum vino.
Scordium additis nasturtio, melle, resináque deuoratum.
Althaeae decoctum potum.
Alceae radix in vino vel aqua, pota.
Betonicae folia drachmae pondere in dulci aqua bibita.
Symphytum petraeum cum aceto mulso potum.
Symphyti radix pota.
Xyridis radix ex mulso pota.
Helichrysi coma in vino pota.
Verbasci decoctum potum.
Bryonia cum melle in eclegmate deuorata.
Schistus lapis potus.

VENENORVM.

Ad omnium venenosorum morsum. ictúmque.

Iridis illyricae radix ex aceto pota.
Cardamomum ex vino potum.
Nardus Celtica cum absinthij decocto hausta.
Phu antidotis inseritur, quae venenatis resistunt morsibus.
Cinnamomum bibitum.

Casia

Caßia potui data.
Helenij radicis decoctum potum.
Bdellium potui datum.
Platani pilulæ ex vino haustæ.
Ericæ flores poti. Quin etiam comæ.
Viticis semen in potu sumptum.
Glandes esitatæ.
Nuces comesæ.
Sycomori lachryma illita.
Ficulneum lac plagis inditum.
Pix liquida cum trito sale illita.
Paliuri foliorum, & radicis decoctum potum.
Gallinaceorum cerebrum cum vino potui datum.
Erucæ, quæ in oleribus reperiuntur ex oleo illitæ.
Coagulum Leporinum potum ex vino trium obolorum pondere.
Coagulum Agninum potum ex vino trium obolorum pondere.
Coagulum Hinnulinum potum ex vino trium obolorum pondere.
Coagulum Aprinum potum ex vino trium obolorum pondere.
Coagulum Ceruinum potum ex vino trium obolorum pondere.
Coagulum Vitulinum potum ex vino trium obolorum pondere.

Coagulum Bubalinum potum ex vino trium obolorum pondere.
Coagulum Hædinum potum ex vino trium obolorum pondere.
Coagulum Capreæ potum ex vino trium obolorum pondere.
Coagulum Laticornis potum ex vino trium obolorum pondere.
Marinæ testudinis sanguis cum leporino coagulo, & cumino potus.
Mel ex calido rosaceo bibitum.
Triticea farina ex aceto & vino imposita.
Porri succus ex melle sumptus. Quin & coma illita.
Porrum syluestre esitatum.
Piper quoquo modo sumptum.
Eryngium ex vino haustum.
Teucrium ex aceto inunctum.
Argemone ex vino epota.
Agaricum trium obolorum pondere ex vino haustum.
Rhaponticum potui datum.
Chamædrys ex vino bibita.
Gentianæ radix drachmæ pondere cum pipere, & ruta ex vino pota.
Aristolochia longa drachmæ pondere potui data, ac etiam plagæ admota.
Origani decoctum haustum.
Leucas ex vino sumpta, vel cataplasmatis

addi

addita.

Pulegium ex vino potui datum.

Dictamni succus ex vino potus.

Baccharis radix ex vino bibita.

Panacis Herculei semen cum aristolochia sumptum.

Ligustici tum radix, tum semen haustum.

Pastinacæ erraticæ semen potui datum.

Anisum potum.

Asclepiadis radices ex vino sumptæ.

Cuminum ex vino haustum.

Ammi cum vino potui datum.

Delphinium morsui admotum.

Laserpitij liquor tum inunctus, tum bibitus.

Galbanum inunctum homines tutos reddit.

Clinopodium haustum.

Trifolij bituminosi folia ex oxymelite sumpta.

Polij decoctum potum.

Betonicæ folia trium drachmarum pondere ex vini sextarijs duobus hausta, vel admota.

Polygoni succus bibitus.

Clematis prima illita.

Spargani radix ex vino pota.

Acida muria plagæ indita.

Terra Lemnia hausta.

Sal cum origano, melle, & hyssopo illitum.

Ad viperarum morsum.

Costus, semiunciæ pondere potus.

cest du coq.

Cassia

Caſsia potui data.
Pix liquida illita.
Iuniperi folia, et foliorum ſuccus potui datus.
Fraxini folia, vel eorum ſuccus hauſtus.
Lauri folia admota.
Abrotanum illitum.
Galbanum Splenij loco ſuperiectum.
Origanum virens inditum.
Pulli gallinarum diſcerpti, & confeſtim admoti.
Anthemis detrita cum hordeacea farina, & mulſo aceto cataplaſmatis modo admota. Sed locus antea aceto mulſo calido foueatur.
Rubi folia ex vino illita.
Porri ſuccus ex meri hemina hauſtus.
Apiaſtri ſuccus ex vino potus.
Leporis coagulum potui datum.
Omotarichi piſcis ſalitæ carnes in cibum ſumptæ, hauſto deinde copioſiore vino. Quin etiam admotæ,
Cerui genitale tritum, & ex vino ſumptum.
Vrina ipſiusmet demorſi bibita.
Furfures triticei in decocto rutæ elixi, admoti.
Erui farina ex vino macerata illita.
Raphanus inunctus.
Braſsicæ ſuccus cum nitro & iride potus.
Chondrylla manducata.
Allium ex vino ſumptum, & illitum.

Scilla

Scilla decocta in aceto, & imposita.
Anagallidis succus ex vino sumptus.
Ferulæ medulla in vini potione.
Aparinæ succus ex vino potui datus.
Rubiæ radicis succus cum folijs potus.
Tribuli terrestris succus drachmæ pondere potus, plagæq; admotus.
Anchusæ Alcibiadis nomine folia, radicésque tum comesta, tum bibita, tum adalligata.
Ocimastri semen ex vino haustum.
Sambuci, ebulique radix ex vino cocta, potui data.
Bryoniæ radix duarum drachmarum pondere hausta.
Vitium sarmentorum cinis ex aceto illitus.

Ad serpentum & aspidum morsum.

Cancri fluuiatiles crudi, tritique cum asinino lacte potui dati.
Equi fluuiatilis testiculus potus.
Castorium bibitum.
Mustelæ salitæ, & in vmbra exiccatæ puluis drachmarum duarum pondere ex vino sumptus.
Ranæ cum sale in oleo decoctæ comesæ.
Gobius piscis deuoratus.
Cimices lectularij septē quoquo modo hausti.
Aprinum iecur, & recens, & siccum ex vino sumptum.

Gallinaceorum carnes dissectæ, ita ut tepebunt appositæ, crebróque mutatæ.

Butyrum illitum.

Caprarum montanarum fimum in vino, vel aceto decoctum illitum.

Mel ex calido rosaceo bibitum.

Asphodeli radix trium drachmarum pondere sumpta. Quin & folia, flores, & radices in cataplasmatis.

Nasturtium haustum.

Spinæ albæ semen potum.

Abrotanum ex vino sumptum.

Hyssopum tritum cum melle, sale, & cumino impositum.

Nepeta pota, vel cataplasmatis indita.

Panacis Asclepij semen cum floribus haustum, & inunctum.

Panaces chironium bibitum, & illitum.

Hieracij succus ex vino potus.

Elaphobosci semen in vini potione sumptum.

Euphorbium incisa capitis cute ad os, sfque in vulnus impositum, statimque consutum.

Leontopetalum bibitum illico dolorem aufert.

Lilij folia illita.

Melissophyllum ex vino haustum, & plagæ admotum.

Marrubij folia hausta.
Serpyllum tum potum, tum impositum.
Ruta cum nucibus iuglandibus, & caricis sumpta.
Phyllitis ex vino hausta.
Smyrnij radix illita.
Fæniculum ex vino sumptum.
Sagapenum ex vino potui datum.
Libanotis radices cum vino bibitæ.
Scordium siccatum ex vino sumptum.
Conyza illita.
Clematis in aceto bibita.
Echij radix ex vino pota. Præpota verò demorderi prohibet, id quod præstant semen, & folia.
Ocimastri semen potum.
Eupatorij semen, & folia in vino sumpta.
Helichrysi coma ex vino bibita.
Verbenaca supinæ radix, & folia ex vino hausta, tum etiam admota.
Mandragoræ radix ex melle, aut oleo illita.
Nerij radix ex vino sumpta.
Acetum calidum fotu adhibitum, vbi illatum venenum frigidum sit: frigidum verò vbi calidum.
Adianti decoctum bibitum.
Aqua maris fotu adhibita.
Sal cum origano, melle, & hyssopo inunctum.
Sarmentitius cinis ex aceto illitus.

Samia

Samia terra ex aqua pota.
Ophites lapis pro amuleto gestatus.

Ad hæmorrhoi morſum.

Allium bibitum, & illitum.
Merum copioſius hauſtum.
Vitium viniferarum folia decocta. & ex melle ſubacta impoſita.

Ad ceraſtæ morſum.

Seſamum cum roſaceo inunctum.
Raphani ſemen ex vino bibitum.
Sal cum cedria, aut pice, aut melle illitum.

Ad ſcolopendræ morſum.

Aſphodeli radix, & ſemen ex vino pota.
Sal ex melle, & aceto.
Ruta ſylueſtris admota. Quin, & bibita ex vino.
Muria acida fotu adhibita.
Ariſtolochia ex vino pota.
Serpyllum potui datum ex vino.
Calamintha ex mero ſumpta.

Ad dryini morſum.

Ariſtolochia cum vino hauſta.
Trifolij bituminoſi folia in potu ſumpta.
Aſphodeli radix potui data.
Glandes quæcunque bibita,
Ilicis radices tuſæ, & icto loco illita.

Ad na

Ad natricis morsum.

Origanum tritum, & aqua subactum ex lixiuio, & oleo inditum.
Aristolochiæ cortex minutim contritus cum querna radice, & hordei farina ex melle illitus.
Aristolochiæ binæ drachmæ in potione poscæ potæ.
Marrubij succus ex vino haustus.
Fauus recens ex aceto sumptus.

Ad cenchri morsum.

Lactucæ semen cum lini semine illitum.
Saturcia cum syluestri ruta, & serpyllo, & asphodeli radice ex vino sumpta.
Gentiana potui data.
Cardamomum deuoratum.

Ad muris aranei morsum.

Mus araneus ipse discerptus, & impositus.
Allium cum ficulneis folijs, & cumino illitũ,
Absinthium vino bibitum.
Chrysogoni radix concisa, & ex aceto imposita.
Galbanum in Splenio admotum.
Hordeacea farina ex aceto mulso illita.
Punicæ dulcis acini decocti, & inuncti.
Porrum contritum impositum.
Abrotani decoctum ex vino haustum.
Serpyllum ex vino potum.
Eruca ex vino sumpta.

Cupreßi recentes pilulæ ex aceto potui datæ.
Cyclaminus ex aceto mulſo ſumpta.
Pyrethrum ex vino potum.
Chamæleonis radix bibita.

Ad paſtinacæ marinæ, ſcorpionis & draconis marini morſum.

Saluiæ decoctum potum.
Simplicia omnia, quæ viperinis morſibus conueniunt.
Abſinthij, aut Sulphuris ex aceto decocti potio.
Animalia ipſa diſſecta ſuo cuiuſque ictui admota.
Mulus piſcis diſſectus, & impoſitus.
Ocimum cum polenta, & aceto impoſitum.
Plumbum confricatum.
Sulphur admotum.

Ad morſum muſtelæ.

Eruca comeſta, & poſt eam bibitum vinum odoriferum.

Ad morſum baſiliſci.

Caſtoreum drachmæ pondere ex vino potum.
Papaueris ſuccus hauſtus.

Ad calcidicæ lacertæ morſum.

Portulaca percocta.

Ad rabidi canis morſum.

Lycium in catapotio datum, aut ex aqua bibitum.

Cancrorum fluuialium cinis cochlearium duorum pondere ex gentianæ radicis vino, per triduum in vino potus.

Smaridis piſcis ſalſa caro.

Omotarichi piſcis ſalitæ carnes illitæ.

Garum omnium piſcium fomẽto adhibitum.

Canis rabidi epar toſtum, & in cibo ſumptum à metu aquæ præſeruat.

Caninus ſanguis bibitus.

Canina vrina bibita.

Mel bibitum cum roſaceo calido.

Triticum commanducatum, & appoſitum.

Cæpæ cum ruta, ſale, & melle mixtæ.

Allium cum vino potum, & cataplaſmatis inditum.

Panaces Herculeum pici miſtum, & cataplaſmatis additum.

Fœniculi radices conciſæ, & ex melle impoſitæ.

Laſer impoſitum.

Ballote cataplaſmatis modo cum ſale illita.

Meliſſophyllum cum vino bibitum, & cataplaſmatis inditum.

Alyſſum in edulio contuſum.

Allium ſyluestre in cibo ſumptum & illitũ.

Salſamentum inditum.

Succus Cyrenaicus.

Ad canis non rabidi morſum.

Amygdalæ amaræ ex melle exceptæ.

Mitulorum caro imposita.
Gobius piscis impositus.
Orobi farina vino macerata indita.
Plantago cataplasmatis modo adhibita.
Cucumeris folia imposita.
Bulbi cum melle, & trito pipere cataplasmatis more impositi.
Menta imposita.
Vrtica vtraque cum sale adhibita.
Cynoglossi radix, & folia cum suillo adipe veteri imposita.
Sambuci, & ebuli folia illita.
Sarmentitius cinis ex aceto illitus.

Ad phalangiorum morsum.

Myricæ fructus poti.
Myrtus ex mero hausta.
Mori foliorum succus cyathi mensura potus.
Lixiuium ficulnei cineris potum, adiecto sale trito, & vino.
Cancri fluuiatiles crudi, tritique cum asinino lacte poti.
Mulus piscis dissectus, & impositus.
Maluæ decoctum impositum.
Myrrhis ex vino pota.
Asparagi radicum decoctum haustum ex vino.
Lactuca syluestris bibita.
Coris semen potum in vino.

Hederæ

Hederæ succus cum aceto potus.
Abrotanum cum vino bibitum.
Dauci semen ex vino assumptum.
Nigella drachmæ pondere cum aqua pota.
Aparine ex vino pota.
Melissophyllum cum vino bibitum, & cataplasmatis more additum.
Phalangij folia, flores, semenque potum.
Iunci marini tenella folia propè radicem erumpentia imposita.
Hyacinthi radix pota.
Semperuiuum maius in potu datum.
Aqua maris fotu applicata.
Punicæ syluestris radix, quàm tenuissimè trita, aut aristolochia cum hordei farina, & aceto subacta.
Apiastri decoctum fotu adhibitum, aut eius folia.
Abrotani semen propinatum binarum drachmarum pondere cum hemina vini.
Anisi semen propinatum binarum drachmarum pondere cum hemina vini.
Cumini æthiopici semen propinatum binarum drachmarum pondere cum hemina vini.
Ciceris syluestris semen propinatum binarum drachmarum pondere cum hemina vini.
Cedrides tritæ admotæ, vel bibitæ.

Platani cortex potus.
Cupreßi viridium pilularum admisto vino decoctum.
Chamæpityos decoctum bibitum.
Trifolij semen propinatum.

Ad stellionis morsum.

Sesamum cum rosaceo.

Ad crocodilorum morsum.

Sal impositum.

Ad quadrupedum morsum.

Aprinum epar tum recens, tum siccum bibitum.

Ad scorpionum ictus.

Cyperus impositus.
Cardamomum ex vino potum.
Amomum ex ocimo illitum.
Lauri baccæ ex vino bibitæ.
Myrti succus ex mero haustus.
Ficus satiuæ lacteus succus plagæ instillatus.
Cancri fluuiatiles crudi, tritiq́; cum asinino lacte poti.
Scorpius ipse tritus, & impositus, vel tostus deuoratus.
Delphinium appositum.
Mulus piscis dissectus, & impositus.
Smaridis piscis salita caro apposita.
Lacerta dissecta, & apposita dolorem sedat.
Mures domestici dissecti, & impositi.

Fimum

Fimum Asini herbas pascentis vino dilutum haustum.
Fimum Equi herbas pascentis vino dilutum haustum.
Vrina humana pota.
Farina triticea ex aceto, & vino posita.
Lychnidis semen cum vino potum.
Oxylapathi, & oxalidis semen vino, aut aqua potum.
Sonchi succus comestus, & cataplasmatis more impositus.
Intybus more cataplasmatis.
Phalangium herba pota.
Lactuca sylvestris bibita.
Ocimum cum polenta impositum.
Asphodeli semen, & flores in vino poti.
Abrotanum in vino potum.
Sampsuchum ex aceto, & sale impositum.
Hieracium maius, & minus cataplasmatis more appositum.
Lacer oleo dilutum impositum.
Colus rustica cum vino piperéque bibita, & manibus gestata dolorem puncturæ omnino fugat.
Melissophylli folia adhibita.
Polemonij radix alligata.
Rubi flos, & mora.
Verbasci aureum florem ferentis folia imposita.

Chamæsyces succus illitus.
Scorpioides illita.
Heliotropium potum cum vino, & illitum.
Aqua maris fotu imposita.
Sulphur ignem non expertum cum resina terebinthina exceptum admotum.
Calamintha trita illita, vel cum posca, fota.
Galbanum Splenij more ductum impositum.
Hordei farina cum vino parata.
Rutæ decoctum fotu adhibitum.
Trifolium tritum iniectum.
Cupressus cum vino, & ruta.
Peucedani succus haustus.
Pulegij decoctum potum.
Gentianæ decoctum potum.
Aristolochiæ præsertim cortex drachmarum duarum pondere.
Sal cum lini semine.
Sapphirus lapis illitus.

Ad vesparum & apum ictum.

Lauri folia trita, & illita.
Malua concisa ex oleo imposita.
Sisymbrij folia imposita.
Althææ decoctum ex posca bibitum.
Sal cum sepo vitulino.

Ad fugandum animalia venenosa.

Iuniperi accensæ fumus.
Cedrides peruncto corpore adipe vel medulla ceruina excepta.

Viticis

Viticis folia suffita, vel substrata.
Cancri fluuiatiles crudi cum ocimo triti scorpionibus admoti.
Ceruinum cornu crudum incensum, suffitúmque.
Cerui, & Elephantis adeps inunctus.
Ceruina medulla.
Nasturtium suffumigatum.
Abrotanum stratum, suffitúq; incensum.
Origani folia stratis subiecta.
Dictamnum olfactum omnia, quæ ictu, aut morsu venenum relinquunt, enecat.
Calaminthæ suffitus.
Peucedani suffitus.
Lysimachia incensa fugat serpentes, & muscas.
Nigellæ suffitus.
Galbani suffitus.
Polium vtrumq; incensum, stratumq;.
Conyzæ suffitus.
Gagates lapis suffitus.

Ad venena omnia.

Phu antidotis insertum.
Cinnamomum potum.
Pix liquida cyathi mensura in eclegmate ex melle data.
Cedrides antidotis imposita.
Nuces iuglandes cum ruta, & ficis præsumpta
Quinquefolij radicis succus bibitus.

Coagulum leporinum potum.
Epipactis hausta.
Castoreum bibitum.
Calamintha præpota.
Mustelæ salitæ, & in vmbra exiccatæ puluis cum vino.
Mustelæ ventriculus coriandro farctus, & inueteratus.
Caniculæ lac primi partus potum.
Eryngium cum vino potum.
Butyrum deficiente oleo, haustum.
Sanguis Anseris antidotis commistus.
Sanguis Anatis antidotis commistus.
Sanguis Hædi antidotis commistus.
Vrina ipsiusmet infirmi pota.
Semen raparum haustum.
Rutæ semen acetabuli pondere cum vino potum.
Napi semen potum.
Maluæ decoctum cum suis radicibus frequenter potum, crebroq; euomitum.
Brassicæ semen antidotis impositum.
Irionis semen haustum.
Laserpitium potum.
Agaricum drachmæ pondere cum diluto vino sumptum.
Chamæleonis albæ radix cum vino pota.
Spina alba in amuletum congesta, colloque suspensa.

Abrotani

Abrotani semen cum vino potum.
Ruta cum iuglandibus nucibus, & caricis sumpta.
Apij decoctum potum.
Marrubij folia bibita.
Betonicæ folia drachmæ pondere in vino bibita.
Polemoniæ radix in vino bibita.
Tribuli terrestris succus haustus cum vino.
Smilacis asperi acini prius pòstve sumpti.
Acetum tepidum bibitum.
Terra Lemnia ex aqua hausta.
Terra Samia ex aqua hausta.

Ad leporem marinum ebibitum.

Cedria contrita cum vino hausta.
Cancri fluuiatiles cum suo iure elixi, & comesti.
Lac asininum continuè datum.
Passum continuè datum.
Malue radicum decoctum haustum.
Cyclamini radix cum vino bibita.
Veratrum nigrum drachmæ pondere data cum mulsa, & mali punici acinis.
Scammonij succus drachmæ pondere data cum mulsa, & mali punici acinis.
Ansérinus sanguis tepidus haustus,
Alismatis drachma vna, vel altera bibita.

Ad rubetam ranam ebibitam.

Testudinis marinæ sanguis cum leporis coagulo,

gulo, & cymino bibitus.

Alismatis radix vnius, vel duarum drachmarum pondere in vino pota.

Merum largius potum, & euomitum.

Harundinis radicis binæ drachmæ potæ.

Cyperi radicis binæ drachmæ potæ.

Ad bupreſtes & pinorum erucas ebibitas.

Oleum Irinum potum.

Oleum Melinum potum.

Caricæ comeſæ, & earum decoctum ex vino.

Palmulæ thebaicæ in cibo ſumptæ, vel tritæ ex mulſo, aut lacte potæ.

Pyra omne genus in cibum ſumpta.

Humanum lac bibitum copioſè.

Simplicia omnia, quæ epotis cantharidibus proſunt.

Ad epotas hirudines.

Muria in ſorbitionibus data.

Cyrenaicus ſuccus potus.

Laſerpitij folia ex aceto hauſta. Quin & ſuccus ex aceto gargarizatus.

Betæ folia cum aceto bibita.

Niuis glebula cum poſca ſumpta.

Cimices vino acetóve poti.

Acetum cum ſale potum.

Nitrum ex aqua gargarizatum.

Atramentum ſutorium aceto dilutum & gargarizatum,

Ad

Ad epotas cantharidas.

Halicæ decoctum clismate infusum.
Oryzæ decoctum clismate infusum.
Tragij decoctum clismate infusum.
Maluæ decoctum clismate infusum.
Semen lini decoctum clismate infusum.
Semen fœni græci decoctum clismate infusum.
Althææ decoctum clismate infusum.
Nitrum ex hydromelite potum.
Nuclei pinei ex vino sumpti.
Cucumeris semen contritum, ex mulso aut lacte haustum.
Anserinus adeps ex passo potus.
Lac potum.
Vinum dulce liberalius bibitum.
Thuris cortex ex passo sumptus.
Samia terra, quæ Aster appellatur ex defruto hausta.
Pulegium tritum ex aqua potui datum.
Rosaceum cum Irino ex rutæ decocto sumptum.
Vitis recentes ramuli detriti, & ex passo hausti.
Ius escalentum omnium adipum.

Ad haustam salamandram.

Resina pinea in delinctu.
Galbanum ex melle deglutitum.
Nuclei pinei contriti, ex aiugæ decocto poti.

Vrtica

Vrtica cum lilijs ex oleo decocta, & pota.
Testudinis marinæ, & terrestris oua cocta deuorata.
Ranarum ius, in quo eryngij radix fuerit cocta, potum.

Ad sanguinem & lac in ventriculo concretum.

Coagulum leporinum epotum.
Acetum tepidum potũ, & vomitu redditum.
Grossi lacteo succo turgentes ex posca sumpti.
Nitrum per sese potum.
Coagulum omne ex aceto, & laserpitij radice, aut lasere haustum.
Braßicæ semen ex lixiuio ficulnei cineris potum.
Conyzæ semen cum pipere ex aceto haustum.
Rubi succus ex aceto potui datus.
Hordeacea farina ventriculo, & aluo ex aqua mulsa inuncta.
Thymum ex vino haustum.
Calaminthæ folia arida pota.

Ad colchicum.

Origanum cum passo, aut oxymelite potum.
Bubulum lac haustum, quin & asininum largius potum.
Quercus foliorum, aut glandium decoctum potum.
Malicorium haustum.

Serpyllum ex lacte decoctum bibitum.
Sanguinalis herbæ ſuccus potui datus.
Vitis recentium viticularum ſuccus bibitus.
Rubi ſuccus in potu ſumptus.
Ferulæ recentis medulla ex vino ſumpta.
Myrti baccæ tuſæ, & aqua maceratæ, & in liquorem ſolutæ, potæ.
Caſtanearum media tunica trita, & cum ſanguinariæ ſucco epota.
Origanum cum lixiuio bibitum.
Simplicia omnia, quæ fungis aduerſantur.

Ad ſolanum ſomniferum.

Aqua mulſa copioſè ſumpta.
Lac caprillum potum.
Lac aſininum potum.
Vinum dulce tepidum cum aniſo bibitum.
Amygdalæ amaræ deuoratæ,
Conchylia omnia tam cruda quàm toſta deuorata.
Locuſtæ marinæ, quin & Gammari in cibum ſumpti, & eorum iuſcula pota.

Ad hyoſcyamum.

Mori cortex potus.
Aqua mulſa largius ebibita.
Lac omne præſertim aſininum potum.
Ficuum aridarum decoctum bibitum.
Nuclei pinei deuorati.

Cucu

Cucumis semen ex passo potui datum.

Vinum salsum cum suillo recenti adipe, & passo potum.

Vrticæ semen ex aqua sumptum.

Nitrum ex aqua haustum.

Cichorium deuoratum.

Sinapis quoquo modo sumpta.

Nasturtium ex vino sumptum.

Raphanus ex vino sumptus.

Cæpa ex vino sumpta.

Allium ex vino sumptum.

Ad aconitum.

Leporinum coagulum ex vino potum.

Hædinum coagulum ex vino potum.

Vitulinum coagulum ex vino potum.

Chamæpityos decoctum haustum.

Scoria ferri ex aceto mulso sumpta.

Origani decoctum cum vino absinthite potum.

Rutæ decoctum cum vino absinthite potum.

Marrubij decoctum cum vino absinthite potum.

Absinthij decoctum cum vino absinthite potum,

Sedum maius ex vino absinthite potum.

Abrotanum ex vino absinthite potum.

Chamelæa ex vino absinthite pota.

Aiuga ex vino absinthite pota.

Opob

Opobalſamum drachmæ pondere ex melle, vel lacte cum caſtoreo, pipere, & ruta æquis ponderibus ex vino potum.
Vinum in quo aurum, argentum, ferrúmve candens reſtinctum fuerit, potum.
Gallinæ ius ex lixiuio & vino paratū potum.
Bubularum carnium præpinguia iura cum vino ſumpta.

Ad taxum.

Acetum calidum potū, & vomitu redditum.
Simplicia omnia, quæ cicutæ reſiſtunt.

Ad toxicum.

Sanguis Hircinus frixus, & in cibis ſumptus.
Sanguis Caprillus frixus, & in cibis ſumptus.
Sanguis Leporinus frixus, & in cibis ſumptus.
Sanguis Ceruinus frixus, & in cibis ſumptus.
Sanguis Caninus frixus, & in cibis ſumptus.
Galbanum cum myrrha ex vino hauſtum.
Quinquefolij radix pota.
Roboris cortex tritus ex lacte hauſtus.
Fagi cortex tritus ex lacte hauſtus.
Ilicis cortex tritus ex lacte hauſtus.

Cotonea mala deuorata, aut cum pulegio, & aqua bibita.
Amomum ex vino haustum.
Carpobalsamum ex vino haustum.

Ad opium & corniculatum papauer.

Mel ex rosaceo calido bibitum.
Origanum cum passo aut oxymelite haustum.
Alismatis radix duarum drachmarum pondere ex vino pota.
Acetum bibitum, & vomitu redditum.
Sal cum oxymelite sumptum.
Meracum vinum cum absinthio, & cinnamomo haustum.
Nitrum ex aqua potui datum.
Origanum cum lixiuio, aut passo potum.
Rutæ syluestris semen cum pipere, & panace ex vino sumptum.
Piper cum castoreo ex aceto mulso, vel cum satureia, aut origani decocto ex vino bibitum.
Pinguia iura in potum sumpta cum vino aut passo.
Ossium medulla ex oleo pota.

Ad cicutam.

Absinthium ex vino bibitum.
Origanum cum passo, aut oxymelite potum.
Acetum bibitum, & vomitu redditum.

Meracum vinum largius epotum, & per interualla repetitum.

Lac tum bubulum, tum asininum potum.

Castorium cum ruta, & menta ex vino sumptum.

Amomi vncia epota.

Cardamomi vncia epota.

Styracis vncia epota.

Piper cum vrticæ semine ex vino haustum.

Lauri folia potui data.

Laser ex oleo vel passo potum.

Passum per se largius ebibitum.

Ad ixiam.

Absinthium ex vino bibitum.

Origanum ex vino sumptum.

Acetum potum, vomitúque reiectum.

Rutæ syluestris semen potum.

Laserpitij radix pota.

Tragorigani decoctum haustum.

Resina terebinthina deuorata.

Nardus Indica potui data.

Castorium oboli pondere sumptum.

Laserpitium oboli pondere sumptum.

Nuces iuglandes cum resina, castorio, & ruta tritæ, ita vt singula drachmæ pondus æquēt ex vino haustæ.

Chamelææ succus scillici pondere ex aqua mulsa haustus.

Thapſia ſuccus ſcillici pondere ex aqua mulſa hauſtus.

Abſinthij ſuccus ſcillici pondere ex aqua mulſa hauſtus.

Ad coriandrum.

Merum per ſeſe, vel ex abſinthio potum.

Oleum potum.

Oua in oleo exinanita, & ex muria liquefacta deuorata.

Muria epota.

Gallinarum, & anſerum ius copioſè ſalſum hauſtum.

Paſſum ex lixiuio aßumptum.

Ad pſyllium.

Simplicia omnia quæ coriandro aduerſantur.

Ad herbam ſardoniam.

Aqua mulſa liberalius pota.

Lac affatim bibitum.

Aqua calida fotu adhibita. Quin etiam & oleum.

Ad mandragoram.

Aqua mulſa copioſe pota, & vomitu reiecta.

Nitrum cum abſinthio ex dulci vino, aut paſſo ſumptum.

Roſaceum cum aceto capiti perfuſum.

Eupatorium ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.

Piper

Piper ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.

Sinapi ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.

Castorium ex aceto tritũ, & ad olfaciendum datum.

Ruta ex aceto trita, & ad olfaciendum data.

Lucernarum extinctarum fumus olfactus.

Ad fungos malos.

Fimus gallinæ cum aceto bibitus.

Mel ex rosaceo calido potum.

Raphanus deuoratus, vel potui datus.

Absinthium cum aceto sumptum.

Melissophylli folia cum nitro bibita.

Lixiuium sarmentitij cineris ex acida muria potum.

Satureia feruefacta, haustáque.

Origani iusculum potui datum.

Acetum calidum potũ, & vomitu reiectum.

Atramentum sutorium ex aqua potum.

Sal cum oxymelite bibitum.

Pyrastri folia pota, deuoratáque.

Oua gallinacea cum aristolochiæ drachma ex posca deuorata.

Panacis radix, & semen ex vino pota.

Fæx vini cremata ex aqua pota.

Sinapis bibita.

Nasturtium comestum.

Ad gypſum.

Origanum cum paſſo aut oxymelite potum.
Maluæ decoctum potum. Quin & toto corpori inſperſum.
Oleum ebibitum.
Aqua mulſa bibita.
Caricarum decoctum potum.
Lixiuium è ficulneo, aut ſarmentitio cinere paratum, cum vino copioſiore hauſtum.
Origanum cum lixiuio, aut aceto, aut paſſo ſumptum.
Quin etiam & thymum.
Simplicia omnia quæ fungis reſiſtunt.

Ad ceruſſam.

Amaracinum oleum potum.
Irinum oleum potum.
Vlmi liquor potus.
Perſicorum nuclei ex ptiſana poti.
Caricarum decoctum hauſtum.
Maluarum decoctum hauſtum.
Lac calidum bibitum.
Seſamum tritum ex vino ſumptum.
Lixiuium ex ſarmentitio cinere hauſtum.
Columbina oua cum thure pota.

Ad argenti ſpumam.

Hormini ſylueſtris ſemen potum.
Myrrha bibita ex vino pota.
Abſinthium ex vino potum.

Hyssopum ex vino potum.
Apij semen ex vino potum.
Piper ex vino potum.
Ligustri flores ex vino poti.
Palumborum aridum fimum cum Nardo ex vino potum.

Ad argentum viuum.

Lac copiosè potum, & vomitu reiectum.
Simplicia omnia, quæ faciunt ad argenti Spumam.

Ad calcem, sandaracham, & auripigmentum.

Lac ex aqua mulsa potum, & vomitum.
Carnium iura pinguia hausta.
Althææ decoctum ad spissitudinem redactum potum.
Maluæ decoctum ad spissitudinem redactum potum.
Tragi herbæ semen bibitum.
Seminis lini decoctum potui datum.
Oryzæ decoctum potum.

SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM FACVLTATES,

quæ corpori decorem præstant, ex Dioſcoride.

DECORIS.

Ad alopeciam.

MYRRHA *cum ladano, & vino myrteo illita firmat.*
Harundinum corticum cinis ex aceto inunctus.
Ladanum cum vino, myrrha, & myrteo oleo admotum.
Myrti baccarum ſuccus illitus.
Nucum iuglandium putamen combuſtum, tritúmque, & impoſitum.
Nucum auellanarum crematarum cinis ex vrſino adipe perunctus.
Erinacei terreſtris corij cinis ex liquida pice illitus.
Leporinum caput crematum ex vrſino adipe.
Ranarum crematarum cinis ex liquida pice.
Murium ſtercus combuſtum ex aceto.

Vrſinus

Vrsinus adeps illitus.
Caprarum fimus ex aceto.
Raphanus tritus ex loliacea farina admotus.
Braßica cum sale confricata.
Betæ recentia folia cruda illita.
Asphodeli radicum cinis impositus.
Cæpa confricata.
Allij cinis ex melle.
Sinapi illitum.
Nasturtium confricatum.
Cyclamini succus inunctus.
Ranunculi folia, & radices illitæ paruo temporis spatio.
Aloë ex vino.
Abrotoni cinis ex raphani succo, aut cicino oleo.
Laserpitij liquor cum pipere ex aceto.
Nymphææ radix ex pice.
Cynoglossæ folia ex vetere suillo adipe.
Adiantum illitum cum susino, aut myrtino oleo, aut hyssopo, aut vino.
Thapsiæ succus inunctus.
Rubigo ferri illita.
Sandaracha ex resina.
Alcyonium tertium exustum inunctum.
Cotex naxia illita.
Hippocampi cremati cinis ex liquida pice, aut axungia, aut amaracino vnguento.
Caprillarũ vngularũ cinis ex aceto inunctus.

Ad pilos auellendos.

Oleum in quo decocta fuerit scolopendra inunctum.

Lepus marinus per se. & cum marina Vrtica tritus. & appositus.

Salamandræ cinis ex oleo.

Hederæ lachryma illita.

Dryopteris radix trita, et post sudorem inuncta.

Aqua è Viridibus Vitium sarmentis igne incensis emanans admota.

Auripigmentum illitum.

Cyperus Babylonicus illitus.

Ad capitis furfures.

Salicis foliorum, & corticis decoctum in lotionibus.

Myrti baccarum succus illitus.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia inunctum.

Humana Vrina inueterata admota.

Adiantum in lixiuio decoctum.

Fœnum græcum in lotionibus.

Malua ex Vrina humana.

Betæ decoctum admotum.

Allij cinis ex melle.

Bulbi cum cremato nitro illiti.

Lilij cremati radix ex melle.

Alumen cum eruo ex pice.

Ad

Ad ruffandum capillum.

Ligustri folia trita, & in radiculæ succo macerata illita.
Lycium illitum.
Loti ligni decoctum in lotionibus admotum.
Vini fæx cremata ex lentiscino oleo tota nocte illita.

Ad denigrandos capillos.

Cupreßi folia trita ex aceto.
Rhois decoctum admotum.
Mori folia trita ex aceto.
Gallæ aceto, aut aqua maceratæ illitæ.
Palmæ corticis decoctum admotum, & subinde detersum.
Myrti foliorum decoctum in lotionibus.
Acaciæ succus illitus.
Ilignæ radicis cortex ex aqua coctus, donec mollitus intabescat, tota nocte illitus.
Hederæ corymbi illiti.
Saluiæ decoctum sæpius inspersum.
Rubi folia admota.
Sory illitum.

Ad pediculos & lendes necandos.

Cedria illita.
Myricæ decoctum perfusum.
Mel inunctum capiti.
Betæ decoctum perfusum.
Allium cum origani decocto potum.

Hederæ lachryma illita.
Staphis agria admota.
Sandaracha ex oleo.
Alumen ex aqua.

Ad prohibendum solis adustionem.

Albumen oui inunctum.
Cyclamini succus inunctus.

Ad faciei nitorem.

Vlmi liquor in folliculis contentus illitus.
Mastiche illita.
Lupinorum farina illita.
Raparum syluestrium semen admotum.
Peponis succus cum eius semine, & farina in sole siccatus, & inunctus.
Polygonatum illitum.
Glans vnguentaria ex vrina.
Ricini semen impositum.
Vitis syluestris acini illiti.
Argenti spuma elota inuncta.
Alcyonium primum, & secundum admotum.
Chia terra imposita.
Crocodili terrestris fimum illitum.

Ad colorem conciliandum.

Cicer in cibis sumptum.
Agaricum drachmæ pondere potum.
Hyssopum manducatum, bibitúmve.
Chia terra illita.
Cerasi gummi illitum.

Caricæ in cibis ſumptæ.

Ad faciem derugandam.

Cacaliæ grana poſt excuſſum florem prodeuntia trita, & cum cerato illita.
Bryoniæ radix cum eruo, creta chia, & fœno græco illita.
Chia terra admota.

Ad cutis vitia in facie.

Sabinæ decoctum perfuſum.
Conchulæ Indicæ cinis admotus.
Glans Vnguentaria trita ex Vrina.
Cancrorum fluuiatilium cinis illitus.
Narciſsi radix cum ſemine Vrticæ ex aceto.
Ricini ſemen admotum.
Vitis ſylueſtris acini illiti.
Cinnamomum ex melle.
Coſti radix cum aqua Vel melle illita.
Bryoniæ radix per ſe, & cum eruo, creta chia, & fœno græco admota.
Alcyonium primum, et ſecundum impoſitum.

Ad ionthos & varos.

Myrrha illita cum melle, & caſia.
Porri folia cum Rhoë obſoniorum loco admota.
Cepæ ſuccus cum ſale appoſitus.
Bulbi per ſe, & ex oui Vitello.
Pulegium ex cera.
Sori ex aqua.
Alcyonium primum, & ſecundum admotũ.

Ad

Ad cutis faciei vitia à sole contracta.

Iridis Illyricæ radix cum helleboro admota.
Cinnamomum ex melle.
Costi radix cum aqua vel melle illita.
Amygdalæ amaræ radicum tritarum decoctum admotum.
Fici lac inunctum.
Cochlearum tum caro, tum testa simul crematæ ex melle.
Leporinus sanguis inunctus.
Sepiæ crematæ cinis admotus.
Lini semen illitum.
Orobi farina imposita.
Sisymbrium inunctum.
Bulbi cremati cum Alcyonio impositi.
Hederæ decocta folia ex vino.
Chamæleonis nigri radix.
Alyssum concisum ex melle.
Melia terra inuncta.
Cyclamini succus illitus.

Ad lentigines delendas.

Iridis Illyricæ radix cum albo veratro admota.
Casia ex melle illita.
Costus ex aqua, & melle.
Sanguis leporinus calens inunctus.
Tritici farina ex aceto mulso.
Raphanus cum loliacea farina admotus.
Brassicæ semen inspersum.

Sisym

Sisymbrium tritum, & impositum.
Allij cinis ex melle.
Dracunculi maioris radix ex melle.
Bulbi ex melle, & aceto.
Nigella confricata.
Galbanum cum nitro ex aceto.
Alyssum concisum ex melle.
Narcißi radix cum Vrticæ semine ex aceto.
Ricini semen illitum.
Vitis sylvestris acini liniti.
Bryoniæ radix cum eruo, fœno græco, & creta chia.
Adarces imposita.

Ad næuos.

Alcyonium illitum.

Ad totius corporis nitorem.

Mastiche inspersa.
Vlmi liquor in folliculis conclusus illitus.
Butyrum inunctum.
Crocodili terrestris fimum illitum.
Peponis succus cum eius semine, & farina in sole siccatus ex aqua.
Bryoniæ radix inuncta.
Cyclamini succus inunctus.

Ad cicatrices delendas.

Asininus adeps inunctus.
Fabarum farina cataplasmatis indita.
Ranunculi folia, & radices illita.
Calamintha ex vino decocta admota.

Cucume

Cucumeris syluestris radix trita, & inspersa.
Glans Vnguentaria cocta in aceto cum nitro adhibita.
Bryoniæ radix cum Eruo, creta chia, & fœno græco admota.
Chrysocolla illita.
Alcyonium primum, & secundum inunctum.

Ad vitiligines.

Cochlearum terrestrium testæ cremata, & illitæ.
Leporinus sanguis inunctus.
Sepiæ crematæ cinis admotus.
Fabarum farina inspersa.
Lupinorum farina imposita.
Betæ cruda folia illita.
Chondrillæ radix, & folia ex melle, & nitro trita ex aqua.
Dracunculi maioris radix ex melle.
Asphodeli radicis succus inunctus, confricata prius sub sole cute.
Cepæ succus in sole inunctus.
Alliй cinis ex melle.
Piper cum nitro impositum.
Capparis radix trita ex aceto.
Argemone siccata, tusáque cum nitro, & vino sulphure admota.
Telephij folia cum hordeacea farina ex hydrelæo sex horis admota.

Gentianæ radicis ſuccus inunctus.
Chamæleonis nigri radix cum ſulphure illita.
Ruta cum vino pipere, nitróque confricata.
Libanotis ſemen ex acerrimo aceto.
Lilij cremata radix ex melle.
Nymphææ radix ex aqua.
Rubiæ radix ex aceto.
Althææ ſemen tum recens, tum ſiccum tritum ex aceto, in ſole inunctum.
Anchuſæ radix ex aceto.
Narciſsi radix cum vrticæ ſemine ex aceto.
Bryonia cum Eruo, creta chia, & fœno græco illita.
Glans vnguentaria in aceto decocta cum nitro impoſita.
Cucumeris ſylueſtris radix trita, & inſperſa.
Ricini ſemen illitum.
Veratrum nigrum ex aceto.
Sulphur quoquo modo admotum.
Alcyonium primum, & ſecundum inunctum.

Ad lychenas & impetigines.

Pini, & piceæ cortex illitus.
Lentiſci foliorum decoctum fotu adhibitum.
Cupreſsi folia cum polenta illita.
Rhamni folia admota.
Lignorum marcor inſperſus.
Naſturtij ſemen admotum.

Rhaponticum ex aceto illitum.
Veratrum nigrum ex aceto illitum.
Glans vnguentaria cum lotio imposita.
Vitis viniferæ gummi cum nitro illitum, loco tamen prius perfricato.
Sulphur ex terebinthina resina.
Sal ex oleo, & aceto perfrictum.
Alcyonium primum, & secundum impositum.
Adarces illita.
Pix liquida inuncta.
Thus inspersum.
Aethiopicæ oleæ lachryma inuncta.
Pruni arboris gummi illitum.
Ficulneum lac cum polenta illitum.
Mel cum alumine decoctum illitum.
Propolis inuncta.
Triticeus recens panis ex muria.
Loliacea farina cum sulphure ex vino.
Cicer cum hordeo ex melle.
Lapathi cuiusque radices in aceto decoctæ, loco prius scarificato, & nitro confricato appositæ.
Nasturtium ex melle appositum.
Allij cinis ex melle illitus.
Sinapi ex aceto linitum.
Chamæleonis nigræ radix ex aceto cocta, & inuncta.
Ruta cum alumine ex melle.

Laserpitij liquor ex aceto.
Glutinum in aceto solutum inunctum.
Cucumeris syluestris radix trita, & inspersa.
Tithymali characiæ lac illitum.
Bryoniæ radix cum Eruo, creta chia, & fœno græco illita.
Aqua maris fotu adhibita.

Ad papulas.

Lac omne potum cum crudo melle, admixta aqua, & exiguo sale.
Serum lactis potum.
Acetum applicatum.
Butyrum illitum.
Vrina humana inueterata.
Lupinorum farina admota.
Cyclamini succus adhibitus.
Pulegij decoctum corpori perfusum.
Ruta cum cera, & myrteo oleo cataplasmati indita.
Staphis agria illita.
Glans vnguentaria cum lotio linita.
Rubigo ferri illita.
Alumen cum melle.
Cinnabaris, Id est sanguis draconis adhibitus.
Fornaceæ testæ tostæ admotæ.

Ad alphos, & cutis maculas.

Thapsiæ succus cum melle illitus.

Glans vnguentaria cum lotio linita.
Narcißi radix cum semine vrticæ ex aceto.
Lotus syluestris cum melle perunctus.
Cucumeris syluestris puluerizata radix imposita.
Ricini semen illitum,
Vitis syluestris acini liniti.
Bryonia cum eruo, creta chia, & fœno græco illita.

Ad psoram.

Staphis agria trita ex oleo illita.
Bryoniæ semen inunctum.
Aqua marina fotu adhibita.
Glans vnguentaria in aceto cocta.
Sal illitum.

Ad scabiem.

Cardamomum ex aceto illitum.
Oleæ virentis, & accensæ sudor manans illitus.
Ficulneum lac inunctum.
Erinacei marini testa cruda, tostáve cum alijs mista, & illita.
Hippocampi marini cremati cinis liquida pice, axungiáve, aut amaracino vnguento coactus, & capiti inunctus.
Vrina humana inueterata.
Serum lactis potum.
Cicer cum hordeo, & melle.
Lupinorum farina.

Argemo

Argemone ſiccata, tuſáque cum nitro in balneo confricata.
Hirundinaria minor confricata.
Chamæleonis nigri radix addito exiguo atramento ſutorio, cedrinóque liquore, & axungia pauco linita. Quin etiam ſulphure, & alumine miſtis.
Glans Vnguentaria cum lotio linita.
Origani decoctum corpori perfuſum.
Quinquefolij radix decocta, linitáque.
Potamogeton valet pruritui impoſita.
Lotus ſylueſtris cum melle peruncta.
Veratrum nigrum linitum cum cera, pice, & cedrino oleo.
Stimmi cum cera, & exigua ceruſſa.
Alumen cũ aqua aſperſum aduerſus pruritũ.

Ad lepram græcorum.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia.
Vrina humana addito nitro fota.
Iuniperi cortex crematus ex aqua.
Fraxini cortex crematus ex aqua.
Vlmi folia conciſa ex aceto.
Aethyopicæ oleæ lachryma illita.
Reſina Terebinthina cum ærugine, chalcantho, & nitro illita.
Reſina Larigna cum ærugine, chalcantho, & nitro illita.
Reſina Abiegna cum ærugine, chalcantho, & nitro illita.

Ficulneum lac cum polenta.
Triticei furfures ex acerrimo aceto elixi.
Hordei farina ex aceto acerrimo, & hydreleo.
Lolij farina cum sulphure ex vino, & aceto.
Lapathi cuiusque radices, loco prius scarificato, & nitro confricato admotæ.
Braßica concisa cum polenta adhibita.
Veratrum nitrum ex aceto.
Allij cinis ex melle.
Sinapi ex aceto.
Bryoniæ semen illitum.
Nasturtium ex melle.
Anchusæ radix ex aceto.
Ranunculi folia, & radices apposita.
Melanthij semen admotum.
Cucumeris agrestis radix in puluerẽ aspersa.
Glans vnguentaria cocta in aceto cum nitro.
Thapsiæ succus inunctus.
Scammonia in aceto decocta illita.
Vitis viniferæ gummi admotum, loco tamen prius nitro perfricto.
Aerugo cum nitro ex terebinthina resina.
Alumen cum braßica, & melle coctum.
Sulphur ex resina terebinthina, & aceto.
Sal ex oleo, & aceto feruefactum.
Alcyonium primum & secundum illitum.
Adarces imposita.
Melia terra illita.

Ad

Ad pruritum.

Ficulneum lac admotum cum polenta.
Sulphur ex nitro.
Sal ex oleo, & aceto perfrictum.
Alumen cum aqua aspersum.

Ad elephantiasim.

Erinacei terrestris exiccatum corpus in cibis sumptum.
Cedria inuncta.
Cochlearum terrestrium cinis illitus.
Salamandra alijs conferentibus medicamentis admixta.
Serum lactis potum.
Fel capræ syluestris inunctum.
Fel hircinum inunctum.
Calamintha in cibis sero lactis superposito.

Ad clauos, callos & verrucas.

Salicis corticis cinis admisto aceto maceratus illitus.
Smaridis piscis saliti crematum caput.
Lacertæ concisum caput.
Ouillum fimum ex aceto.
Mel cum alumine decoctum.
Cicerum grana tot accipe, quot sunt porri, & singulis granis singulas tange verrucas, deinde liga grana cicerum in linteolo, & post tergum proijce, & hoc non fiat nisi noua luna.
Heliotropij semen linitum.

Scylla cremata peruncta.
Ranunculi folia, & radices.
Dipsaci radix in vino decocta, tusa, & imposita.
Nigella ex vetere vrina imposita, loco prius scarificato.
Laserpitij liquor cera præmollitus impositus, scarificatione prius facta.
Clinopodium diebus aliquot potum,
Chamæsyces rami triti, & impositi.
Vitis sarmentorum viridiũ incensorum emanans aqua.
Aerugo imposita.

Ad acrochordonas, & thymos & myrmecias.

Mali punici vinum adhibitum.
Lac ficulneum cum adipe circa adiacentem carnem illitum.
Thus ex aceto, & pice illitum.
Ruta cum pipere, vino, & nitro affricta.
Cicer cum hordeo, & melle.
Ranunculi folia, & radices.
Dipsaci radix trita in vino decocta.
Tithymali characiæ succus, & lac illitum.
Chamæsyces rami triti, & impositi.
Heliotropij semen linitum. Quin & heliotropium minus.
Vitium vinsferarum sarmentorum viridium incensorum emanans aqua illita.

Sal cum ſeuo Vitulino illitum.

Ad alarum tædia.

Myrrha cum liquido alumine illita.
Myrti foliorum arentium farina inſperſa.
Cardui radix cataplaſmatis more adhibita.
Alumen linitum.

Ad labiorum rimas.

Adeps Anſerinus illitus.
Adeps Gallinaceus illitus.
Lycium admotum.

Ad ſudorem ciendum.

Ferulæ ſemen ex oleo inunctum.
Onobrychis ex oleo inuncta.
Mel Heraclium quodam anni tempore deuoratum.
Fici maturæ comeſæ.
Sinapi in cibum ſumptum.

Ad ſudorem compeſcendum.

Bulbi comeſti.
Sulphur confricatum.
Gypſum admotum.
Morochthus lapis admotus.
Samia terra admota.

Ad exterendam cutim.

Cyclamini radix inuncta.

Ad extrahendum ex alto.

Mel appoſitum.
Sinapi appoſitum.

SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM VIRES, QVIBVS *exuberantes in corpore humores vomitu & alui deiectione excernuntur, ex Dioscoride.*

EXPELLENTIVM MEDI- CAMENTORVM.

Ad bilem educendam.

IRIS Illyrica drachmarum septē pondere ex hydromelite pota.
Thlaspi semen potum.
Aloe hausta.
Absinthium potui datum.
Tragorigani decoctum bibitum.
Lychnidis syluestris semen drachmarum duarum pondere potum.
Androsæmi semen duarū drachmarum pondere haustum.
Veratrum nigrum per se datum, aut ex Scammonia cum salis drachma.
Pycnocomi radix duarum drachmarum pondere ex aqua mulsa.
Centaurium minus decoctum deuoratum.

Part

Partheniũ ſiccatũ cum aceto mulſo, aut ſale.
Thapſiæ lacteus ſuccus in aqua mulſa potus.
Clematidis alterius ſemen tritum potum.
Seſamoides tritum datum.
Cucumeris ſylueſtris radicis ſuccus, & cortex ſeſquioboli pondere bibitus.
Hippophæ ſuccus oboli pondere potus.
Ricini triginta grana purgata trita hauſta.
Tithymalorum omnium ſuccus binis obolis in poſca potus.
Mercurialis ius potum.
Lathyris grana ſex aut ſeptem cum ficis aut palmulis in catapotio deuorata.
Peplus in hydromelitis cyatho potus.
Scammonij ſuccus drachmæ vnius, aut quaternum obolorũ pondere hauſtus ex aqua mulſa, vel pura.
Chamelææ folia in catapotijs deuorata cum duabus abſinthij partibus adiecta chamelæa vnà cum hydromelite.
Thymelææ viginti granorum pars interna bibita.
Folia ſambuci olerum more cocta.
Folia ebuli olerum more cocta.
Apios, ſcilicet inferior pars deuorata.
Empetrũ in iure aliquo aut hydromelice potũ
Filiculæ aridæ farina aqua mulſa inſperſa bibita.
Cynocrambe decoctum hauſtum.
Heliotropij decoctum ex aqua potum.

Agarici

Agarici drachma vna vel altera cum mulsa bibita.
Pityusæ radix drachmarum duarum pondere cum mulsa hausta, seminis verò drachma, & succi cum farina subacti cochleariũ in catapotio.

Ad pituitam eiiciendam.

Iris Illyrica drachmarum septem pondere ex hydromelite.
Mandragoræ succus duorum obolorum pondere potus.
Veratrum nigrum per se datum, vel cum scammonia cum salis drachma.
Lycij Indici semẽ cyathi dimidij mẽsura potũ.
Vlmi crassior cortex in vino, aut aqua frigida vnciatim potus.
Gallinaceorum senescentium ius Dioscoridis modo paratum, haustum.
Cyclamini radix ex hydromelite pota.
Scilla cum melle cocta pota.
Hyssopi decoctũ ex aqua, melle, & ruta potũ.
Thymum cum sale, & aceto haustum.
Sphondilij semen potum.
Ammoniacum drachmæ pondere bibitum.
Daphnoides folium recens, vel aridum potũ.
Hippophæsti succus trium obolorum pondere ebibitus.
Epithymum potum cum melle.
Bryoniæ succus cum aqua mulsa.

Cnici

Cnici seminis succus cum mulso, vel iure gallinaceo.

Magnes trium obolorum pondere cum mulsa.

Centaurij minoris decoctum deuoratum.

Parthenium siccatum cum aceto mulso, aut sale potum.

Clematidis alterius semen tritum, potum.

Sesamoides tritum datum.

Cucumeris syluestris radicis succus, & cortex sesquioboli pondere bibitus.

Hippophais succus oboli pondere potus.

Ricini grana triginta trita epota.

Tithymalorum omnium succus binis obolis in posca potus.

Lathyris grana sex, aut septem in catapotio cum ficis, aut palmulis deuorata.

Peplus in hydromelitis cyatho potus.

Scammonij succus drachmæ vnius, aut quaternum obolorum põdere haustus ex aqua pura vel mulsa.

Chamelææ folia in catapotijs deuorata cum duabus absinthij partibus, adiecta chamelæa vnà cum hydromelite.

Thymelææ viginti granorum pars interior bibita.

Folia sambuci olerum more cocta.

Folia ebuli olerum more cocta.

Apij inferior pars deuorata.

Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite.

Filiculæ aridæ farina aqua mulſa inſperſa hauſta.

Cynocrambæ decoctum bibitum.

Heliotropij decoctum ex aqua potum.

Agarici drachma vna, aut altera cũ mulſa bibita.

Pityuſæ radix drachmarum duarum pondere cum mulſa, & ſeminis drachma, ſucci vero cum farina ſubacti cochlearium in cata potio exhibita.

Ad atram bilem pellendam.

Mandragoræ ſuccus potus duorum obolorum pondere ex mulſo.

Gallinaceorum ſeneſcentium ius Dioſcoridis modo paratum hauſtum.

Epithymum ex melle hauſtum.

Serum lactis potum.

Origanum ſiccum acetabuli menſura potum ex mulſa.

Pulegium bibitum.

Helleborum nigrum hauſtum.

Spartium epotum.

Alypum menſura epithymo pari cum ſale, & aceto ſumptum.

Ad vomitum ciendum.

Thlaſpi potum bilem rubeam educit.

Mandragora pota atram bilem.

Thapſiæ lacteus ſuccus in mulſa bibitus.

Tithyma

Tithymalorum ſuccus cum aqua mulſa binis obolis potus.
Apij ſuperior pars deuorata.
Spartij flores, & ſemina in mulſa pota.
Anagyris ſemen commanducatum.
Betonicæ radices ex hydromelite potæ, pituitam eijciunt.
Papaueris ſpumei ſemen in mulſa acetabuli menſura potum.
Staphidis agriæ grana quindecim in mulſa data.
Silybi radicis drachma pota.
Glans Vnguentaria cum hydromelite.
Narciſsi radix cocta, eſa, ſeu bibita.
Ricini grana triginta hauſta.
Raphani cortex ex aceto mulſo potus.
Tithymalorum omnium ſuccus potus.
Aes Vſtum cum hydromelite bibitum.

Ad aquam intercutem pellendam.

Cyclamini radix ex hydromelite hauſta.
Polij decoctum bibitum.
Hippophæſti ſuccus trium obolorum pondere potus.
Hippophais ſuccus oboli pondere potus.
Ricini grana triginta pota.
Lathyris cuiuſq; grana ſex, aut ſeptem in catapotio cum ficis, aut palmulis deuorata.

Samb

Sambuci folia olerum more cocta.
Ebuli folia olerum more cocta.
Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite haustum.
Cynocrambe decoctum potum.
Asarum bibitum.
Lactucæ syluestris succus in aceto mulsopotus.
Trifolij radix drachmarum duarum pondere in vino bibita.
Tithymalorum succus bibitus.
Thymelææ viginti granorum pondere pars interna bibita.
Vitis syluestris radix feruefacta in aqua in cyathis duobus vini aquæ marina diluti, pota.
Squamma æris ex aqua mulsa hausta,
Mercurialis decoctæ ius potum.

Ad aluum emolliendam.

Cerasia recentia manducata.
Pruna in cibis sumpta.
Siliquæ deuoratæ.
Fici maturæ deglutitæ.
Lac ficulneum potum.
Chamarum piscium ius potum.
Vnguis odoratus ebibitus.
Raphanus comestus.
Beta alba deuorata.
Blitum comestum.

Rumi

Rumicis cuiúſque decoctum potum. Quin & ipſa herba decocta deuorata.
Malua in cibo ſumpta.
Atriplex manducatum.
Braßica leuiter ferue facta comeſta.
Lentis decorticatæ decoctum primum hauſtum.
Aſparagorum cauliculi in cibum accepti.
Cucurbitæ integræ feruefactæ expreſſus ſuccus potus.
Gingiber quoquo modo ſumptum.
Peucedanum potum.
Scillæ ſiccæ cochlear vnum, aut alterum ieiunis datum.
Androſæmi ſemen tritum potum.
Helxines foliorum ſuccus hauſtus.
Papaueris erratici ſemina acetabuli pondere ex mulſa aqua pota.
Cynogloßi decoctum hauſtum.
Chamæſices rami decocti, & in cibum ſumpti.
Bryoniæ cauliculi recentes cocti, & in cibum deuorati.

PP

FINIS.

MENSVRARVM ET PONDERVM TYPI, AD DIOSCO-
ridis mentem, Ex Galeno.

De Ponderum ratione.

Siliqua pendet Chalcum vnum.
Aegyptia faba Chalcum vnum & semis.
Orobus Chalcos duos.
Obolus Chalcos tres.
Scrupulus Obolos duos.
Drachma Scrupulos tres.
Vncia Drachmas octo.
Acetabulum Drachmas quindecim.
Nux Regia Vncias septem.
Nux Pontica Vnciam vnam.
Libra Vncias duodecim.
Mina Medicorum Vncias sexdecim.
Mina Italica Vncias decem & octo.
Mina Alexandrina Vncias viginti.

Arta

Artaba Aegyptia continet Modios quinque.
Modius Aegyptius & Italicus Chœnices octo.
Medimnus Hemiecta duodecim.
Hemiectum.i.semisextum Congios duos.
Congius Chœnices quatuor, idest drachmas 720
Chœnix Heminas 3. Atticas.i. drach. 180
Sextarius Heminas duas.i.drachmas.120
Hemina Cyathos sex, id est drachm.60
Cheme Cyathi quartam partem, id est drachmas 2. & ʒ
Cochlear Scrupulos tres.

PONDERVM ET MENSVRARVM LIQVIDOrum ratio.

De Mensuris Vini, Aceti, & Aquæ.

Ceramium lib.80
Amphora lib.80.
Vrna lib.40
Congius lib.10
Sextarius lib.1. & Vncias 8
Hemina Vncias 10
Cotyla Vnc.10
Oxybaphus drach.18
Acetabulum drach.18
Cyathus drach.12. & scrupulos 4
Cheme drach.3. & scrup.1

De Mensuris Olei.

Ceramium lib.72
Amphora lib.72
Vrna lib.36
Congius lib.9
Sextarius lib.1
Hemina Vncias.9
Cotyla Vncias 9
Acetabulum drachmas 18
Oxybaphus drach.18

Cyathus drach.18
Cheme drach.3

De Mensuris Mellis.

Ceramium lib.120
Amphora lib.120
Vrna lib.60
Congius lib.15
Sextarius lib.2
Hemina lib.1
Cotyla lib.1
Acetabulum drach.27
Oxybaphus drach.27
Cyathus drach.20
Cheme drach 5

INDEX SIMPLICIVM QVÆ IN HAC PLANTArum historia continentur.

A

Clino

Cucur

Fluē

Hya

Lotus

Persi

Regium

Squilla

mỹg

V

FINIS.

[illegible] ung peast [illegible] au
bout [illegible] qui [illegible]
[illegible] faict [illegible]
[illegible] si la poudre [illegible]
[illegible] de poudre [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] comme [illegible] ont [illegible]
[illegible] de [illegible] comme

[illegible] a [illegible]
[illegible]

[illegible] a [illegible] de [illegible] aide [illegible]
[illegible] et si faict [illegible]
[illegible]
[illegible] si [illegible]
[illegible] si faict comme [illegible]

[illegible]

[illegible] pour [illegible] St
[illegible] de la
[illegible]